





Pre-Linnæon  
Q1c 349.7  
.R4  
1692-1703  
c. 1  
v. 11-12  
Cals. 18  
1-8

H O R T I  
M A L A B A R I C I  
P A R S U N D E C I M A,  
D E  
H E R B I S

ET DIVERSIS ILLARUM  
S P E C I E B U S

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, Brachmannum characteribus nominibusque expressis.*  
Adjesta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera delineatione,  
colorum viriumque accurata descriptione,

A D O R N A T A

*Per Nobilissimum ac Generosissimum D. D.*

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,

Toparcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem supremi Confessus apud  
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, nunc vero Equestris Ordinis nomine Illustribus  
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum,

*In ordinem redegit & latinitate donavit*

ABRAHAMUS A POOT M. D.

*Notis adauxit, & Commentariis illustravit*

JOANNES COMMELINUS,

*Republicæ Amstelodamensis Senator, ac Horti Medici præfectus.*

Mo. Bot. Garden,  
1893



A M S T E L A E D A M I.

Sumptibus Viduæ IOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van  
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,

Anno c1o 1o c xci11

M. D. C. X. C. I. I.



*Ananas sativus*

Pl. II. Tab. 1.

*Kapá-tjakka.*





H O R T I  
M A L A B A R I C I  
P A R S U N D E C I M A .

D E

H E R B I S  
E T D I V E R S I S I L L A R U M  
S P E C I E B U S .

K A P A - T S J - A K K A .

T A B U L A I . I I .



Ramannes & Lusitani *Ananàs* dicunt, duum triumve pedum planta, arenosa & aquosa amans loca. *Radix* crassiuscula, undiquaque longas, capillatas, nonnihil nodulatas, albicantes spargit fibras; media pars obtortæ radicis formam obtinet. Primæ radici-formes scaturigines exteriori trunci lamellæ inferuntur, foliaque inferiora perforant, & quidem illic loci, ubi folia decidua aliquantulum putrefacta, maxime conspicuæ; foliis vero vegeto virore expansis, evanescent. Laterales radiculae trifariam nobis ostendunt phasin, prima subfusca est & filamentosa, altera lignea, albicans, muscosa, tertia sive medullaris nervea, prædura, admodum firma. *Caulis* è radice exsurgit unicus, rotundus, rectus, sine stolonibus; ex hoc *caudex* tripedalis, fructum



nempe si annumeres, crassiolus, pollicis ferme latitudinis, viridi, nitente, glabro cortice obductus, qui semiannulatis geniculis interstinguitur; interiori parte spongiosus, fistulosus, medulla albicante, succulenta, fibrosa instructus; humor illius aqueus est & subdulcescit. *Folia* ex semiannulatis erumpunt geniculis, alternato ordine, illorum bina totam trunci peripheriam arctissimis complectuntur vinculis, inferiori parte confertim, superiori laxius trunco adnectuntur; oblonga sunt, supra fructus in fastigium excrefcentia, sinuosa, sensim in cuspidem aculeatum stricta, interiori parte concava, fibris in utraque superficie laxioribus & fungosis pertexta, quæ regulari nexu procedunt, quarum interiores cæteris majores, crassiores ac valde duræ; ubi radículas ejaculantur obliquo, secus recto ductu procedentes, candicantes: Interior sinus subviridescit, illius latera, ad unius circiter digiti crassitiem, fusco virore nitent; in laciniis, jam describendi aculei, congruo & quasi artefacto ordine, infiguntur; unumquodque *folium* in duas dispecitur laminas, cujus convexa, pars rarioris, concava autem densioris structuræ est; folium ordine sextum, per universum hunc truncum, aliud, rectà è diametro oppositum, habet, adeo ut totus truncus hexagonus, ob circularem & cochleatam foliorum compaginem, dici queat; semilunares foliorum ungues concinna insertione trunco firmiter adhærescunt, superiori vero membranula, reliquæ foliorum substantiæ, viridescentibus fibrillis agglutinantur. In oris folia hæc muniuntur spiculis, ceu aculeis densis, rigidis, acutis ac incidentibus, versus cuspidem parum incurvis, non tamen aduncis; inferior pars circa caulem ad duos tresve pollices sine aculeis est; contextura illorum rigida, crassa, densa, spissa, venulis parallelis, ex unguiculis ad cuspidem, qui magis durus & rigidus, striata; quæ ad inferiorem caulis partem prodeunt, oblongiora sunt, in vetustiore planta ex viridi subflavescent, ad oras ex flavo rufescunt, ut & in spiculis aculeatis, in parte superiore extra oras rubescunt, colore saturo rosaceo, in parte nempe ima ac interiori, in



exteriori incarnatè rubescunt, in superiori flavescunt, circa latera farinaceo ac albicante rore laneisve floccis conspersa: superiora unà cum inferioribus ejusdem sunt figuræ, circa caulis cacumen interius in una parte sanguineo-saturo ac vivido nitente rubore suffusa, albicantibus punctis interspersa, rosam, tulipamve marmoream dices, versus cuspidem fusco & nitente virore, vel etiam sanguineo, si teneriora sunt, in exteriori latere colore vivido incarnato, superne viridescencia vel ejusdem incarnati coloris, farinacea quoque nive, qua color incarnatus ceu viror in foliis obfuscat, conspersa, illa remota ipse foliorum color plenius sese conspectui offert; singulorum foliorum apices præduris aculeis mucronantur: unumquodque folium gemmam continet, quæ licet per exigua, integram tamen plantam perfectissime in se comprehendit, pedunculo trunci circuitui, exteriori nempe ejus lamellæ, insertam.

*Fructus*, in quo flores proveniunt, in caule excrescit unicus, cacumini ejus insidens, veluti nodus, superioribus foliis inferne succinctus, strobiliformis *Pini Italici* fructum referens, in totum *Cinaræ* instar, foliis futurorum florum operculis, eleganti specie constructis, atque in modum cochleæ (si nempe à læva versus dextram foliorum ordines insequaris, alias rectius exsurgunt) ipsum fructum obsepientibus, ita ut sextum in ordine, semper è diametro aliud oppositum habeat, ubi bina ad latera paria circumstant. Foliis hisce rhomboïdæis, cuspidatis, surrectis, rigidis, ad verticem sensim minoribus, etiam in oris, cuspidibus ceu aculeis parvis ac rigidis munitis, venis in longum, versus cuspidem striatis, anterie sanguinei ac nitentis coloris, ut & exterius, ubi albicante farina obfuscat, in unguiculis viridescentibus. E vertice strobiliforme, oblongum capitulum, pulchramve potius rosam foliaceam emittit; in germinationis exordio, perinde ut cætera fructus folia, rubram, atque in sui accretione viridescentem, sed ubi lanuginosa tunica obvelatur, purpuream; in sui principio arcte, congruo tamen ordine

com-



compactam, sensimque magis expansam, in apice splendide virentem. Integer fructus pyramidalibus conflatur capsulis, ab interiore caule ad extimum corticem decurrentibus. Foliaceus *apex*, nonnunquam simplex, alias multifidus, qui fructui insidet, radicum, facile hic separabilem, ac lateralium furculorum primordia in se continet, adeo ut ipse vertex easdem, quæ in tota planta sunt, partes includat, idem etiam, si obtutum acuas, in lateralibus furculis videre est. *Flores* in fructus vertice ex foliaceis tuberculis prodeunt, ex vertice oculorum ceu gemmularum exsistentes, quæ per totum, cortice excepto, ad verticem fructus, ubi foliis densioribus vestitur, ad ipsorum foliorum unguiculos extuberant; suntque florum conceptacula, quarum pedunculi florum calices, in fundo rotundi, primitus clausi, postea transgressum floribus concedentes, deciduisque floribus semet constringentes concretescentesque, evadunt; gemmularum de cætero follicosæ sunt & nonnihil ad latera compressæ, conformatæ ex tribus rotundiolis, crassis, rigidiusculis ac arcte convolutis foliolis, quæ ad se invicem sunt constricta, coloris exterius sanguinei & nitentis, albicante farina, quæ ruborem obfuscat, conspersæ, intus virides & aqueæ. *Flores* ex hisce gemmulis follicosis exsistentes tripetali sunt, oblongi, ad verticem rotunde cuspidati, superiori parte stricti, inferiori convoluti, ubi arcto orificio, à gemma follicosa, cujus fundo sunt inserti, tanquam à suo calice, arripiuntur. Coloris ad verticem, cæruleo saturi, inferne albicantis, petalis marcescentibus ex rubro fuscescunt. *Stamina* in illis sex, flavis, surrectis & oblongis dotata *apicibus*, quorum tria foliorum interstitiis, reliqua supra incisus e lateribus infiguntur foliis, ac fundo gemmæ follicatæ se inserunt. *Stylus* in illis eminent unicus candidus, superne bifidus, trifido apiculo, cujus quodlibet interstitium bifecatur & crispatur, instar Lili. *Flores* ex gemmis cuspidate acuto, purpureo prominent, quorum qui in inferioribus gemmulis sunt concepti citiores exsiliunt, qui in superioribus



tardiores, etiam in ipso vigore angustis osculis hiantes. *Fructus* maturus, oblongo rotundus, grandis, cortice flavo & rubescente, foliis flavescentibus & contractioribus vel obfitus, vel nudatus, oculis ceu gemmulis latioribus cavis, inanibus & magis complanatis in cortice extuberans. *Caro* ex albicante flavescit, succulenta, saporis, præ cæteris fructibus, gratissimi, acido-dulcis & vinosi; in medio *stylus* ceu corculum est oblongum, rotundum, duriusculum, ex albo flavescens, carne subdura, quæ lignosis intus est pertexta fibris, ex fistulosis oculis transversim incisum humorem exsudans. In fructu etiam transversim inciso oblongæ & radiosæ videntur striæ, ex corculo seu stylo medio, tanquam meditullio fructus egredientes & ad corticem excurrentes, quarum caro magis succulenta & flavescens. Immaturus si gustetur carne sua linguam lancinat ac vellicat. E regione staminum, quæ non ipsis floribus, sed florum interstitiis inseruntur, sepulta jacent *Semina*, in quovis nodulato tuberculo, floris retinaculo, terna, singularibus cancellis, triangulari forma, quæ trigona quoque infarcitur ac distinguitur membranula, seclusa, ubi affabre factis, nerveisque catenulis rotundiusculis colligantur corollis, quarum fimbriæ eleganti rotundarum gemmularum cingulo obvestiuntur, binos inter colliculos, sicuti pinealis glandula inter cerebri nates, recumbantibus. Quoad semina ipsa, parva sunt, plana, pyriformia, ubi præcocia albicant, maturefcentia apicibus fuscis dotantur, plusquam matura, castaneas fuscedine æmulantur, atque in valvulis seu cavernulis, quæ intra carnem, proxime ad corticem, seu gemmulas floriferas consitæ sunt, reperiuntur, rarius in una capsula bina; ipsæ valvulæ oblongæ sunt, in longitudine versus medium stylum fructus ceu corculum directæ, atque in illa parte quæ magis ad stylum accedit, strictiores, ac veluti membrana nitente candida obductæ, & plures, ad singulas gemmas follicatas, exstantes. Porro observandum, quod in novellis plantæ hujus partibus profundè in orificio oculus emergere videatur candidus, constans



ex foliis supra se mutuo, tunicarum instar, convolutus, uti in bulbis apparent, suntque illa folia, quæ plantæ caulem in geniculis investiunt, cujus primordium in ima parte oculi interius situm est. *Folia* in aqua *Oryzæ* cocta, & pulveri *Baliari* mixta, in potum assumta, hydropicorum ventres purgant. *Fructus* immaturi cum *Aceto* propinati, foetum ex utero pellunt. *Iidem* comesti abdominis ex flatibus intumescenciam corrigunt.

## T A B U L A I. 2.

Prolixior hujus plantæ *Ananás* descriptio, sub nomine *Kapa-Tsjaka*, ulteriori explicationi non indiget, omnes enim & singulæ ejus partes ab Authore quam accuratissime sunt observatæ & annotatæ. Unicum hoc addendum, plantam hanc ex America in Indiam Orientalem esse translata, ubi majores fructus, quam in nativo profert solo, atque etiam ibi aliquantulum mutata est, folia enim in India angustiora quam in America. A quinquennio singulis annis in Horto medico Amstelodamensi arte exculta, sat magnos & maturos protulit fructus. A *Casp. Baub. in Pinac.* vocatur *Carduus Brasiliensis foliis Aloës.* A *Markgravio Nana Brasiliensibus*; & ab *Hernando Matzali*, seu *Pinea Indica*: pertinet inter plantas pomiferas, antiquioribus *Botanographis* plane incognita.





*Kapá-tjakka*






*Kadanakú* aut *catevála* Lat.

കറവയഴ Mal.

*Cumari*

कुमारी Bram.

فخاطى و كندى Arab.





KADANKU vel CATEVALA.

## TABULA III.



**P**Lanta est arenoso & petroso gaudens solo. *Radix* penniformis, fibris ex albo flavescentibus oblongis vestita, carnosa, aquea, filamentis lignosis, raris pertexta, saporis aquei, linguam nonnihil vellicantis. *Caulis* ex illa prodit unicus, brevis, rotundus, surrectus, intus carnosus, aqueus. *Folia* bina, decussato ordine, ex caule emergunt, quorum principia caulem amplectuntur, in latum extensa, ad longitudinem cubiti & amplius excrescentia, sensim in cuspidem stricta, valde crassa, superiori parte plana, inferiori, qua radici obvertuntur, convexa, glabra, in oris spinis viridibus, rigidiusculis munita, de cætero pulpa aquea, clara ac viscida instructa, in qua fibræ raræ, virides in longum sparsæ visuntur, saporis aquei & subdulcis. *Flores* in caulibus rotundis, qui ex radice oriuntur, ac foliosis involucris hinc inde vestiti & intus fistulosi, humidi, plures congregati proveniunt, oblongi, monopetali, superne in sex partes divisi, in cuspidem desinentes, exteriora versus nonnihil inflexi, fissi, in collo flavi, crocei, striis aurancei coloris perfusi. *Stamina* in illis sex viridi-albicantia, apicibus oblongis, surrectis, ruffis, dotata, *stylus* in medio albicat. Apud Medicos extra usum.


## TABULA 3.

*Aloë Vulgaris* Casp. Bauhin. in Pinac. planta hæc est. Ab aliquot annis quam plurimæ hujus sunt detectæ conspecies, uti prolixius videre est apud Abrahamum Munting in Aloidario, & Hernandum Histor. Mexican. & Hermannum in Prodromo Paradis. Batav. quorsum Lectorem remittimus. In Itinerario Dom. Simonis vander Stel gubernatoris Capitis bo-

nae spei, præter hæc binas adhuc species *Aloe arborenscentis* inveni, summæ altitudinis & crassitie, quarum trunci incisi, egregium *Aloes* succum fundunt, qui Malabaribus ignotus, in aliis tamen Indiæ & Europæ regionibus familiaris & magni usus est.



*Ellettari Lat.*  
*Des. Mal.*  
*Ellettari*  
*Vas. Gram.*





*Elitari* Lat.

എല. Mal.

Elu

വേല. bram.





## ELETTARI.

## TABULA IV. V. VI.



Eclivia montium, valles, umbrosa ac cæ-  
nosa amat loca, solis impatiens, duodecim  
circiter pedes alta, in quem finem *Tab. I.*  
*stirp. A.* hominis appositam vides imaginem.

*Radix* oblonga crassescit, geniculata, albicans,  
tortuosa, sursum virens, è lateribus innu-

meras fibrosas emittit radículas, quibus, veluti pedibus,  
perinde ac radix *Zinziberis*, proserpit. *Caules* qui è ra-  
dice emergunt, rotundi, glabri, virentes, latum ferme  
pollicem suo emetiuntur diametro, stipite simplici, instar  
*arundinis*, cujus texturam æmulantur, surgentes, albicante  
vappidaque medulla, lignosis filamentis, quorum extrema,  
transversim dissecta, eriguntur, instructa; ex quorum  
corculis, subtilia, aquea, telæ aranearum instar, candicantia  
educi possunt fila; foliorum basi, quæ superioribus radi-  
cum geniculis innititur (*Tab. 2. litt. B.*) theciformibus  
suis involucris (ut in arbore *Pisang* videri potest) insi-  
stunt. Distracti, manibusve triti aroma spirant. *Folia*  
illis *Manju-Kua* non absimilia sunt, quatuor circiter  
spithamas longa, lata (*vide tab. 1. litt. B.*) viridia, para-  
lellis exilibusque venis striata, odore ac sapore forti, sub-  
acri, aromatico. *Costa* media in adversa parte viridi diluta,  
in obversa viridior. *Flores* (*vide tab. 2. litt. E.*) uni fruc-  
tifero racemo, vel radicali surculo, plures, plerumque  
tres quatuorve, ejusdem oblongis foliolis (*vide tab. 2.*  
*litt. F*) veluti capsulis impliciti; nullus enim in foliaceo  
hoc involucro conspicitur hiatus. Tegmine hoc autem  
aperto tetrapetalus visui sese offert flos (*vide tab. 2.*  
*litt. EE*) quorum tria (*vide ibid. litt. G.*) magnitudine  
conveniunt, oblongo angusta, viridi albicantia, membra-  
nosa, quartum (*vide ibid. litt. H*) quod prioribus ex ad-  
verso jacet, tenui stylo (*ibid. litt. I*) lingulaque (*ibid.*  
*litt. K*) donatur, paulo latius ac minus oblongum est,



interius situm ac viride; Lingula litt. K denotata, oblongo-angusta est, crassiuscula, in interiori facie, quæ intimo foliolo ex adverso opponitur accumbitve, sulco striata, in supremo apice bifida, dilute rubescens, suoque sulco exilem, candicantem stylum litt. I, qui in tenue planumque desinit capitulum, recipit. *Floris* vigore cessante complicantur petala, fructuum apicibus perpetim infidentia, *calyxque* in fructum intumescit, (vide litt. M) qui ubi adoleverit in orbem distenditur, convolutis floris foliis etiamnum comatus, (vide litt. N) qui desiccatus talem ut litt. O formam refert. *Fructus* radicalibus fructipromisque racemis appendent, qui uvis & forma & sapore haud perperam assimilantur, orbiculati enim sunt & grate subacidi, viridi, crassiusculo, carnosio, aqueoque cortice obducti, striis admodum tenuibus juxta longitudinem pertexti, in tres distinctos dividuntur loculos cancellatim distinctos, ita ut quodlibet intersepimentum, in sui medio, membranacea fibrilla (vide tab. 2. litt. B) etiamnum, sed levi ingressui bisecetur, sicque seminum conceptacula efficiunt: adeo ut sex ordinibus, combinata, triangularia, pressis planisque lateribus fructus, copiose infideant grana aromatica (vide litt. L) quæ medio stylo trigono, (vide tab. 2. litt. C) cui, mediante membranacea septa, affiguntur, cuspidibus suis adhærescunt. In aprico fructus hi exsiccantur solo, ubi cortex, qui primo crassius viridisque, extenuatur & ex ruffo albescit; suntque ipsissimum *Cardamomum*; non seruntur neque plantantur, sed post sylvarum comburia, sub omnigenarum arborum plantarumque cineribus progerminant. Porro observandum quod ex radicum geniculis sub terra, plurimæ prodeant *gemmæ* cuspidatæ, viridescentes, quæ in furculos (vide tab. 2. litt. D) sesqui spitham longos excrescunt, suntque illi succincti, geniculati, in articulis foliaceis vel membranaceis gaudentes tegumentis, quæ sicca ex albo ruffescunt, & è commissuris laterales, simplicesque pedunculos eructant, qui, sub foliosis, capsiformibusque tegumentis (quibus arcte vestiuntur) florum, fructuumque germina recludunt.

Tres



Tres hujus *Elettari* five *Cardamomi* sunt cognitæ species, quarum prima, quæ hic descripta est & delineata, plane rotundos ac albicantes profert fructus, cujus natale solum supra *Cochim* & *Calicut* in locis montanis, triginta circiter à mari milliaribus, pretioque, ob præstantiores vires, reliquis prævalet. Secunda species oblongior est, sed vilior; tertia vilissima & plane acuminata; quæ posteriores juxta *Cananoi* aliaque Indiarum inveniuntur loca. De viribus nihil addendum duxi, sat enim superque sunt cognitæ.

## T A B. 4. 5 &amp; 6.

*Elettari* quæ hic ab Auctore tam fuse descripta & ad vivum est delineata, est ipsissimum *Cardamomum*, ab ipso primum plenissime in lucem deducta; *Bontius* autem se priorem putat. Sed lege, mi Lector, utriusque descriptionem, & ipse judica. Græci plantam ipsam ignorarunt, vires & usus ipsis magis notæ erant. Noster Auctor

data opera usum illius in Medicina præterit; omnibus enim tam in India quam in Europa fatis est cognitus. Specierum diversitatem *Cardamomi* etiam annotavit, indicans quænam sit optima, sic ut in posterum fraudes dolique præveniri possint.





*Kia* L.

കി മാ.

*Kia*

क्या ब्रम.

قوا Arab.





## K U A.

## T A B U L A V I I.



*Ua*, Bramannibus *Acua*, proprium & commune omnium plantarum nomen est, quæ ad species Zinziberis referri debent, suntque numero octo. *Kua*, *Tsjana Kua*, *Mallan Kua*, *Manga Kua*, *Mangella Kua*, *Intsyi Kua*, *Katou-Intsyi Kua*. *Mala-Intsyi-*

*Kua*. Prima species omne amat solum, præsertim arenosum, in quo sua sponte provenit & progerminat. *Radix* ab una parte transversim excurrit, alba, crassa, tuberosa, hinc inde tenuioribus & fibrosis radiculis instructa, densa, multisque capillis albicantibus pertexta, cortice glabro; in longitudinem se per tuberositates dispergit, ad crassitiem duorum circiter digitorum, & spithamæ longitudinem, in ramos divisa, aqua limpida referta. Sapor acris est, linguam vellicans, amaricans, aromaticus. Odor fortis est & gratus, perinde ac si multa aromata inter se essent permixta. *Folia* oriuntur ex radicum extremitatibus ad longitudinem cubiti, & latitudinem in medio duarum spithamarum; anterius acuminata, circa pedem angusta, *costa* eminente instructa; illa multas emittit laterales, transversim anterius excurrentes, æquali distantia, in extremis oris disparent, ubi subtilioribus venulis marginem folii amplectuntur; interior pars folii aliquo modo complicata est & reflexa, futuris notata. Color in parte interiore fuscus est, in exteriori dilutior. De cætero folia glabra sunt, nitentia, aquea. *Caules* sesquipedales sunt, viridante medulla pleni, sed nulli in illis conspiciuntur furculi; sed è radicibus, scapus erigitur peculiaris, prælongis aliquot foliaceis squamis, scapum arctissime ambientibus obtectus; quæ folia digiti longitudinem superant, anterius in latum extensa, & exiguo cuspide ad se invicem contracta, extremitates à scapo reflectunt, glabra sunt, in longitudine tenuioribus venulis



instructa, quæ, nisi frangantur, neutiquam videri possunt; inferiora viridia sunt, media flava, superiora rubra, purpurea, dilute cærulea, summa pene candicantia, aspectui jucunda, odoris grati, sapor ut ille radicis. *Flores* ex squamarum interstitiis, duo vel tres simul proveniunt, campanulas referentes, inferiori parte & intus sub albi, tenui, transparente membrana conclusi, hextapetali, petalo superiori oblongo pellucido, galeæ instar, erecto, flavi sunt & albi, complicati, & vix videntur nisi totus flos à caule divellatur & a se invicem separetur, ubi unum illorum reflexum deprehenditur ad marginem fimbriatum; in medio *filamentum* sese prodit cuspide instructum, draconis quasi caput & aviculam alatum erecta cauda referens. Odor gratus est, è calice sed fracti, & intra digitos contusi, foliorum æmulantur odorem, saporis subamari. *Capsulæ* feminales rotundiolæ sunt, & depressæ, grana continent cineritia, ut illa *Tsjana Kua*, sed raro inveniuntur. *Radix* diu superstes est, folia decidunt, mense Julio & Augusto denuo progerminat. *Radices* raspatae, aliquoties lotæ, pollinem reliquunt, ab indigenis multum æstimatum, qui pultem ex illo conficiunt. *Radix* contusa & succus recens epotus, omnem intestinorum ardorem sistit, renes purgat, fluxum album inhibet, gonorrhæam sanat, sanguinem purgat. *Foliorum* succus hydropicis propinatur, intumescenciam abdominis aufert, modice laxat, viscidam intestinorum pituitam expurgat.

## T A B. 7.

*Kua* secundum sententiam Cl. Vir. Pauli Hermannii est *Zerumbeth Garzii ab Horto*, cujus descriptio, ut & illa *Arabum* admodum obscura, à *Cingalensibus Walinghuru*, id est, *Zinziber sylvestris* appellatur, *Malabares* dicunt *Kua*. Illa Hermannii cum Auctoris nostra ut plurimum convenit.



*Tojana-lua. Lat.*

உண்கலம் Mal.

*Ponvo.*

पेवो bram.

جباتا قحوا Arab.





## TSJANAKUA.

## TABULA VIII.



Ramannes dicunt *Ponvo*, secunda species omne solum amat, præcipue umbrosum. *Radix* alba, in multos tuberes divisa & prorepens, fungosa, aquea, fibris quamplurimis pertexta, aquea, tenella adhuc viridis est & albis capillis obfessa; *Cortex* deminon potest; vetustior facta & fracta, multæ fibrillæ exinde in longum extrahuntur telæ aranearum instar. *Sapor* aqueus est & dulcis ut ille *Cucumeris*, leniter Zinziber spirat. *Surculi* diversis in locis è radicibus progerminant, ad altitudinem trium quatuorve pedum, digitumque craffi evadunt, rotundi, sanguineo rubri, glabri, nitentes, arundinacei, geniculati, simplices, sine ramis, intus virides & aquei. *Sapor*, cum odore, ut ille radicis. *Folia* oblongo angusta, duas spithamas longa, antè acuminata, in medio lata, prope circa furculum annexa, ubi pedes furculum obvolvunt ac obtegunt, in parte adverfa *Costa* eminent, in obversa striantur, laterales costæ transversim marginem folii petunt, ubi oblitterantur; multoties introrsum sunt convoluta, mollia, nitentia, viridia, admodum aquea. E cacumine furculorum capitulum seu tuberculum exoritur, instar *mali punici*, pyriforme, ex multis corallo-rubris gemmulis conflatum, quæ singulæ lata basi, medio stylo annectuntur. E gemmis prodeunt *flores* trifariam divisi tetrapetali, ephemeris, candidi, campanulæ formes, in vertice aliquantulum aperti; quartum petalorum maximum est & reflexum, in cujus cavitate quintum reperitur, admodum reflexum & in quartum recumbens, e regione lingula reperitur in pede floris radicata, apice flavo, de cætero alba; ipsi flores admodum aquei sunt & in sole liquefiunt, è calice suavem admodum spirantes odorem, non autem ex ipsa substantia, quæ odoris & saporis est expers. *Calix* è tribus constat foliis rigidis, lignosis,



rosaceo rubris, intus cæruleis, quæ siccata fusca evadunt; trigono ac rotundiolo insistent globulo seminali, interse-  
pimento in tres partes diviso, ubi *semina* seriatim, & se-  
cundum se invicem disposita, membrana media annectun-  
tur, triangularia, ut illa *Cardamomi*, primo cærulea, dein  
fusca, quando capsulæ seminales etiam trifariam aperiun-  
tur; contusa Zinziber spirant, saporis admodum exigui,  
intus alba. Diu admodum superstes hæc planta est, radix  
enim proserpit & hinc inde novos furculos emittit, præ-  
sertim mense Aprili & Mayo. Cum Zinzibere mixta in  
colica passione adhibetur. *Succus* dolores, ulcera, &  
aurium tinnitum aufert, auditum juvat, omnem fluxum  
cerebri tollit & vertiginem.

## T A B U L A 8.

Secundum meam sententiam *Tsjana Kua* illa | descriptione nostri Authoris quam maxime con-  
radix est, quæ apud *Matthiolum in Diosc. lib. 1.* | venit; est enim saporis vappidi, substantiæ fibrosæ  
*cap. 15. pro Costo Arabico Dioscord. habetur, & est* | & capillatæ. Sæpius illam inter Radices Zedoa-  
*Costi quoddam genus Zinzibri radici simile Clusii in Garc.* | riæ officinarum inveni. Germani illam pro verò  
Radix quæ in officinis prostat & divenditur, cum | *Costo Arabico I. Theriacali* adhibent.







*Malankia Lat.*  
 മലങ്കാ Mal.  
 Ben-tjapó  
 भङ्गाणे Gram.  
 لَام فَوَاء Arab.



## MALAN-KUA.

## TABULA IX.



*Alankua*, quasi diceret *Kua Montana*, tertia species est *Zinziberis*, secundum Bramannes *Ben Tsjapo*, elato, pingui & limoso gaudet solo. *Radix* bulbosa est, extus cineritia, coriacea membrana obducta, intus alba, densa, aquea, undiquaque multis fibris obfessa, capillata, digitum crassa, cui quamplurimi oblongo rotundi bulbi, bini & bini, trina supra se annectuntur serie, glabri, hinc inde minutissimis capillis instructi, densi, perinde ac *Bulbocastana*, quos nomine *Kourka* insigniunt, intus pingues & mucilaginosi, *Zinziberis* odorem & saporem spirant, linguam minus vellicantes. E summitate radicis *calix* oritur, albus & membranaceus, instar ille *Croci*, cui flores includuntur quaterni vel quini, ex fundo calicis longis petiolis prodeuntes, tripetali vel etiam hexta petali, quorum tria, digitum longa, stamen lata, reliqua petala, sive ipsum florem obtegunt, flore jam aperto, supine recumbentia; duo ex reliquis longa sunt & angusta, in acutum desinentia, tertium illis ex adverso est, bifariam divisum, ita ut ipse flos tetrapetalus videatur, mixti coloris est, ex cæruleo albo, purpureo, rubro, flavo; duo reliqua maxima parte alba sunt, ita tamen ut dicti colores etiamnum, sed obscuri videantur; ex eodem calicis fundo simplex progreditur *filamentum* purpureum, quod cornuta & flava eminet lingua; gratissimi hi flores sunt odoris, *Violas* & *Lilia* longe superantes; ante folia e terra erumpentes, quibus deciduis *calix* intumescit, *capsulas seminales* efficiens. *Folia* cum illis *Kua* in totum conveniunt, excepto quod caules & surculi non sese ita erigant, cubiti altitudinem non excedant, sapor ut ille *Zinziberis*, odor idem. Semel quot annis floret hæc planta tempore pluvioso, diu superstes est, in proprio nempe solo, quia bulbi semper de novo progerminant. In Malabaria



ad decem gradus altitudinis versus Borealem partem Lineæ Æquinoctialis, pleno videbatur flore, qui mense Junio ejusdem anni Bataviæ, ad sex gradus Lineæ Æquinoctialis versus Austrum exsiccabatur, ubi mense Decembri de novo florebat, tum enim illic loci pluviam decidunt. Cum ex Indiis Europam peterem, septimestri tempore, ter florebat, ac toties folia permutabat, donec mense Augusto tota consumpta deprehenderetur. Ratio, quia tam brevi tempore toties soli exposita, terra non tantum poterat subministrare alimenti, quantum quidem ad ulteriorem conservationem indigeret; quod & in eodem itinere in diversis aliis plantis accidit & observatum est, quam plurimum enim fit, ut sub linea æquinoctiali, aer nubibus obtegatur, unde pluviam, quæ regiones sub Zona torrida frugiferas faciunt, sine illis enim omnia comburerentur & desiccarentur. Tota planta in formam unguenti redacta, mirum in modum vulnera recenter inflictæ sanat; intus sumpta sanguinem in corpore coagulatum, & omnem purulentam materiam consumit; est & unguentum oculare. *Succus* radicis omnem pituitosam & quasi hydropicam materiam è manibus, pedibus, atque ipsis etiam articulis, quamvis quasi emortui, & extra omnem naturalem motum videantur abigit.

## T A B U L A 9.

<p><i>Malan Kua</i> à Cingalensibus <i>Maha Kaluwa</i> vocatur. <i>Hermannus</i> in <i>prodrom. Parad. Batav.</i> dicit <i>Colchicum Ceylanicum</i> flore <i>Viola</i>, odore &amp; colore <i>ephemero</i>, &amp; hoc ob similitudinem florum. In officinis duplex species <i>Radici Zedoaria</i> invenitur; una nomine <i>Zedoaria radice longa</i>, alia <i>Zedoaria radice rotunda</i>, vel Belgicè <i>Blok Zedoar.</i> Meo</p>	<p>esse <i>Zedoariam radice rotunda</i>. In Horto Medico Amstelod. has radices è terra effodi, quando folia jam perierant, &amp; exsiccati, quæ cum illis <i>Zedoaria rotunda</i>, quoad saporem &amp; odorem, in totum conveniebant; ita ut nullus dubitem quin una sit &amp; eadem, quamvis <i>Lobelius</i> in illa itet sententia, longam &amp; rotundam <i>Zedoariam</i>, radices unius &amp; ejusdem esse plantæ; sed ignoscendum viro, nunquam enim has virentes vidit.</p>
--	---





*Manja-lua* Lat.

മഞ്ചലുവ mal.

*Davi-lua*

दविका bram.

مانجا فوا Arab.



## M A N J A - K U A.

## T A B U L A X.



Quarta species, & minima *Curcumæ*. Malabares *Manja* dicunt, Bramines *Davikua*, Lusitani *Raiz do Zafraõ*. Radix bulbosa est, pollicem & quod superest crassa, extus glabra, nitens, tenuissima membrana quasi obvelata, intus flava, densa, carnosa, transversim dissecta, variis auranceis, rubris, flavis circulis notata, sine ullis, quantum animadverti possit venulis vel nervulis, non admodum longa, exterius multis radicibus capillaribus instructa, fortissimi saporis & odoris, Crocum & Zinziberem æmulantis. Folia cum illis *Kua* quam maximè conveniunt, sed respectu longitudinis paulo latiora, grati odoris, saporis subamari. Flores illic loci proveniunt, ubi folia se aperiunt, sex vel septem simul, sine longis petiolis, monopetali, difformes, quadrifariam divisi, albi, circa pedem aliquantulum rubri, odoris expertes, saporis amari, teneres sunt & aquei, intra biduum vel triduum pereuntes. Semina è pede calicis proveniunt, ut illa *Tsjanakua*, non tam magna sunt, nec capsulæ ita trigonæ, sed plana, intra membranulam juxta se sita, rarissime ad maturitatem pervenientia. Semel quot annis hæc planta folia profert & fructus, mense nempe Aprili & Mayo, diu superstes est, semper enim novi furculi è radice progerminant. Succus radicis dysenteriam & immodicum mensium sistit fluxum, vires corroborat, spiritus reficit, sanguinem purgat, mixtus cum aliis medicamentis, inveteratos ex frigore sanat morbos.

## T A B U L A IO.

Ut *Zedoaria*, ita & duæ inveniuntur species *Curcumæ*, experientia id ita testante; in officinis enim duæ dividuntur species, una nomine *Blok Curcumæ*, cujus radix rotunda, sed non tanti valoris ac vigoris ut illa alia. Nos diceremus *Curcumæ radice rotunda*, & est ipsissima quæ à nostro

Autore describitur, sub nomine *Manja Kua* Doctiss. *Casp. Baubin.* in *Pinac.* etiam *longæ & rotundæ* mentionem facit *Curcumæ* sed perinde quasi unius & ejusdem plantæ radices essent, cum tamen contrarium apud nostrum constet Authorem.



*Manjella-koua* Lat.

മരമുള Mal.

*Aladi*

हळदी Gram.

عُجْنَالَة Arab.





## M A N J E L L A K U A.

## T A B U L A X I.



*Anjella Kua* quinta species, Bramannes dicunt *Alady*, vera *Cucuma* est, omne amans solum. *Radix* ut illa *Zinziberis* bulbosa est, duos digitos crassa, extus eleganti flavo colore tincta, intus rubeo aqueo, qui etiam flavescit, densa, carnosâ, nullis circulis interstincta, sed ejusdem ubique coloris, multis minoribus radiculis, quæ capillatis fibrillis obducuntur, instructa, perinde ac illa *Manja Kua*, gratissimi odoris & saporis, ast fortioris. *Folia* proveniunt ut illa *Kua*, sed illorum caules seu pedes, postquam à stipite recesserint, longiores sunt. *Costulæ* quæ ex medio folii utrimque transversim ad anteriora excurrunt, propius junctæ & subtiliores sunt. *Folium* ipsum majus est & dilutius. *Flores* in vertice junctorum oriuntur foliorum, forma ut illi *Manja Kua*, etiam *semina*, ita ut inter hanc plantam & *Manja Kua* exiguum intercedat discrimen, excepta magnitudine, & præstantiori virtute, odore & sapore. Non tantum in desertis reperitur, sed etiam in agris excolitur, & hoc lucri causa, nulla enim familia est quin illis inter edulia utitur. Europæi illic loci degentes, *Croci* loco est. Etiam in tingendis linteis adhibetur. *Succus* cum radice contusus vel levigatus orificium reficit, halitum gratum facit, exhilarat, melancholiam pellit, sanguinem purgat, venerem excitat, ventriculum & cerebrum confortat, obstructions renum, vesicæ tollit, menstrua provocat, leniter alvum laxat, hydropis in curat. Brevi, omnium consensu planta præexcellens est & excellentissimis præditis virtutibus.

## T A B U L A II.

Planta hæc ab Authore nostro descripta, vera est & ipsissima *Cucuma*. Ab aliquot annis in *Horto Med. Amstel.* illam excolui, & fateor ad amissimam cum descriptione hac convenire. Distinguitur à *Kua* in illis, quod foliorum caulis sit dilutior. *Bontii* delineatio nihil valet, figuram enim *Canna Indica* pro illa ponit. Delineatio *D<sup>o</sup>. Hermannii*

etiam deficit, & cum illa nostri Authoris minimè conveniens, præsertim in *progressu floris*, qui multo melius ab Authore nostro est observatus. *Radix* hæc quæ apud Indos in magno est usu, *Borri-Borri* ab illis vocatur, reliqua cognomina videri possunt apud *Baubinum in Pinac.*



*Junci* Lat.  
 ഇളി Mal.  
 طينجيت Arab.  
 आले Bram.





## INSCHI vel INSCHI KUA.

## TABULA XII.



Extæ species; Bramannes dicunt *Alè*, ipsissima planta est, quam nos *Zinziber* vocamus, quæ iterum in tres dividitur species. *Inschi*, *Katou Inschi* & *Mala Inschi Kua*. *Inschi* tantum dicit ac fervidum, calidum, urens, quia reliquæ *Kua* species

linguam non ita pungant nec vellicent. Planta est excrescens ad altitudinem duorum triumve pedum. *Radix* bulbosa est, multis tenuibus, curvis ligneis, capillatis fibrillis sese terræ affigens; intus ex flava albescens, densa, multis filamentis & nervulis in longitudinem pertexta, sæpius tres pollices lata, in medio crassa, spithamam & quod superest longa, sed tum facile frangitur, quæ causa est, quare exsiccata, rarissimè tam magna videatur. Sapor dulcamarus est, fervidus, omnibus pene notus. *Surculi* multis in locis è radice progerminant, digitum crassi, arudinacei, geniculati, intus virides, corculo humido instructi, rotundi, glabri, nitentes, simplices, non divisi, ubique pede calici formi foliorum ita obvoluti, ut caulis in totum ab illis obtegatur, quæ folia in solo vertice prodientia, in processu surculi subsistunt, illic loci ubi surculo inseruntur, arundinaceos circulos relinquunt. Saporis & odoris sunt aquei, fortis, grati. *Folia* spithamam longa, duos digitos lata, pedetentim in acutum desinentia, in adversa parte *costa* eminente instructa, quæ in recta striam relinquit, fusco viridia, glabra, nitentia; fortissimi & gratissimi sunt odoris, saporis dulcamari, linguam non ita vellicantia quam quidem ipsa radix. *Flores* ut illi *Tsjana Kua* in vertice surculi proveniunt, sed in illo differunt, quod ex tubere florifero non ex gemmulis, sed ex cochleato cavis consistunt foliolis. *Folia* hæc simulatque ab aëre afficiuntur, illic loci primò sunt viridia, deinde corallorubra, ast ubi se ipsa ob-



obtegunt, flavescentia, quæ tandem etiam rubescunt, squammatis optima serie disposita, glabra, nitentia. *Flores* infra cochleata tuberis proveniunt foliola, medio stylo affixi, cui etiam foliola annectuntur, monopetali, difformes, quadripartiti, viridi flavi, in principio alba membranula inclusi. Unum petalorum longissimum est & erectum, cavum, introrsum inflexum, duo reliqua angusta sunt & minora, extrorsum reflexa, quartum brevius est & latius, bisectum, cum margine rubro, flavis punctis aspersum. In medio ex pede calicis tenue, album prodit *filamentum*, cuius *lingula* oblonga, flava. Odor admodum exiguus est, sed contusi cum illo foliorum convenit. Ultra diem aut biduum non supersunt, citoque pereunt. *Semina* sequuntur flores, tenui, alba, interlinctâ membranula inclusa, ubi inordinata serie minutissimis fibrillis stylo annexa, & cochleato cava foliola tuberis elevat, oblonga, depresso rotunda, ab una parte parum convexa, in longitudine paralellis striis exarata, extus nigra, nitentia, intus alba, oleosa, pingui medulla. Odor & sapor ut ille foliorum. E radice, per simplicem distillationem, sæpius oleum collegi, ab omni parte quoad saporem & odorem, cum radice conveniens, sed non ita fervens nec ardens, de cætero valde limpidum, transparens, rubrum, aquæ innatans. Mense Aprili, in terra bene exculta, feritur hæc planta, è terra eximitur, replantatur atque ita excolitur; annua è terra eximitur, per quatuordecim dies in sole exsiccat, cineribus ex ligno, vel etiam calce aspergitur, atque sic conservatur, alias tineæ & corruptioni admodum est obnoxia, tum vel exsiccata vel saccharo condita ubique locorum transmittitur. Arenosum & non bene excultum respuit solum, & plusquam annua ligneis filamentis adimpletur. Etiam in sylvis & desertis reperitur, diuque sua natura superstes est, sæpius bis & pluries folia renovat, quæ ut plurimum mense Januario & Februario exarescunt. Præcipuus usus in radice est, quæ præterquam quod in eduliis adhibeatur, etiam intus sumta astmathi, tussi, pituitæ viscidæ, nausæ, ven-



M A L A B A R I C U S. 25

ventriculo male disposito conducit, exterius applicata artuum dolores, chiragram & podogram tollit. Cum aqua contusa & oculis infusa, vertiginem sanat, illam nempe, quæ post partum mulieribus non bene per menstrua purgatis, accidit, quæ nisi in tempore curetur, epilepsias, paralyses, manias, imo ipsam mortem, in illis regionibus sæpissime producit.

T A B U L A 12.

*Inchi vel Zinziber* tam accurate & perfecte ab authore nostro est descriptus & delineatus, ut ulterius quid addere supervacaneum duxerim.



P. XI.

G

KA.



*Kattu-jnschi* Lat.  
കാട്ടുകിടലി Mal.  
فقط بجنجيب Arab.  
कोलीजणे bram.





K A T O U I N S C H I K U A.

## T A B U L A X I I I.



Ramannes dicunt *Kolinyane* septima species, quasi diceret *Zinziber sylvestris*. In totum cum præcedenti convenit planta, sed odor neque sapor tam fortis nec aromaticus, omnes etiam partes multo majores sunt; *folia illis Manja Kua* per quam similia sunt. Etiam vires pene eadem sunt ut illæ *Inschi Kua*, sed non tanti valoris neque præstantiæ. Indigenæ, lucri causa, hanc cum præcedente commiscent. Sed notandum quod hæc neque ex semine producat neque excolatur, atque ideo merito pro sylvestri habenda.

## T A B. 13.

*Zinziber est sylvestris. A Pisone in Mantissa Aromat. Cap. 12. describitur & ab eo Zinziber Mas vocatur, ab Hernando Anchoa.*





*Mala-juschikua* Lat.

മലജുഷി *Mal.*

مَلَجُشِي *Arab.*

कोलिजणे *brah.*





*MALA INSCHIKUA.*

## T A B U L A X I V.



**O**ctava *Kua* species & tertia *Zinziberis*; Bramannes dicunt *Giri Kolinjane*, quasi *Zinziber montanus*, altitudine omnes priores antecedens. *Radix* cum illa *Inschy* convenit, sed duplo crassior, aquæa, vappida, *Zinziberis* aliquo modo odorem & saporem spirans. *Surculi*, ortus, *Folia*, ut *Katu Inschy*, sed hæc multo longiora & latiora, sapor & odor cum illo radicis convenit. *Caulis florum* quæ medulla est plantæ, ad cubiti altitudinem sese erigit è vertice foliorum, rotundus & undiquaque multitudine florum obtectus, brevibus petiolis brevibusque ramulis, quaterni vel quini, cauli affixi, qui glaber, viridis & nitens; grati & jucundi odoris *Fructus* ex pede florum proveniunt, oblongo rotundi, formam referentes seminum arboris *Kavalam*, sed paulo longiores, primo virentes & glabri, deinde rubri & nitentes, cortice crasso, membranaceo, uvarum instar, intus densa carne vel medulla, quæ ruffa est, intra quam concluduntur *semina*; duo vel tria numero, alba, tenui membrana inclusa, oblongo rotunda, ab una parte rotunda, dura, nigra, nitentia, intus alba, oleosa & unguentosa, *nucleus* amigdalum refert; saporis amari, odor ut ille *Zinziberis*. Provenit ut *Katu Inschy*, non excolitur neque in eduliis adhibetur. *Succus* è radice recenti expressus, intus & extus Podagricis datur; cocta radix dolorem capitis aufert, in vino macerata omnes artuum cruciatus è frigore ortos tollit, in pulverem redacta, cum succo *Raphani* permixta, & epota, calculos diminuit, arenulas è renibus deterget, mulierum colicam sistit, menstrua provocat; succus cum vino coctus lochias promovet, sanguinem purgat; & efficacissime secundinas expurgat.

## T A B U L A I 4.

Inter alias etiam hanc plantam ex Ceylane consecutus sum, quam in *Horto Medico* excolui, in cujus Catalogo a me vocatam invenies *Ayam Poiyphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum *Ceylanicum*, caule glabro, viridi-diluto, maculis albis notato, majus & elatius.

P. XI.

H

P A.



*Pirua-kelangú* Lat.

പറുവ കിളകു Mal.

بجَارُوعٍ فِي الْأَنْفُو Arab.

പാലു bram.





## PARUA-KELANGA.

## TABULA XV.




Lantula est altitudine duarum spithamarum, nascens in aquis minus profundis. *Radix* glandulosa est, intus albicans & aquea, plurimas radices fibrosas, quæ prius albicant, dein flavescent, ejiciens, saporis expers. *Caules* tenues, simplices, fistulosi, alii triangulati, alii rotundi, virides, inferius albicantes. *Folia* ex summitate cauliculorum triangulatorum recta prodeunt, ex singulis unum, ligonem referunt, oblongo angusta, interius latiora, circa petiolum rotundis oris anterius in cuspidem contracta, superficie plana, contextura lenia, mollia, mediocris crassitie. *Costa* in adversa eminent, ut & venulæ tenues, utrinque duæ; quibus in longum striantur; *caules*, triangulati è quibus folia proveniunt, in interiori foliorum parte, planiores. *Flores* congregatim ac velut spicatim, in summitate priorum, rotundorum, viridium cauliculorum videntur, albicantes, sub purpurei; conflati ex *staminulis* aliis crassioribus, aliis tenuibus, quæ *apicibus* purpureorubris dotantur, quorum petala rotundiola, parva, primum scutellatim posita ac stamina obtegentia, sed cauliculi, quem cingunt, summitate excrecente, à se mutuo diffita; temporis progressu tam petala quam staminula viridescunt, quæ posteriora in *gemmas* mutantur rotundas, virides, spiculo munitas, in quibus *semina* parva, oblongo rotunda, primum viridia, dein nigricantia. Addendum in super quod plantula hæc è sua radice glandulosa à latere, similem radicem producat, qua propagatur. In Medicina nullum obtinet usum.

## TABULA 15.

A nemine cum descripta sit hæc planta, meo iudicio vocari debet *Plantagini affinis Indica*, floribus sub purpureis, radice glandulosa.

NIR-





*Vir-tsjembu* Lat.

நீர்த்செம்பு Mal.

نير ججهبنا Arab.



*Nerve* minor Lat.

நீர்த்செம்பு Mal.

Foro

तेचो bram.

نير ججهبنا Arab.



## N I R - T S J E N B U.

## T A B U L A X V I.



**P**Lantā aquatilis est. *Radix* aquosa, carnosā, albicans, plurimis fibris albicantibus se fundo aquæ affigens. *Folia* caulibus, qui ex radice exoriuntur, ac viridi albicantes, molles, & intus fungosi sunt, surrecta insident, superiori parte viridia, inferiori, ubi multis eminentibus obducuntur *costis* rubro cærulescentia, hastiformia, crassiola. *Flores* caulibus, qui ex radice oriuntur, insident in propriis suis ac viridibus involucris, suntque ligulæ oblongæ, rotundæ, albicantes, carnosæ, quæ pedunculo strictiore, ex crasso, rotundo, rubro, ac bulbulis scabroso nodo, emicant. Nullius usus in Medicina.

## T A B U L A 16.

*Arifatum* mihi hæc planta est *Indicum Aquaticum cum pistillo rubro, pediculo globulo adherente.*

## N E L E N S C H E N A M I N O R.

## T A B U L A X V I I.

**P**Lantula humilis, nascens in arenosis & petrosis. *Radix* fibris, oblongis, albicantibus vestita. *Folia* in petiolis versus inferiora incurvatis, candidis, aqueis, theciformis cavitatis, superiora versus viridibus, proveniunt; oblonga sunt, angusta, obtuso cuspide, sinuosa, utrinque nonnihil nitentia. *Costa* crassa, albicans, cum suis venulis, in adversa parte eminent. *Florum* loco, in oblongo, folioso, theciformi, viridi diluto involucro, cujus collum inferius inflatum est & rubescit, & hiatu è vertice versus inferiora, se magis magisque aperit, reconditus est *stylus* oblongus, rubescens, superiori parte *capitulo* flavo, inferiori in colli foliacei parte gemmulis oblongis, flavoruffis obsitus, paulo infra capitulum nodo



theciformi, qui oblongus & gemmulis quasi granulatus, incarnatus & sub purpureus est, circumdatus. Potio ex foliis præparata colicos mitigat dolores.

## T A B U L A 17.

Ego diccrem *Arisarum Indicum petraum humile, radice fibrosa, pistillo rubro adherente, granulis purpurascensibus.*





*Sena* Lat.

செனா Mal.

جسناء Arab.

சசசம் bram





## SCHENA.

## TABULA XVIII.



Quatuor hujus plantæ sunt species. *Schéna*, *Nelenschena*, *Cattu-Schena*, *Mulen-Schena*. Prima Bramannibus dicitur *Surno*, arenosis gaudens, altitudine trium quatuorve pedum. *Radix* prægrandis, plana, rotunda, spithamam ferme longa, crassa, cubitum pene lata, superiori parte, circa caules, fibris albicantibus, in orbem circumdata, intus densa, succulenta, unctuosa & ex albicante subflava carne, saporis aquei & nonnihil pungentie, in edulis est & in foris divenditur. *Caulis* è radice, ubi candidus est, exsurgit unicus, superne in tres ramulos, qui hinc inde furculos minores emittunt, & in duos magis crassiores aliquando divaricantur, divisus; suntque & caules & ramuli teneri, molles, glabri, viridi diluti, albicantes, undulis viridi fuscis variegati, intus humidi, pulpa albicante, fungosa, humorem ex fistulis exstillantes clarum, subrubescens, qui in manum incidens, eam nonnihil pungit, & in aëre inspissatur. *Folia*, quæ ramos furculosque caulis, in quos divisus est, investiunt, oblongo rotunda sunt, angusta, superius cuspidata, viridi clara, ex inferiori parte caulis prodeuntia, caulem angusta lacinia, velut alatum reddentia, linguam acriter pungunt ac lancinant. *Nervi* è *costa* media densi, obliquo ac parallelo ductu, exeunt, qui à margine reflexi, limbulum illic loci relinquunt, una cum *costa* in adversa eminentes & rectam partem striantes. *Flores* filii sunt ante patrem, proveniuntque in capitulo oblongo, quod cum foliolo, crasso, albicante, intusque subrubescens involucri è radice exsurgit, suntque *gemmæ* flavescentes capitulo circumpositæ, quarum inferiores majores, superiores minores: illis deciduis caulis, foliis vestitus, prodit. Tempore pluvioso tantum reperitur, æstivo cum inferiori parte



parte radice emoritur, cujus superior pars, fibris circumdata est & remanet, & denuo in crassam excrescit radicem. *Bulbus* in partes discissus, in sole exsiccat & pulverifatus cum lacte vaccino atrabilariis propinatur.

## T A B U L A 18.

Ex Ceylane plantam hanc consecutus sum, quam etiam in Horto Medico excolui, in illius Catalogo à me vocatur *Arum Polyphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ceylanicum*, *caule glabro*, *viridi diluto*, *maculis albicantibus notato*, *majus & elatius*.





*Arundinaceae*  
(1720)



*Milenshena Lat.*

മുളെഴുക്കു മരം *Mal.*

مُولِكَةُ جُهَنَاءَ *Arab.*

कात्रकोरुडु *Brum.*



## MULENSCHENA.

## TABULA XIX.



**S**pecies *Schena*; lingua Bramannum *Caleri-Surno*, cæteris elatior, ad altitudinem ferme quinque pedum assurgens, maxima ex parte cum *Schena* conveniens; sed *radix* grandior est, *caulis* crassior, pene in plures ramos bivaricatus, numerosioribus foliis vestitus; in cortice, qui exterius viridi dilutus, albicans, undulis, viridifuscis perfusus, pulchrè variegatus, densis asperisque & extuberantibus gemmis obsitus, incisus uberiolem aquæ copiam exstillans; linguam acerrime pungens & lancinans. *Radix* contrita & cum capræ lacte assumpta, vires corroborat.

## TAB. 19.

In Catalogo Hort. Med. Amstelod. à me vocatur *Arum Polyphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ceylanicum*, caule aspero, maculis viridifuscis, & virididilutis albicantibus pulchre notato. Ab Hermanno in *Prodrom. Parad. Batav. Arum Polyphyllum*, *Dracuntium* & *Serpentaria* dictum, folio ramoso, Paonia instar, caule aspero, *Ceylanicum*.



*Nelenschina major* Lat.

നല.യെന Mal.

نَعْلَمُ جَهَنَامُ Arab.

സകുtram.





## NELENSCHENA MAJOR.

## TABULA XX.

**S**Ecunda species *Schena*; Bramannes dicunt *Cayeri-Surno*, nascitur in arenosis, udo maxime gaudens solo, altitudine pedis. *Radix* alba, pugnum crassa, densa, aquea, plurimas albicantes & barbatae fibras, quæ postmodum flavescent & in annulos corrugantur, emittens, linguam acerrime urens, ad propagationem sui similis plantæ, novos ex se oculos edens. *Cauliculi* plures ex radice proveniunt, teneri, rotundioli, interius striati, virides, ad radicem albicantes ac follicosi, quibus folliculis se mutuo involvunt, spithamam plus minus longi. *Folia* è summitate caulium protendantur, oblonga, ligonem oblongum ac rotundo cuspidatum, referentia, rotundis oris in cuspidem contracta, tenuia, plana, viridi fusca, in parte adversa maxime nitentia. *Costa* media cum transversis in adversa parte nonnihil eminent. *Flores* in propriis cauliculis, qui inter foliorum caules ex radice exsurgunt, videntur, rotundi, virides, venulis in longum striati, intra folliculum caudatum *stylum* oblongum recondentes, cujus pedi circumponuntur; illorum petala albicant, antè bifida, interiora versus inflexa, quorum ora rubrum referunt colorem. *Semina* in inferiori parte pedis styli, qui plurimis nodulis concinne ad se invicem positus est circumdatus, è nodulis erumpunt, oblongo rotunda, primo viridia, ea parte qua extra nodulos emittunt, contractiora & albicantia. Non nisi tempore pluvioso hæc planta reperitur. *Bulbus* in pulverem redactus, cum butyro & saccharo sumtus alvum adstringit.

## TABULA 20.

Species est *Ari minoris*, & forsan *Arum minus Ceylanicum Sagittariae folio*, Herman. Prodrum. Paradis. Batav.



*Katú-schéna* Lat.

കാട്ടുമരം mal.

فقطو حجناء arab.

सऊल brm.





## KATU-SCHENA.

## TABULA XXI.



**T**ertia species *Schena*; Bramannum lingua *Cajuro-Surno*, nascitur in arenosis ad altitudinem duum pedum. *Radix* duriola, ruffa, fibrosa, unicum emittens caulem, & duum ferme digitorum transversorum intervallo, inferiora versus, brevem demittens pedem, cui nova radix adnascitur, quæ, priori emortua, ad propagationem novæ remanet plantæ. *Caulis* simplex est, viridi dilutus, striatus, aqueus, in nullos cauliculos divisus, inferius, intervallo trium quatuorve transversorum digitorum albicans & extuberans, supra extuberantiam tenuior; tria ex illius summitate prodeunt *folia*, quorum duo lateralia in duas majores lacinias, ad quas minores adhuc lacinie appendunt, divisa sunt, rotundiolis oris, in cuspidem contracta, tenuia, mollia, in utraque parte viridi diluta, linguam urentia. *Costa* media cum laterali- bus viridi diluta & albicans, in adversa parte eminent, rectam striat. Floribus destituitur. *Bulbus* contritus & in decocto cum *oleo* datus fluxum sistit hæmorrhoidum; cum *lacte* acido assumptus appetitum excitat.

## TABULA 21.

*Katu-Schena*, quasi diceret *Schena Sylvestris* à me vocatur *Arum Malabaricum minus polyphyllum*, radice *globosa*.




Weli-ila Lat.

வெலி-இலா Mal.

Fero

तेरो him.

وعلی Arab.





## W E L I I L A.

## T A B U L A X X I I.



Lanta est aquatica. *Radix* crassa, fibris densis, longis, ruffis, capillatis, in orbem vestita, hinc inde à latere fibras oblongiores, crassiores, geniculatos, ad novæ plantæ productionem, emittens, intus carne albicante, densa, succosa. *Caules* è radice exeunt plures, virides, alii in quorum vertice folium insidet, alii in vertice florem gerunt, omnes fungosi, tubulosi, molles, teneri, intus albicantes, aquei, incisi liquorem nonnihil viscosum exsudantes; illi in quibus folia videntur, ab una parte crassiores sunt, maxime ad radicem, ubi candidi sunt coloris, versus folium sensim extenuati, superius circa fastigium rotundi, paulo inferius ab una parte late ac profunde excavati, intra cavitatem, tanquam thecam, caules florigeros recipientes, qui rotundi, nonnihil plani ac tenuiores, æquali ferme crassitie, non tam alti, membranoso, tenui, albicante & transparente involucro, quod exterius duobus limbis obsitum est, circumdati. *Folia* oblonga sunt & prægrandia, anteriora versus sensim in cuspidem contracta, à postica parte, versus quam se latius exporrigunt, utrinque in cuspidem protensa, sinu seu angulo, inter duos cuspides, ceu pedes folii, profunde excisa, in oris limbulo circumdata, densæ & subtilis texturæ, mollia, superficie valde æquali, plano, viroris in recta parte vividi, pleni, subcærulei, in adversa magis clari, saporis adurentis, sed cocta in eduliis. *Costa* cum lateralibus in adversa parte quam maxime eminent. In cacumine priorum caulium, in theca seu involucro flavo rubescente, ceu croceo, spithamam ferme longo, involutum ac reconditum est *capitulum* oblongum, crassiusculum, duriolum, globulis, seu gemmulis condensis, flavorubescens ceu croceis, in oris dentatis, obsitum;  
in



in collo capituli, quod brevius est & crassius, ac theca viridi extuberante reconditum, *gemmae* planæ majores ac irregularis formæ, infra globulos flocculosos, condense ordine resident, illæ fructus sunt primordia, & cum flosculis simul proveniunt; suntque hæ *gemmae* in collo primum in totum candidæ, dein, cum magis extuberant, virides, quo colore in una parte tinguntur, vertice adhuc albicante, quædam citiores, aliæ tardiores, adeo ut gemmulis candidis hinc inde virides interpositæ conspiciantur; ubi maturuere complanatæ sunt, in medio vertice umbilico parvo notatæ, coloris ex flavo intensius rubescentis ac aurancei, molles, succulentæ, suntque tunc saporis subdulcis, & in eduliis adhibentur. *Capitulum* medium seu *stylus*, uti & fructuum *gemmae* immaturæ, saporis adurentis; gemmis hisce maturescentibus, capitulum à collo decedit. *Semina* in singulis gemmis ceu fructibus novem, decem, plus minus recondita sunt, rotundo oblonga, cuspidata, ex albicante subrufa, parum nitentia. *Folia* trita, affata, noduloque implicata, fotum exhibent, partibus, ex nervorum compressione, stupore affectis, conducens; *Rasura fructus*, rubrarum *formicarum* ovis permixta, idem præstat. *Bulbus* radicis sanguifluæ medetur gonorrhææ.

## T A B U L A 22.

Possit appellari hæc planta *Arum palustre Malabaricum*, folio *Nimphææ*, radice *arundinacea*.



*Karin-pola* Lat.

കരിമ്പട്ടം Mal.

فخاريچة Arab.





## K A R I N - P O L A.

## T A B U L A X X I I I.



Et hæc planta aquatica, cujus *radix* oblonga, crassa, carne albicante & aquea, fibris oblongis, rotundis, albicantibus crassis instructa. *Caules* quibus folia insident, omnes ex radice exoriuntur, interius nonnihil plani, maxime circa pedem, superiori parte strictiores, *costam* foliorum constituentes, viridi fusci, dilute rubescentes, intus fungosi & aquei, viroris in recta parte saturi & nitentis, in adversa dilutioris. *Folia* oblongo rotunda sunt, in cuspidem desinentia, in oris nonnihil crispata, mollia, lenia, superficie plana & glabra, venis, ex *costa* media oblique ascendunt, striata, illa crassa est, altum in recta parte eminens. *Flores* in propriis caulibus, qui & ex radice oriuntur, ac virides, fungosi, aquei, nonnihil plani sunt, superne collo crassiole turgentes, ac ibi rubescentes proveniunt, ampli, cochleatim quasi turbinati, cuspidem intorto, carnosus, exterius scabri, purpureo rubri, interius rugosi, rubrosanguinei. Inferius ex globulo rubescente glomulato, in fundo colli sito, exsurgit *stylus* candidus, *capitulo* flavo, oblongo, granulato nodulatus, per theculam capitatam, fungosam, rubescentem & rugis obsitam, in medio hiantem, se transmittens. *Globulus* qui, floribus deciduis, in fundo colli apparet, rubescit, spiris instructus, juxta spirarum tractum granulis eminentibus, superne planis ac rufescentibus, obductus. In hoc *semina* in numerosis includuntur cavernulis carnosis, viridibus, proxime ad corticem recondita, in singulis cavernulis unum, oblongum, primum albicans, inferius rubescens, dein in totum rubescens, transversim in globulo in longitudine situm, stylo carneo albicante circumpositum. Balneum ex hac planta præparatum omnem corporis æstum reficit.

## T A B U L A 23.

Est & hæc species *Ati.*

P. XI.

M

P O N.



Pongati Lat.

పంపాక మల.

پانگاطی Arab.





## P O N G A T I.

## TABULA XXIV.



Lanta aquatica, cui *radix* valde fibrosa, albicans. *Caulis* è radice exfurgens aqueus, fungosus, viridi dilutus, novos caules à latere emittens, intus larga cavitate, corculo viridi fusco, ex quo versus corticem membranacea excurrunt intersepimenta. *Folia* pedunculis viridi dilutis interius planis, cauli appendent, oblongo angusta, in cuspidem stricta, languida, mollia, tenuia, lenia, viroris in recta parte saturi, in adversa clari, ubi numerosis eminentibus nervis, ex *costa* media, striantur, saporis ingrati. *Flores* in cacumine caulium plures congregati videntur, in capitulo oblongo, gemmæ sunt rotundæ, quæ apertæ pentapetalæ sunt & candidæ. Illis succedunt *globuli* seminales rotundi, virides, aliquo modo cuspidati, intra florum petala, ferme inclusi. *Semina* in illis arenacea, numerosa, conferta congerie, instar piscium seminis, in superficie viridis globuli, qui intersepimento medio bifidus, confita. Inferiores florum gemmæ se prius aperiunt, superiores tardius. De viribus altum est silentium.

## TABULA 24.

Cum aliis plantis aquaticis ne minimam quidem habet convenientiam, ita ut plura de illa dicere non consultum duxerim.





*Kurka* Lat.

कुक म.

*Kurka*

कुक ब्राम.

قورقا Arab.



K U R K A.

## T A B U L A X X V.



Ascitur in arenosis. *Radix* rotunda, bulbosa, valde fibrosa, capillata, in fibris bulbis novellis instructa, intus densa, aquea. *Cauliculi* quadrangulati & viridi clari. *Folia* ex lateribus cauliculorum, geminata & ordine decussato, proveniunt in petiolis longis, planis, crassiolis, interius sulcatis, ac nonnihil lanuginosis, oblonga, rotundiola, exigue ferrata, in margine pilosa, pilis minutissimis & hirsutis obsita, crassiuscula, mollia, viridia. Ex *Costa* media costulae laterales, oblique anteriora versus, excurrunt, venulis, quae folium cancellatim pertexunt, comitatae, rectam partem striantes, in adversa eminentes. De viribus nihil constat.

## T A B U L A 25.

Plantam hanc ex Ceylone consecutus sum sub nomine *Jusala*, nullos fert flores, propagatur per appendentes tuberes, perinde ac *Glans Terrestris*, atque etiam eodem modo comeduntur.



*Ambel* Lat.

अम्बल Mal.

امبل Arab.

कमळ Bram.





## A M B E L.

## T A B U L A X X V I.



*Ambel* variæ sunt species, *Arêca-Ambel*, *Cit-Ambel*, *Nedel-Ambel*, *Ottel-Ambel*, suntque omnes plantæ aquaticæ. Prior lingua Bramannum *Saluca* dicitur. *Radix* albicat, fibris fistulaceis albicantibus, sapore aqueis, vestita, ad propagationem novæ plantæ radicem, quam *Kelangu*, vocant, proferens, illa palmam longa evadit, crassiuscula, exterius nigricans, intus albicans, saporis aquei & subastringentis, in eduliis adhibetur. *Caules* rotundi, fistulosi, simplices, sine nodis, viridi diluti. *Folia* & *flores* in propriis proveniunt caulibus, ac illorum summitatibus insident. Illa superficiei aquæ incumbunt, oblongo rotunda, rotunda anterius ora, teneriora autem, rotundo obtuso cuspide, postica parte, qua ex caule longe excurrunt, recta incisione usque ad caulem ferme discissa, in margine rotundis denticulis arcuatim excisa, in interiori superficie plana, glabra, in recta parte viroris vividi & nitentis, in adversa coloris rubri seu jecorini; in exteriori *costam* habent inter mediam, crassam, altum eminentem, ramulos transversos hinc inde emittentem, quæ se iterum in numerosa dividunt brachia, & in dentium apices ramulos immittunt, utrinque quinque. *Flores* qui aperti extra aquas emicant, veluti rosæ sunt, multopetali, petalis oblongo rotundis, angustis, anterius in cuspidem leniter contractis, coloris candidi & rosaceo diluti, in exteriori serie petala majora sunt & oblongiora, colore rosaceo, interius diluto & albicante, interius pleniori. Denso numerosorum longiorum *staminum* ornantur penicillo, quæ latiuscula, plana, flava, *stylo* medio brevi, lato, rotundo, in superiori parte latiori, plano, in orbem circumposita & versus illum inflexa, quorum illa in exteriori serie præ cæteris eminent,



magis surrecta & minus inflexa; interiora & stylo proxima, non tam longa, versus stylum magis excurvata; *stylus* superius in sua basi rosa insignitur, constans ex staminibus flavis, brevioribus, maxime inflexis, ac versus centrum contractis; exteriora folia, quæ flores in gemmis includunt, forma quoque oblonga sunt, florum petalis similia, exterius coloris viridis & venis rubescentibus in longum striata, quorum ora etiam rubent, interior pars dilutior est & albicat. *Gemmæ* rotundæ sunt & cuspidatæ. *Semina* in stylo consita sunt numerosa, intersepimentis membranaceis ac plicis a se invicem, in propriis cellulis sejuncta, parva, rotundiola, primum albicantia, sed matura ut *Nasturtii*, aut fusciora.

A R E C A A M B E L.

**F** St & alia species *Areca Ambel* dicta, cujus florum petala paulo majora sunt, coloris minus rosacei, magis candida; etiam *stylus*, cui *stamina* flava circumposita sunt, in basi consignatus est rosa plana, conformata è costulis flavis, quæ ex nodulo medio, qui in centro basis est, ad rotundam ejus orbitam excurrunt. Prioris ut & hujus bulbosa *radix* in decocto pro *dysuria* propinatur. *Semina* ardorem ossium reficiunt, cum sacharo nempe condita & comesta; folia cum illis *Ottel-Ambel* simul trita & cum *butyro* cocta errhinum præbent pro oculorum doloribus.

T A B. 26.

Omnes hæc plantæ species sunt *Nymphææ*; prior hæc appellari posset *Nymphaa Indica*, flore candido, folio in ambitu serrato.



## CIT-AMBEL.

## TABULA XXVII.



*It Ambel*, quasi diceret *Ambel minor*; secundum *Bramannes Casturi Camalla* cum priori convenit, estque tantum minor species, *caulibus* tenerioribus, *foliis* minoribus ut & *seminibus*. Est & alia species ejusdem nominis, in eo solum differens quod *florum petala* vel *cærulea*, vel *rubra*, vel alterius sint coloris. *Flores triti* in decocto pro *dysuria* adhibentur; cum *Zaccharo sumti vomitum* sistunt, *tussim* mitigant; *semina* cum *Zaccharo* usurpata conveniens pro *diabete* sunt medicatum.

## TABULA 27.

*Nymphaea* hæc mihi est *Malabarica minor*, folio serrato.






Nedel ámbel Lat.

നെൽകെലുവർ Mal.

نجد بنجد عرب.

सुपिकजातं Bram.





## NEDEL AMBEL.

## TABULA XXVIII.



**T**ertia species *Ambel*, lingua Bramannum *Commodu*. *Radix*, quæ & ad propagationem minorem edit, rotundis, fistulosis, & albicantibus est vestita fibris. *Caules* è radicibus exsurgentes rotundi sunt & fistulosi, in vertice folia gerentes, quæ superficiei aquæ incumbunt, alii illorum simplices sunt, enodi, alii in supremis partibus, nonnihil infra folium quod in vertice videtur, nodulo interstinguuntur, ex quo plures transversos cauliculos emittunt, quosdam crassiores & longiores, quorum summitatibus folium, quosdam tenuiores & minus longos, quorum summitatibus flores insident. *Folia* ipsa minora sunt quam illa *Citambel*, rotundiori forma seu minus oblonga, ad petiolum rotundis oris, non vero rectis, ut *Ambel*, incisa, *costulis* minus crassis ex petiolo striata, inæquabili ora, non autem denticulis arcuatim instructa. *Flores* extra aquas aperti emicant, in totum candidi, pentapetali, petalis oblongo rotundis, cuspidatis, tenuibus, stelliformiter expansis, interiori parte ab uno latere, alio petalo, quod è medio, lacinia instar, producitur, obtecta, interius filamentis densis, candidis, longiusculis in totum obsita. *Stamina* in illis decem, parva, tenuia, *apicibus* flavis & striatis dotata, illorum quinque supra cætera eminent, & cum illis *capitulum* in medio viride, cuspidatum, *capsulam* *seminalem* efficiens, in summitate nodulo parvo quatuor gemmularum ornatum. *Calyx* pentafolius est, quæ parva, oblongo angusta, cuspidata, viridi clarissima. *Florum gemmæ* rotundæ sunt & cuspidatæ. Post flores capitula seu *gemmæ* *seminales* se produnt, illæ cuspidatæ sunt, numerosa in se continentes *semina* rotunda, quæ primum albicant, sed matura colorem ut  
se-



femina *Nasturtii* referunt, perinde ac illa *Ambel*. Integra planta trita & cum *butyro* cocta & intus sumta, antidotum est contra morsum serpentis *Cobra Capella* dicti.

## T A B U L A 28.

Hæc *Nymphæa minoris* affinis *Indica*, flore albo, piloso.






*Tsjeroea - citámbel* Lat.

കുമാരമല Mal.

Cumúdí

कुमदा Bram.

جديظا وطله Arab.





## TS FEROEACIT AMBEL.

## TABULA XXIX.



Inor species est *Ambel*; folia & caules & radix, omni ex parte cum illis *Cit Ambel* conveniunt. *Flores* parvi sunt ac simplices, pentapetali, oblongo rotundi, stelliformes, interius in singulorum petalorum medio, foliosa lacinia secundum longitudinem alati, in orificio capillis flavis obsiti. *Stamina* in illis quinque brevia, quæ inter petalorum interstitia exsurgunt, *apicibus* surrectis ac albicantibus dotata, *staminulis* quinque brevioribus interpositis, cum quibus ex medio orificio *globulus* viridis, cuspidatus, styli instar, se prodit. *Calyx* pentafolius est, quæ folia florum petalis decussatim interponuntur. Ex *bulbo* radice in aqua, vino adusto butyroque ex cocto, linimentum præparatur antihæmorrhoidale. Ex eodem cum *cancris* terrestribus in oleo frixo ἀνδριον conficitur medicamentum, contra molestum capitis dolorem, temporibus nempe illinitum. Ex eodem cum utroque *sandalo* & *lacte* fit potio ad corporis æstum restringendum.

T A B. 29.

*Nymphaea Indica minima, flore flavo.*



*Tamara* Lat.

കടലാ Mal.

فانجرا Arab.

पद्मम् Bram.





## T A M A R A.

## T A B U L A X X X.



Res hujus plantæ sunt species, *Tamara*, *Bem Tamara*, *Culy Tamara*; prior Bramanni-  
bus *Pada Mactu* dicitur, planta aquatica. *Radix* profunde demissa, crassiola, nonnihil  
dura, fistulosa, fistulis latis pervia, albicans, inferius nodosa, è nodulis tenues fibras in or-  
bem emittens, subtus radices, è quibus, tanquam pri-  
maria radice, novi prodeunt *Caulis*; simplices hi sunt, rotundi, fistulosi, virides, punctis aspersi. *Folia* singula suo insident cauli, prægrandia, rotundiola, versus interiora inflexa, crassiuscula, mollia, *Veluti* instar lenissima, in recta parte viridi fusca, aut oblique aspecta hiali, ceu ex viridi cærulei coloris, in adversa viridi diluta. *Costæ* quæ viridi claræ & nitentes, ex caulis summitate, veluti radii è centro, exeunt, quæ postquam ad certa intervalla, singulæ in duos ramos bis terve sunt divaricatæ, proxime ad oras in se invicem arcuatim & formicatim deferuntur; inter has, in adversa parte tantum eminentes, venæ transversæ mutuo inoculatæ conspiciuntur. *Flores* qui caulibus propriis insident, prægrandes sunt, petalis constantes confertis, coloris rosacei albicantis, odoris grati *Anysum* spirantis; *petala* ipsa, oblongorotunda sunt, rotundis oris in cuspidem contracta, venulis, ex unguiculis, in longum striata, coloris rosacei, in superiori parte magis saturi; exteriora majora sunt ac latiora interioribus; hæc in duos, tres, pluresve inciduntur cuspides, & *staminulis* ornantur flavis, quæ cum *apicibus* ceu nodulis candidis, ex angulis incisionis emicant. In medio florum densus est *penicillus* longorum, planorum, croceorum *staminum*, in summitate oblongis & candidis nodulis ornatorum, in-  
teriori parte futura candida, ex qua nodulus, itidem candidus, producitur, striatorum; ille circumpositus est *stylo*



rotundo, luteo, in summitate plana & lata superficie, inferiora versus contractior, intus fungosus, ad basim superiorem in suis cavernulis seu cellulis *semina* recondens, quæ oculis ex flavo nitentibus, gemmularum instar plano rotundarum, extra illam emicant; ipsa semina primo sunt albicantia, subflava, formæ cylindricæ, deinde ad ellipticam formam accedentia, & cellulas suas dilatantia, magis magisque ex basi superiori styli extuberantia, nigra, furda. *Radix* trita & saccharo mixta in formam conditi exhibetur pro hæmorroidibus. *Succus* è floribus extractus, & cum Oleo *Zirgelim* assumptus, inmodicum mensium sistit fluxum.

## T A B U L A 30.

*Tamera* hæc à nemine unquam est descripta. Mihi erit *Nymphaeæ affinis Malabarica*, flore amplo, rosaceo albicante colore.





*Bem-tamara* Lat.

വെങ്കടമ *Mal.*

بنظيمة *Arab.*





## B E M T A M A R A .

## T A B U L A X X X I .



**P**Lanta itidem aquatica, in eo tantum à *Tamara* differens, quod *flores* sint paulo ampliores, illorum petala candida, odoris non nihil vegetioris. Post accurationem observationem sequentia addenda duximus; scilicet quod folia *Tamara* & *Bem Tamara* duorum in diametro sint pedum; caules fistulosi, proxime ad radicem aquei, in partibus superioribus intus lactei, filamenta ex illis albicantia, tenuissima, numerosa, velut araneorum telæ, ex lacteo isto succo nendo educantur & in longum protrahantur, satis firmæ. Ex caulibus foliosis tantum quatuor, tubulis majoribus, pervii sint, numerosis minoribus tubulis ad latera instructi; Caules hi proxime ad umbilicum ceu centrum decisi; costæ singulæ, quæ ex umbilico viginti & una numerantur, & tubulis caulium lateralibus respondent, tubulacea cavitate pervii sunt; sed in medio umbilici dissecti, caules nempe, crux carnosâ apparet, cujus una pars superior versus partem folii contractior est. Præterea septem caules floriferos, etiam latis tubulis esse pervios, & in illorum medio *stylum*, ex quo tubulorum intersepimenta exsurgunt, atque & ille unico tubulo in medio pervius est. *Bulbus* cum *butyro* in unguentum redactus omnia oculorum vitia corrigit; Idem cum *Zingibere* & *Coriandro* in *butyro* contritus, pro hæmorrhoidibus applicatur.

## T A B U L A 31.

A me vocatur *Nymphaea affinis Malabarica*, folio & flore amplo, colore candido.

P. XI.

Q

KOD.



*Kooda-pail* Lat.

കൂട്ടപ്പൈല mal.

*Zelo*

सेकोर bram.

قفاً يفتل Arab.





## KODDA PAIL.

## TABULA XXXII.



Lantula aquatilis & natatilis, transversis, aqueis & albicantibus repens caulibus, qui oblongas, albicantes, capillatas, in densa fascia, emittunt fibras. *Folia* plura congregata ad radicularum fascias exfurgunt, oblonga, ad latera rectis oris, in vertice ora rotunda, crispata, una cum caulibus admodum fragilia; viroris hiali, inferius albicantia, anterius, nervulis oblongis ramosis striata, exterius plicis eminentibus in longum crispata, tenuiter villosa, inferius ad radicem pilosa lanugine vestita, carnosula, crassiola, tubulis parvis, rotundis, intus pertexta. *Flores*, odoris expertes, ex mediis prodeunt foliis, quorum petala tenera, crispata; unum illorum oblongum est & albicans, interius cochlæato cavum, anterius strictius, in medio superioris partis fissum, utrinque in oris ad latus plica annulari, interius eminente crispatum, ex cujus medio, supra plicaturam, parvus & erectus exfurgit *stilulus*, qui superne in orbem, sex albicantibus est dotatus *gemma*, ad exortum viridiusculo foliolo rotundo, quod inferius duabus laciniis veluti auriculis, est instructum, quasi collari succinctus. *Collum* florum oblongum est, pilis oblongis albicantibus capillatum; ex ejus orificio *gemma* emicat cuspidata, albicans, viridi diluta, *nodulo* aqueo albicante dotata, in qua semina visuntur. *Gemmae* seminales oblongorotundæ evadunt, in cortice, vitri instar pellucidæ, petiolis transversim insidentes; uno latere, quo cælo obversæ, marcescenti, florum petalo transversim adhærentes, intus aqueo humore repletæ. *Semina* in illis sex oblonga, viridiuscula, cortici *gemmae*, circa illam partem, qua petalo adhærent, interius insidentia. *Folia* cum *Oryza* in lacteo *Nucis Indicæ* succo lævigata medicamentum præstant antidysenter-



tericum. Cum aqua rosacea & saccharo data, tuffim  
 graviolem & purulenta phlegmata corrigunt, hæmopsiam  
 inhibent. Radix cum cumino in lacte vaccino trita &  
 epota alvum promovet, tenesnum lenit, lumborum &  
 hypogastrii dolores emollit. Idem præstat si cum Calamo  
 Aromatico & aqua calida assumatur.

## T A B U L A 32.

Planta hæc aquæ innat perinde ac *Stratiotes* | milari possit. Vocari posset *sedum Indicum palustre*,  
 seu *Aloës Palustr.* Bauh. in Pinac. à nemine unquam | *foliis latissimis, crispis, floribus albicantibus pi-*  
 est descripta neque conspiciem habet cui affimi- | *lofis.*






*Panovér-tjeraúá* Lat.

പഞ്ചവർഷിതം Mal.

Zelo

इळो Gram.

بَعْنَاوَجِرْجِرَاوَعُ Arab.





## P A N O V E R T S J E R A U A.

*Tropaeum malabaricum  
L. 176.*

## T A B U L A X X X I I I.



Lanta est aquatica. *Caulis* geniculati, super fundum repentes, aquei, viridi albicantes, ex geniculis radículas seu fibras duas pluresve emittentes, filamentis viridibus condensè vestitas. *Folia* in caulibus petiolis oblongis, aqueo albicantibus, superius ventre plano turgescentibus ac pilosis, proveniunt lata, cuspidata, ad oras acutis, profundis crenis incisa, posteriori parte ad petiolum recta & æquali ora, crassa, spissa, in interiori superficie valde plana, admodum glabra, in exteriori *costis* crassis, viridi albicantibus, ramosis, è *Costa* media exeuntibus, & in venarum cuspides incurrentibus obsita, coloris sanguinei, nullius saporis. Vetusior facta planta, ex vertice caulium in communi pede, folia numerosa ac ampliora, dense in unam quasi fasciam, rosæ referentes formam, congregata proveniunt, pluribus radicibus infra dictam fasciam interius dimissis. Extra usum in Medicina est.

## T A B. 33.

Cum non plenarie hæc planta sit descripta; de flore enim & seminibus nulla mentio, nihil certi hic apponi poterat, nisi quod pro *Hedera palustris* possit haberi.



Narú Kilá Lat.

നരകില മാ.

Polo

पोलो ब्रह्म.

نعرو قبيلا Arab.





## NARUKILA.

## TABULA XXXIV.



**P**Lanta nascens in aquosis. *Radix* nigricans, fibris vestita. *Caules* rotundi; aliquantulum complanati, glabri, virides, interiori superficie cavi, intra cavitatem teneres excipientes caules, superiori parte unico nodulo interstincti, fungosa intus, albicante, aquea medulla. *Folia* verticibus caulium insident, in singulis, unum, ampla, oblongorotunda, cuspidata, venis subtilissimis paralellis, ex *costa* media, quæ in recta parte eminent, ad oras striata, viroris saturi & nitentis, in adversa, diluti, surdi, foliis *Kattu bala* quam maxime similia sunt, sed minora. *Flores* in caulibus propriis suis petiolis proveniunt, in illorum vertice quasi fascia insidentes, ex hiato aperto caulis, qui circa geniculum videtur superiorem, & intra quem prius inclusi fuerant, tanquam vaginam seu theculam infra folia emittentes, prodeuntes ex calycibus oblongis, grandiusculis, viridibus ac rubescentibus. Ignoti usus.

## TABULA 34.

Et hæc descriptio imperfecta est, ita ut ex illa nihil concludi possit, atque ideo lubens accuratius iudicium aliis relinquo; ego dicerem. *Canna* seu *Arundinis Indicae* affinis, flore globofo.



*Bela-pola* Lat.

ബളക്ഷദ്ദു Mal.

Te' Te' Arab.





## B E L A P O L A.

## T A B U L A X X X V.



**P**Lanta itidem aquatica. *Radix* bulbosa, (bulbi rotundi sunt, primum albicantes, ex inde virides, intus carnosus, carne succulenta & nonnihil viscida, albicante, viridi, ipsi bulbi se mutuo propagantes, ita ut tres quatuorve simul juncti conspiciantur) fibras oblongas, crassiusculas, plurimis filamentis tenuioribus vestitas, primum albicantes, dein rufescentes emittens. *Caules* ex radice exsurgentes rotundi, simplices, foliis vestiti, interioribus albicantes, succulenti & viscidi. *Folia* quæ caules investiunt, ac supra se mutuo pedibus cavis circumvoluta, oblongo angusta sunt, in cuspidem stricta, cubitum longa, quatuor transversos digitos, sed in medio plures, lata, venis subtilioribus in longum striata, lateribus versus inferiora parum clausis, viridis in utraque parte saturi. *Costa* in adversa parte eminent crassiuscula, viridi albicans, à latere duæ tresve minores conspiciuntur, rectam partem quasi sulcis striantes, odore gravi, sapore nonnihil porraceo; exteriora folia quæ caulem circa radicem investiunt, minora sunt & albicant. *Flores* in summitate caulium fasciati proveniunt, pedunculis viridibus, nitentibus, surrectis, striatis crassis, in superiori parte magis exturgescentibus, ac leviter incurvatis, oblongo, angusto, viridi folio, inferius succinctis; hexta petali sunt, illorum quinque oblongo angusta, uniformia, in totum candida; sed tria exteriora magis angusta, exterius nitentia, minus candida; sextum latius est & cochleato cavum, oblongum, ad ventrem petioli situm, folio exteriori medio, quod ex dorso prodit, oppositum, exterius in totum candidum, anteriori ora albicans, infra oram in medio, duabus oblongis, latis, flaviusculis striis signatum, ad strias rosaceo rubescens, inferius ex medio venis, tenuiter rubescentibus, oblique versus oram striatum. Ex inferiori orificio *lingula* exsurgit, oblique surrecta,



recta, candida, crassiola, aliquantulum cuspidata, cujus plana pars, petalo cochleato cavo est obversa, infra cuspidem *gemma* crassa, flaviuscula dotata. *Flores* in totum male olent, saponis odorem æmulantes. *Gemmæ* florum virides, dein albescentes, ad partem petali cochleato cavi alte exturgentes. *Fructus* oblongi, trigoni, in medio laterum crassa ac altum eminente costa obducti, cortice crasso, aqueo, viridi saturo, nitente, saporis fabacei, sylvestris ac viscidum, in medio farinaceo, ruffo pulvere repleti; animadvertendum porro quod florum petala ipsa germina ac primordia sint fructuum; qui illis *Marabára* admodum similes sunt. *Bulbus* cum aqua *Oryzæ* in linimentum præparatur adversus phlegmonodes, tumores & abscessus.

## T A B U L A 35.

Mihi hæc planta est *Gladiolus Indicus palustris latifolius*, flore albicante.





*Elapola* Lat.

உலகரகு Mal.

اليل الجلا Arab.





## E L A P O L A.

## T A B U L A X X X V I.



Ascitur in arenosis. *Radix* bulbosa, infe-  
 rius fibris candidis vestita, intus carne densa,  
 humida, viscida, durioribus carnosus fibris  
 pertexta, odore gravi. *Folia* plura ex radice  
 pedibus oblongis, rotundis, theciformibus,  
 in quibus alia teneriora includuntur, ex-  
 surgunt oblonga, in cuspidem stricta, nitentia, intus  
 venis subtilibus in longum striata, in adversa parte quinque  
*costulis* lignosis eminentibus instructa, quarum media  
 crassior, omnes glabræ sunt, rectam partem striantes,  
 odoris gravis. *Flores* in caulibus proveniunt simplicibus  
 rotundis, glabris, viridibus, geniculatis, è radice exsurgenti-  
 bus petiolis, foliis oblongoangustis, cuspidatis, circa genicu-  
 los vestitis, intus carnosus, fibris densis, lignosis, intra carnem  
 humidam pertextis; flores ipsi superiori parte caulium illic  
 loci ubi minus lignosi, insident, ad exortum foliolo parvo,  
 oblongo angusto, cuspidato, viridi, inferius succincti,  
 oblongi, cyathi seu campaniformes, exterius tribus emi-  
 nentibus futuris in longitudine perducti; interius ab ori-  
 ficio ad medium usque cærulescentes, exterius albicantes.  
*Stylus* in medio eminet nigricans, extra orificium *nodulo*  
 flavo dotatus. *Fructus* qui cacumini caulium omni ex parte  
 insident, oblongi, triangulati, quorum latera, plana, supra  
 & infra strictiores, viridi fusci, glabri, in medio laterum  
 futura crassa, rotunda, viridi, alte extuberante obducti, in  
 vertice *umbilico* eminente ruffo instructi; membrana qua ru-  
 ducuntur carnosus est & crassa, interiori parte viridi flava;  
 nullis seminibus, sed intus *glomulis* lanuginosis, albicantibus,  
 qui deinde ruffescunt, maxime ad angulos repleti; etiam  
 florum petala in fructus excrescunt. Ex *foliis*, *radice* &  
 virente *Curcuma* linimentum præparatur temporibus pro  
 Cephalæa applicandum.

## T A B U L A 36.

Specialis hæc planta est, externa facies cum *Gladiolo* conferri posset, sed flos aliquam cum illo  
*Digitalis* videtur habere convenientem; ego dicerem *Gladioli affinis latifolia*, flore campanulato.



## BELAM CANDA SCHULARMANI.

## T A B U L A XXXVII.



Ramannes dicunt *Arty*, planta est ad altitudinem hominis assurgens, arenoso gaudens solo. *Radix* glandulosa, crassa, albicans, intus densa, subflava, subamara, longas albicantes & tenuiter capillatas ejiciens fibras, tres quatuorve oculos ex se promens. *Caulis* è radice assurgit unicus, pollicem crassus, nodulatus, intus albicans & fungosus, foliis ad nodulos circumvestitus. *Folia* oblongoangusta, tres pedes longa, pollicem, aliquando duos, lata, acinacea, venis in longum striata, ex una parte oræ, quæ inferius est profundior, hiantia, caulem excipientia, & labris arctissime circumplectentia, viroris exterius communis & nitentis, interiori parte, ubi hiant, membrana albicante obducta. *Flores* in fastigio ipsius caulis, vel cauliculorum transversorum, qui ex caulis nodis hinc inde exsurgunt, petiolis teneris, viridiflavescens, pandis, ex uno eodemque nodulo plures, quatuor, quinque congregatim erumpunt, hextapetali, oblongo rotundi, ad petiolum stricti, anteriora versus, rotunda ora in cuspidem contracti, inter flavum colorem notis intense rubris interius variegati; tria petala, quæ breviora & minus lata, tota superficie interius sunt variegata; reliqua tria, quæ paulo longiora & latiora, & prioribus singulis interposita, ex unguiculis ad medium usque variegantur, anterius colore rubro dilutiori; in adversa parte petala flavescunt ad oras tantum rubris notis transparentibus, ac *costa* eminente in medio striata, nullius odoris. *Stamina* in illis rubicunda & surrecta conspiciuntur tria, *lingulis* flavis, surrectis dotata; *stylus* crassior est, rotundus, triangulatus; calyce destituuntur. *Petioli*, proxime ad flores, crassiores sunt & extuberantes, tribus lateribus planis, in medio striatis, circumscripti, *seminum capsulas* efficientes, quæ floribus deciduis ampliantur, &



ex viridi subflavo viridiores evadunt, & in tria seminalia loculamenta mediis distinguuntur intersepimentis. Planta integra cocta & pro lotione corporis adhibita antidotum est contra omne venenum. *Radix* trita & applicata mor- sui serpentis Cobra Capella dicti, medetur. *Folia* cum *Oleo Schirgelim* ab indigenis adhibetur, ad vaccas & jumenta, eduliis venenosis infecta, vel animalibus venenatis læsa, tum intus, tum foras, sumpta & applicata, curanda.

## T A B U L A 37.

Flores hujus plantæ cum sint variegati perinde ut *Flos Tigris Dodon.* alterius autem structuræ, sed quoad formam externam aliquo modo convenientes, & à nemine autem quod sciam ante hæc sit descripta planta, meo iudicio vocari posset, *Gladioli affinis Malabarica, flore flavo, maculis rubris intersperso.*






*Besam-canda-schularmani* Lat.

വെള. കണ്ടു ചുറ്റു മരം Mal.

بحمّشام فحارطاء جبوزلار Arab.

مانی

आमि bram.





*Bellitta-pola-taly* Lat.

മലയാളത്തിൽ *mal*

بجلا طقالي *Arab.*





## BELUTTA POLA TALI.

## TABULA XXXVIII.



Quatica est planta quæ circa fluviorum ripas invenitur. *Radix* crassiola, bulbosa, carnosâ, aquea, ex tunicis quasi super se injectis formata, corculo flavo, fibras crassiores oblongas ex inferiori parte emittens, illæ primum albicant, dein flavescent, saporis aquei. *Folia* ex radice prodeunt, oblonga, gladiolorum instar, in cuspidem desinentia, inferiori parte mutuo theciformiter convoluta, interiori parte clausa, crassiuscula, fungosa, venis in longum striata, viridifusca, ad radicem albicantia. *Caulis* è radice exsurgens plano rotundus, viridi dilutus, ad radicem candens, fungosus & aqueus, in cortice, si à carne deglubatur, interius instar holoserici. *Flores*, odoris expertes, octo vel decem simul ex collo oblongo, viridi diluto, quo, exteriora versus, nonnihil reflectuntur, in fastigio caulium proveniunt, inferius ad exortum crasso pede extuberantes; illorum sex vel octo ordine exteriores sunt, duo interiores confiti, filamentis candidis inferius interspersi, liliacei, pentapetali, angusti, cuspidati, candidissimi, in medio & exterius tenuiter extuberantes, venis in longum striati, exteriora versus in totum reflexi. *Stamina* in illis quinque, oblongo rotunda, *apicibus* oblongis, nutantibus, transversis, croceo rore adspersis, sub rore nigricantibus dotata, de cætero rubropurpurea, nitentia, inferiori parte candida, superiori colli orificio, ad petalorum unguiculos inserta. *Stylus* surrectus, oblongus, rubro purpureus & nitens, è medio florum emicat, inferius candidus, ex pede colli. *Florum gemmæ* oblongæ, strictæ, conicæ, primum ex flavo albicantes, dein magis albescentes, exterius in medio, ubi extuberant, nonnihil rubescentes. Porro notandum quod flores, simul congregati primum folioso involucro, quod



quod in duo se findit cuspidata folia, sint inclusi, constituentibus capitulum oblongum, crassiolum; sed rupto involucro, prodeunt, duobus foliis, quæ exterius viridia, interius candida, ad planum caulium latus inferius succincti. *Fructus* illis *Pola Tali* similes sunt, eodemque modo ex pede colli florum excrescunt; *semina* continent candida, carnosâ, succulenta. Ex planta concisa & tosta bini fiunt noduli, qui utrique maxillæ appositi, spasmodum curant Cynicum.

## T A B. 38.

Hæc *Lilio Narcissus* conspecies est *Tolabo Ceylanensis*, seu *Lilii Ceylanici umbelliferi & bulbiferi*.  
Vide *Herm. Cat. Hort. Acad. Lugd. Batav.* vel forsan

ipsissima, hoc solum excepto discrimine, radicem hujus paulo minorem esse delineatam, quam quidem reipsa sit.





*Soranna-pola-tali* Lat.

വെട്ടുക്കൊട്ടു Mal.

يُغْلَاة طَغْلِي Arab.

काळकादो Bram.





## S F O V A N N A P O L A T A L I.

## T A B U L A X X X I X.



Pecies est *Tali*, Bramannes dicunt *Gola Kondo*, planta trium pedum altitudine, arenosa amans loca, etiam ripas aquarum. *Radix* bulbosa est & albicans, subtus plurimas, albas, fungosas, humidam emittens fibras, saporis aquei & subamari. *Folia* gladiolorum, seu foliorum *Lilii* instar, ex se invicem prodeunt, ad radicem combinata, lata, crassa, in marginem acutam extenuata, minutis ac raris cuspidibus in oris minuta, venis in longum striata, plurimis magnis fistulis seu tubulis (quæ simplici ordine ac serie ad se invicem sunt confitæ, ac mediis membranaceis parietibus ordinate interclusæ;) intus in longitudine pervia. E medio foliorum *caulis* viridis, planus, compressus, intus albicans, fungosus, fistulosus, ex radice exsurgit, in cuius summitate *flores* plures simul, quinque vel sex congregatim, singuli propriis, rotundiolis, viridiflavis petiolis, qui ex nodulo superiori caulis erumpunt, proveniunt, monopetali, oblongo angusti, cuspidati, candidi, quatuor aut quinque ferme pollices longi, unum lati, in longum striati, oris nonnihil interiora versus, clausi, odoris debilis sed grati. *Stamina* in illis sex, longiuscula, maxima parte petalis inserta, purpureo rubra, nitentia, inferiora versus albicantia, *apicibus* grandiusculis, lunulatis, nutantibus, flavo rore conspersis, dotata; *stylus* cum hisce conspicitur tenuis, in totum purpureo ruber, qui per petiolum transmittitur, & ibi ex parte albicat. Deciduis floribus majorem petioli contrahunt virorem, & inferiori parte, quæ circa nodulum est & crassior, in *capsulas seminales* extuberant & turgescunt, adeo ut plures seminales capsulæ congregatim nodulo caulis insideant; suntque hæ, ad petioli figuram, primum oblongo rotundæ, crassitie tantum à reliqua petioli parte differentes, deinde, cum ad justam pervenerint magnitu-



dinem, caule superiori deciduo, rotundæ vel rotundo-planæ, cortice viridi diluto flavescente, venulisque in longum striato, cujus caro intus albicat & fungosa est, tenuiter obductæ. *Semina* pro ratione magnitudinis in illis, tria, quinque, septem continentur, totam capacitatem sub cortice replentia, filamentis quibusdam fungosis, albicantibus, hinc inde, tenuiter intersepta, variæ figuræ; uno latere, quæ cortici proximum, rotundo, aliis planis, coloris albicantis & subviridis; illorum caro albicat & aquea est, etiam sapor aqueus est. Semel quotannis floret, tempore nempe pluvioso. *Radix* bulbosa trita & tosta hæmorrhoidibus apponitur, conducitque apostematibus aperiendis & maturandis; eadem tosta & cani data, dentes illius excidere facit: *folia* tosta *carbunculis* applicata, dolorem ex illis obortum mitigant, ungues excarnificatos sanant.

## T A B. 39.

Inter omnes *Lilio Narcissos* hæc omnium maxima est, à nemine, quod sciam, antehac unquam descripta.





Catulli-pola Lau.  
കാട്ടു കോട്ടി Mal.  
قحط و الحري Arab.  
कोळकादो Bram.





## C A T U L L I P O L A.

## T A B U L A X L.



**P**Lanta sesquipedis altitudine, nascens in arenosis. *Radix* bulbosa est & candida subtus tenues & albicantes ejiciens fibras. *Folia* quæ ex radice oriuntur instar *Lilii* sunt seu gladioli oblongi, in cuspidem desinentia, venulis in longum striata, in medio crasso tergo extuberantia, parum interius clausa. Inter folia, ex radice, unicus exsurgit *caulis* compressus, viridis, spithamam longus, in apice nodulatus. *Flores* propriis cauliculis, in summitate caulis, plures congregati videntur, septem vel octo, ex uno eodemque caulis nodulo simul exsurgentes; in totum candidi sunt, odore debili sed grato, optime conformati, duplici petalorum ordine constantes; in exteriori sex petala sunt oblonga, angusta, surrecta, in cuspidem desinentia, venulis in longum striata, *costula*, in adversa parte parum eminente, instructa, stellam diceres sexcuspidalem; in interiori ordine stella est versus umbilicum campaniformis, duodecim in oris cuspidibus eminens, cui folia exteriora cum ima parte adstringuntur. *Stamina* in illis sex candida, campaniformem ex umbilico stellam interius striantia; singulaque in intermedios cuspidum angulos eo ordine incurrunt, ut duos inter se relinquunt cuspides, sed superiori parte ex angulis eminent, flavis & incumbentibus *apicibus* ornata. *Florum gemmæ* oblongo rotundæ, ex viridi magis magisque albescentes, striis numero sex, quæ in vertice cœeunt, striatæ. *Fructus* eodem modo ut illi *Pola Tali* proveniunt. Etiam *semina* albicant, quorum caro albicat & aquea est, sapor etiam aqueus. Semel quotannis floret, tempore nempe pluvioso. *Radix* in sole exsiccata & in pulverem redacta cum *saccharo* nigro exhibetur pro hæmorrhoidibus; ejus decoctum ex aqua idem præstat, pro lotionem nempe adhibita. Tosta & deintrita apostematibus aperiendis & maturandis super imponitur; addito *oleo* podagræ cum illo perunguntur: *folia* unguibus circumdata, illorum dolores sedant.

## T A B U L A 40.

*Narcissus* est *Ceylanicus*, flore albo hexagono odorato *Hermanni* in *Catalog. Hort. Academ. Lugd. Batav.*




*Katsjula - keléngú* lat.

കഷുലകേളം mal.

*Capúra - catari*

कापुनकरी bram.

قاجيولا قاجانغاء amb.





## KATSJULA KELENGU.

## TABULA XLI.



Ramannes dicunt *Capura Catari* planta nascens in arenosis. *Radix* carnosa, albicans, fibras emittens, & novellis se propagans oculis, odoris fragrantis & aromatici, maxime cum sicca, *Zinziberis* instar, albicante sicca carne, cortice ruffo, rugoso. Duo ex radice *folia*, pedunculis surrectis, latis & cavis exsurgunt, in transversum extensa, ex adverso sita, ampla, rotundiola, inferius sinulo cavo, angusto excisa, crassa, carnosa, glabra, venis subtilibus annularibus, quæ folium intus obscuro tractu subeunt, ex media *vena* striata, viroris in superiori parte saturi & fusci, in inferiori, quæ radici obversa, viridi clari, in oris limbulo rubescente instructa, odoris grati aromatici. *Flores* ex radice inter folia media surrecti exsurgunt, oblongo petiolo ceu collo, tripetali, duo illorum oblongo rotunda & candida, tam interius quam exterius: tertium hisce oppositum, anterius in medio, in duo alia quasi petala est divisum, interius candidum, in medio & ima parte ad pedem purpureo rubrum, exterius candidum, in pede interiore dilute flavescens & viridescens, suntque in totum tribus oblongoangustis candidis foliolis seu auriculis succincti. Ex florum medio *stylus* exsurgit latus, foliaceus, candidus, ad pedem petali purpurei flavescentem accumbens, superne in duas unguas fissus, quæ à petalo purpureo sunt reflexæ. In medio flavus est, intus angusta theciformi cavitate, per quam alius, se transmittit *stylus* candidus, tenuissimus, *gemmula* nodulatus: flores in totum illis *Tsjengeli-nel-Kelengu* non dissimiles sunt. In super observavimus, quod loco floris emarcidi ac decidui, una nocte flos novellus cum petiolo ferme pollicari è radice exsiliat, ocyus ergo nascuntur. *Radix* ficcata in transversas inciditur lamellas, & dividitur. *Bulbus* cum recenti *butyro* in pillulas redactus, asthmaticis datur.

## TABULA 41.

Parem non habet hæc planta; mihi est: *Planta bisfoliata, radice tuberosa, flore tripetalo difformi Malabariensis.*

P. XI.

X

KA



*Katú - kapé Lau.*

കടുകുപുഴി mal.

فخاطو فخابهل Arab.





## KATU KAPEL seu CADENACO.

## T A B U L A X L I I.



**N**Ascitur in arenosis. *Radix* fibrosa, carne intus albicante, filamentis lignosis pertexta, cortice ruffo, saporis aquei. *Folia* ex radice oblonga ad duos exsurgunt cubitos, inferius foliis minoribus investita, exterius convexa, interius cava, viridia, rigida, venis lanuginosis in longum striata, valde crassa & carnosa, carne intus densa, albicante, aquea. *Flores* in propriis proveniunt caulibus, qui ex radice oriuntur rotundis ac petalis investuntur oblongis, tenuibus, extus aqueo rubescentibus, intus aqueo viridibus, illorum superiori parte undique infidentes, bini vel terni simul in uno communi pedunculo, hexapetali, oblongo rotundi, angusti, nitentes, in medio vena striati, collum oblongiusculum est & candidum. *Stamina* in illis sex, oblonga, candida, oblongis, flavis, nutantibus *apicibus* dotata. *Stylus* etiam oblongus est & candidus, ex *globulo* prodiens albicante, inferius in collo sito. *Fructus* rotundi sunt, simplices, vel etiam bini juncti, viridi diluti, quorum duo latera globosa; in quibus unum aut duo reconduntur *semina*, quæ tenera, saporis fabacei. *Folia* trita & in formam boli redacta, adversus ophtalmiam & oculorum suffusionem assumuntur: cum *radice* addito *Allio* ac *Auripigmento* in oleo *Sergelim* decocta, gonorrhæam sanant, si nempe caput cum oleo illo illinatur; *Bulbus* cum *sandalo* citrino & *butyro* bubulino tritus linimentum exhibet, in nervorum contractionibus & ardoribus adhibendum. Tota denique planta oleo *butyro*que incocta omnium oculorum vitia emendat.

## T A B. 42.

Appellari posset hæc planta, *Asphodeli Indicae affinis*, floribus hexapetalis, spicatis.



*Kátú-bása* Lat.

കാട്ടുകവുള Mal.

*Ranakéri*

गानकेकी Bram.

فخاطو وعضاء Arab.





## KATUBALA.

## TABULA XLIII.



Ramannes dicunt *Rana Queri*, planta est ad altitudinem staturæ exurgens humanae, arenoso & udo gaudens solo. *Radix* oblonga, rotunda, corticibus investita, pilis in orbem circumdata, oculata, ex quibus denuo propagatur. *Caulis* simplici pede ex radice exoriens, rotundus est, viridis, geniculatus, ad geniculos foliis arcte vestitus & obvelatus, ex inferioribus geniculis ad radicem, supra foliorum exortum, novos caules emittens. *Folia* quibus caules investiuntur, tenera adhuc, in totum in se invicem sunt convoluta, oblongo rotunda, lata, mollia, plana, lenia, glabra, venis paralellis ex *costa* media crassiori, quæ in adversa parte altum eminent, striata, in totum foliis *Bala* vel *Figueira* similia, qua de causa à Lusitanis *Figueira de Mato* vocatur; viroris in recta parte fuscioris & nitentis, in adversa dilutioris, ex se invicem prodeuntia, ac parte superiori, qua caulem deserunt, patente orificio convoluta, quæ in summitate sunt caulem arctius amplectuntur & nonnihil rubescunt. *Flores* simul proveniunt cum *fructibus* in cacumine caulium, ubi in tres acutos stringuntur angulos, fusce rubescentes, vertici fructus insidentes, illi viridi dilutis, semiuncialibus, angulatis & duriolis petiolis, ex caulium angulis, bini & bini, alternato ordine erumpunt, ac singuli folio follicoso, quo primum cum suo flore obteguntur, ad exortum petiolorum succinguntur. Ipsi flores octopetali sunt, oblongi, difformes, coloris coccini vel venuste miniati, inferius ad unguiculos flavi, petalorum unum



majus, oblongius, latius ac lenissimum est, instar *Veluti*; duo latiuscula sunt; unum notis rubris in flavo colore variegatum; unum in ora oblongo, ruffo eminens apice seu staminula; omnia constricta sunt & non expansa, & hoc, ob arctum calycis orificium quo excipiuntur. *Calyx* è tribus constat foliis oblongis, cuspidatis, rigidiusculis, constrictis, surrectis, quæ rubro fusciora sunt & magis nitentia, intus venulis, versus cuspidem, striata. In florum medio *Stylus* videtur planus, latus, subflavus, nitens, superiori parte parum rubicundus. *Gemmae* florum oblongo rotundæ, in cuspidem desinentes. *Calyx*, quo flores includuntur, rubro fuscus. *Fructus* ipsi capitula sunt oblongorotundiola, futuris interstincta, gemmulis spiculiformibus, rigidiusculis, transparentibus, undequaque bullatim exasperata, in totum viridia, in cuspidibus gemmarum rubescentia, cum sicca sunt nigricantia; spiculo, ubi flores decidere minuta. *Semina* intra singula fructuum latera, in totidem distinctis capsulis, sita sunt, quæ interius membrana à se mutuo interstinguuntur, in singulis capsulis tria vel quatuor, nullis unguiculis adhærentia, sed crassiola albicante lanugine involuta, formâ exacte rotunda, *pisi* magnitudinis, primum albicantia, deinde rufa seu subrubra, punctis nigricantibus interspersa, saporis parum adstringentis. E *fructibus* parum tostis succus elicitor, qui auribus immixtus dolores illarum mitigat. Ex iisdem & *saccharo* massa componitur, & umbilicali regioni applicatur contra *diabetem*, ex calidis febribus ortam. *Succus radicis Mercurii sublimati* toxicum infringit.



## TAB. 43.

Parte prima hujus operis descripta est *Musa Serapionis* sub nomine *Bala*, & hoc, meo iudicio, quia istius folia, cum hujus aliquam habent similitudinem. Hæc *Katu Bala* vocatur, quasi diceret *Bala Sylvestris*, & est *Arundo Indica latifolia*, *Bauh. in Pinac.* eomuni nomine *Canna Indica* dicta, vel *Longoas Stapel. in Theophrast.* Diversæ hujus species in hortis Hollandiæ excultantur, ut sunt.

*Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo. Cat. Hort. Reg. Paris.*  
*Arundo Indica latifolia. Bauh. Pin.*  
*Arundo Indica Americana, flore fulgente, cocco, splendente. Cat. Hort. Med. Amstelod.*  
*Arundo Indica latifolia, flore luteo, punctato. Bauh. Pin.*  
*Arundo Indica angustifolia, flore flavo. Cat. Hort. Med. Amst.*  
*Albata. Pison.*





Carim-gola Lat.

കരിങ്കുളു Mal.

كحاربنج و آء Arab.

சிவோதபல Tam.



1714



## CARIMGOLA.

## TABULA XLIV.

*Ponte d'...*  
*Pass. 54. 1. 348.*



**P**Lanta est aquatica ad altitudinem exurgens cubiti. *Radices* fistulosæ, albicantes & rubescentes, fibris vestitæ, illæ primum albæ, dein crocæ, pluribus capillis flavis in circum quasi implexæ. *Caules* plures uniti & combinati exurgunt, rotundi, circa interiorē partem nonnihil plani, fungosi, valde fistulosi, hinc inde in folliculos, à quibus novi prodeunt caules, extenuati. *Folia* quæ singula, unum numero, in summitate caulium proveniunt, forma sunt cordis oblongi, inferius latiora & superiora versus, oris parum rotundis, in cuspidem acutum desinentia, superficie lenia, textura condensâ, crassa, mollia, venulis densis, quæ omnes in petiolo excurrunt & in cuspidem intrant, striata, *nervulo* in adversa parte parum eminente instructa, viroris in una parte fusci, in alia communis, saporis subastringentis. *Flores* ex caulium superiori folliculo, infra folia, cum cauliculo fistuloso erumpunt, cauliculi petiolis congregatim insidentes, nullius plane odoris; hextapetali sunt, petala ipsa oblongo rotunda, surrecta, tenuia, membranacea, coloris in totum cærulei, corusci & scintillantis, papilionum alarum instar, maxime si in sole conspiciantur; in parte exteriori *costa* viridi per medium striantur: tria ex illis latiora sunt, tria angustiora, inter singula latiora interposita. Sex in illis videntur *stamina* cærulea, *apicibus* surrectis, striatis, ac flavis, dotata; illorum unum cæruleo pallidius & latius est, *lingulam* habens cæruleo viridem, quæ cæteris est longior, latior ac eminentior, sub lingula laciniam folioli instar angusti. Inter illa è *globulo* viridi vel subflavo, qui in orificio florum hæret, prodit *stylus* cæruleo albicans, staminibus crassior, in vertice

P: XI.

Z

gem-



*gemma* albicante ornatus. Florum *Gemmae* oblongæ, quinque vel sex costulis eminentibus striatæ, nonnihil intortæ, vel, si mavis, crispatæ; illarum folia primum pellucida sunt, ac clara, veluti alæ papilionum, nullo cæruleo colore tincta; tractus in illis videntur subtiles venularum, quæ in plures se spargunt ramulos, & hinc inde ex *costa* media oriuntur, sed illæ, in foliis cæruleis & scintillantibus, visum fugiunt. *Capsulae* seminales trilateræ, oblongorotundiolæ, tribus in longum striis radiatæ, à foliis, tum costulis valde crassis & extuberantibus, ac præficcitate contractis & rufofuscis, instructis, in totum comprehensæ. Numerosa in illis continentur *semina*, in tres series disposita, per membranam internam tenuem, quæ ex medio fructus, ad intervalla, inter strias intermedia excurrit, ac corticis exterioris striis arctius adstricta est, distincta, formâ rotundiola, parum oblonga & albicantia, matura colorem feminis referunt *Nasturtii*. Tota planta contrita & in lacte data, feбри medetur colericæ. Oculorum affectus tolluntur, si caput cum illius decocto ungetur & oleo. *Radix* cocta cum *saccharo* assumpta, vitia hepatis corrigit, flatus dissipat; trita in *butyro* & oleo & sic epota inflammationem seu rubedinem oculorum tollit. *Cortex* radicis in pulverem redactus cum *Zaccharo* sumtus antiasthmaticum est; idem masticatus & in ore detentus odontolgiam sedat & abigit.

## T A B. 44.

Secundum descriptionem clarissimi nostri Auctoris pertinet hæc planta inter illas quæ sunt flore hexapetalo, tricapsulares, radice fibrosa. Sed de lineator florem tantum depinxit pentapetalum, cum tamen secundum descriptionem hexapetalus sit.



*Sagittaria obtusifolia*  
(*Sagittaria obtusifolia* Linn.)

*Euli-tamara* Lat.  
കുളിതമരം Mal.  
فحوفج تامهراء Arab.  
आळ Bram.





## G U L I T A M A R A.

## T A B U L A X L V.



**T**ertia species *Tamara*. Radices quibus fundo adhæret, fibræ sunt capillatæ, in unam quasi fasciam conjunctæ, albicantes; adultiores tunica flava obductæ, annularibus sese striis corrugantes. *Caules* crassi, fistulosi, admodum leves, ad radicem crassiores, superiora versus in angustum contracti, angulati, intus aliquo modo lactei. *Folia* singula ex summitate caulium protenduntur, è caule, versus posticam partem, duabus laciniis tanquam alis (quæ singulæ in cuspidem sese stringunt) longe excurrunt, ac versus anteriora, rotundis oris, in obtusum sese contrahunt cuspidem; lata sunt, & interiora versus se nonnihil claudentia, ejusdem in utraque parte viroris, spinis minutis obsita, maxime in adversa parte, ubi etiam aspera, fractu facilia. *Costæ* ex caule tredecim plus minus excurrunt, quarum aliæ versus posticam partem, in laciniarum seu alarum deferuntur cuspides; aliæ, cum *costa* intermedia crassiori, versus obtusum folii cuspidem, hinc inde nervulos emittentes transversos; omnes in utraque parte eminent, maxime in adversa, nervulis transversis exceptis, illi enim in adversa tantum eminent, in recta conspicui. *Flores* in propriis geniculatis proveniunt caulibus (illi minutissimis sunt obsiti pilis ac valde asperi; ex inferiori geniculo, ubi tribus foliis cinguntur parvis, oblongis, cuspidatis, & ut folia *graminum* in longum striatis, tres aut quatuor emittunt cauliculos geniculatos) prorumpuntque è singulis caulium geniculis, plures simul, tenuibus, rigidiusculis ac nonnihil surrectis petiolis; parvi sunt, tripetali, illa latorotunda sunt, interiora versus cochleata, candida, parum scintillantia, à se mutuo nonnihil distantia; unguiculis suis tenuioribus, *nodulo* seu *capitulo* viridi, gemmu-

Sagittaria

obtusifolia,  
Pers. Syn. 2



mulis interstincto, è petiolo extuberanti, circumposi-  
ta; è quo *stamina* egrediuntur plura, brevia, tenuia,  
albicantia, oblique surrecta, ex inferiori parte sex flavis  
*apicibus* dotata; ipsa florum petala tribus viridibus succin-  
guntur foliolis. *Capitulum* in gemmas extuberat majores,  
rotundas, valde nitentes & transparentes, asperas, acuta  
prominente futura, in medio striatas; in hisce, quæ aqueæ  
sunt, intersepimentum est viride & crassum, utrinque  
ad latera cavernulam relinquens, in qua duo albicantia  
reconduntur *semina*. Ignoti usus est hæc planta apud  
Indos.

## T A B U L A 45.

Quamvis Auctor noster dicat hanc tertiam *Ta-*  
*mara* esse speciem, quarum duæ priores *Tab. 30*  
& *31* descriptæ; & conspecies sint *Nymphaea*;  
nihilominus tantum referri debet ad *Sagittam La-*  
*tifoliam* B. P. hoc enim ex omnibus apparet cir-  
cumstantiis; atque ideo à me vocatur *Sagitta*  
*Indica major, folio obtuso, floribus minoribus albican-*  
*tibus.*






Ottel-ámbel Lat.

ഒട്ടെലമ്പൽ Mal.

عظاءة العرب Arab.

आळ Br.





M A L A B A R I C U S.  
O T T E L A M B E L.

95

*Ottelia alis minoribus Pers.*

T A B U L A X L V I.



Quarta species *Ambel*; Bramannes dicunt *Odeca-aloèn* à prioribus quam maximè differens. *Radix* rotundi instar nodi est, cujus *cortex* flavus, plurimas tenues flavasque emittens fibras, etiam ad ulteriorem propagationem, novam proferens radicem. *Caules* è radice exeuntes, simplices sunt, teneri, fistulosi, sed crassiores & angulati, viridi diluti, albicantes. *Folia*, ut illa priorum specierum, caulibus non insident, sed singula ex suo rectà protenduntur caule, neque etiam aquis innant vel incumbunt, sed oris, inferiora versus, convolutis & ad se invicem contractis, tum sub aquis, tum extra aquas emicant; maxime in latitudinem extensa, rotundis ad caulem oris, antè in cuspidem strictis, valde rigida, fractu facilia, in lacinulas hinc inde insinuata, glabra. Cum *nervo* intermedio venulæ majores, ex ipso caule, utrinque tres quatuorve passim, obliquo & arcuato exeunt ductu, quo, à margine deflectentes, in cuspidem deferuntur, in adversa eminentes, rectam striantes. *Flores* caulibus insident propriis quadrangulatis, in singulis unus numero; qui caules, parte superiori, proxime ad flores alati sunt, stricti nempe quinque alis majoribus, latis, rigidis, foliorum instar, ac minoribus intermediis. Ipsi flores candidi sunt, difformes, tripetali, lenes, crispatis, venulis in longum striati. *Stamina* flava sunt; inter illa *capitulum* sese prodit cuspidatum; inferius tribus succinguntur foliis viridibus, angustis, surrectis, cuspidatis, quæ ubique viridi fuscis sunt obducta nervis. *Capsulæ* seminales rotundæ, oblongæ, cuspidatæ; *semina* in illis reperiuntur numerosa, rotunda, minuscule, coloris, ubi matura sunt, rubescentis. Hæc ut & illa reliquarum specierum in eduliis adhibentur.

T A B. 46.

Cæteræ plantæ cognomen *Ambel* gerentes, paulo ante *Tab. 26, 27, 28 & 29* descriptæ, cum hac ne minimam quidem habent convenientiam, priores enim omnes conspecies sunt *Nymphae minoris*, ut suo loco notatum. Hæc mihi est *Sagittæ affinis Malabariensis*, latissimo folio, floribus ex albo trifoliatis.

P. XI.

A a


TSJEM



*Tjem-cumulú* Lat.

മലകുഴലു Mal.

وَمِنْغُ فَحْوَسُوْوُ Arab.





## T S J E M C U M U L U.

## T A B U L A X L V I I.



Renoso hæc planta gaudet solo, longe ex-  
 currens. *Radix* albicans est & fibrosa. *Caules*  
 è radice plures exsurgunt simplices, rotun-  
 di, rigidiusculi, lignosi, aquei, ex albo fla-  
 vescentes, venis tribus striati. *Foliis* desti-  
 tuitur. *Flores*, difformes, cacumini cau-  
 lium, qui superne paulo crassiores, ad unam partem non-  
 nihil inflexi, insident transversi, bipetali; unum illorum  
 rubro sanguineum & purpurascens, interius in orificio,  
 unctuofo liquore delibutum; alterum, (exterius nempe)  
 cuspidatum est, incurvo dorso, lateribus clausis, coralli-  
 ne rubescens, inferius ex ventre emicantem proferens  
 campanam; illa ventre nonnihil est plano, stricto dorso,  
 quo petali cuspidati dorsum respicit. In illius orificio *stylus*  
 conspicitur crassiolus, albo rubescens, cujus *capitulum* albo-  
 flavescens, planum, rotundum, pilis minutis albicanti-  
 bus obsitum; cum *stylo staminum* duo reperiuntur paria,  
 rubescentia, *apicibus* albicantibus, latis, sibi mutuo an-  
 nexis dotata; ad latus campanæ florum inserta. Insuper  
 notandum quod *stylus* ex globulo exsurgat grandiusculo,  
 rotundo, in basi *calycis* sito; estque hic globulus albo fla-  
 vescens, tunica membranacea rubescente, quæ facile de-  
 glubitur, obductus; transversim dissectus ex carnosis hu-  
 midis plicis conformatus esse videtur. *Folia* cum *Nuce*  
*Moschata* *Zaccharoque* gingivis applicata, dentium putre-  
 dinem arcent, eorumque vermes enecant. Ex foliorum  
 simul & ligni *succo* ellychnia parantur, quæ *oleo* foliorum  
 d'*Emferno* intincta accensaque, leves relinquunt cineres,  
 qui palpebrarum aliorumque partium suffocant vermicu-  
 los; *Bulbus* radice idem præstat, cum *Sandalo* pone aures  
 & in fronte applicitus; pulverisatus nempe & tostus.




*Paëmbú Lat.*

పాంబు మల.

*Wecandá*

వెరవడ గ్రామ.

واجبجاء Arab.





## V A E M B U.

## T A B U L A X L V I I I.



**U**ingua Bramannum *Bembi*, planta aquatica est. *Radix* suavissimi odoris, saporis peracris, numerosas, flavescentes, capillatas, ab una parte versus inferiora, emittens fibras, in longum proserpens, sicca, molli & albicante cuticula, corculum habet, signatura flava annulari, ab interiori carne interstinctum, per novos oculos qui è radice protuberant propagatur. *Folia* ex nodis radice transversim proveniunt, latooblonga, vel oblongoangusta, tres quatuorve pedes æquantia, ad unam partem clausa, atque ibi tunica albicante obvelata, venis subtilioribus striata, radicem, pedibus flavescentibus ac mutuo convolutis, investientia; saporis ac odoris acris. *Folia* cum *Zinzibere* sicco trita artuum lancinationes & arthricos dolores ex pituita salsa & acri, mitigant. *Radix* in carbonem exusta & in pulverem redacta dentifricium est, quo si gingivæ, superpota *Oryzæ* aqua perfricentur, Cynicus curatur spasmus. Idem pulvis, cum convenienti liquore assumtus, cholerae medetur; imò contra colicos & ventrem lancinantes, assumitur dolores. Comestus prostratum appetitum tam efficaciter excitat, ut etiam salivam moveat. In aqua lævigatus & propinatus imò pro balneo adhibitus epilepticos sanat infantes.

## T A B U L A 48.

*Acorus* hæc est *verus Asiaticus radice tenuiore*, vel *Calamus Aromaticus Garzia ab Horto*. Ab omni parte convenit cum *Acoto vero officinarum*, sed folia parum angustiora sunt quam *Acori* nostri, qui magna copia ad ripas aquarum dulcium invenitur, & multoties quotannis suos profert julos.



*Pal-modécca* *Lat.*

പാമരമുട്ടുക്കു *Mal.*

عَلْمُغْضَا قَحْوُ *Amb.*

பாசுவாடி *Tram.*





## P A L M O D E C C A.

## T A B U L A X L I X.



Ecunda species. *Modecca*; Bramannes dicunt *Cuvali*, convolvulus est nascens in arenosis. *Radix* crassa, tuberosa, cubitum longa, intus albicans, lactea, mollis, minus lignosa, exterius nigricans, fibras tenues hinc inde emittens, odore & sapore glandes æmulans terrestres. *Caules* tenues, lactei, vetustiores cinerei, sub exteriori crusta virides, parum lignosi, tenuiores virides, ex una parte valde rubescentes, glabri, nitentes, humidi. *Folia* hinc inde, in petiolis, interius striatis & rubescentibus proveniunt, singula septem laciniis interstincta & divisa, in recta parte viridi fusca, nonnihil nitentia, in adversa viridi clara, mollia, lactea. *Costa* in recta parte etiam eminens ibi rubescit, ad singulas transiens lacinias, in adversa viridi clara est. *Flores* in petiolo communi, plano, nonnihil incurvo, rubescente, spithamam longo, ex origine foliorum exoriens, brevibus suis pediculis plures congregati proveniunt, campanulæ sunt purpureo rubræ, ex collo, stella quinque oblongorum cuspidum, qui proxime ad oram excurrunt, & venulis in longum striantur, signatæ; ipsi cuspides in collo intense purpurei, in extremitatibus purpureo rubro diluti; exterius ex purpureo albicantes, in stella nitentes, nullius odoris. *Stamina* in illis emicant quinque purpureo albicantia, *apicibus* oblongis, surrectis, albicantibus & farinaceis dotata; *stylus* tenuis est & albicat, rotundum, crassum & farinaceum in vertice gerens *nodulum*, qui ex rudimento fructus, in calyce sito, exoritur. *Calyx* pentafolius est, collum campanæ arctissime complectens; singula folia, rotundiolæ vesicæ instar, inflata sunt, rubro fusca, ad persicum colorem vergentia; deciduis floribus se arctissime claudunt, fructumque, etiam cum maturus est, maximam

*Convolvulus paniculatus, L.  
Pers. Syn. 1. 1. 80.*



mam partem comprehendunt, sed tum viridia sunt. *Fructus* baccæ sunt rotundiolæ, calycis foliis maxima parte arctè obtectæ, superiori parte rufi, interiori virides, quatuor subtilioribus venulis in longum striatæ, ac veluti in tot loculamenta divisæ, quorum duo à duobus reliquis, membrana tenui intermedia, separantur. *Semina* in singulis unum, ad partem corticis argenteis filamentis obfitum, irregularis figuræ, duorum triumve laterum, pulpa interior ex flavo albicat. *Radix* in sole ficcata, trita, in pulverem redacta, cum *zaccharo* & *butyro* decocta & assumta, macilentos fertur reddere & obesos; sed & immodicum mensium sistit fluxum, & in febribus ossium confert.

## T A B. 49.

Ad cæteras *Modecca* species, de quibus *part. octav.* etiam & hæc pertinet; ubi & una eodem nomine *Pal Modecca*, id est, *Modecca altera* describitur: in eo differens quod hujus *flos* ex omni parte, omnium sit maximus. Ad præcedentes nullas dedimus annotationes; nec mirum, apud omnes enim Botanographos, maximum de illis est silentium. Ast cum postea vidissem Clariss. D<sup>o</sup>. *Breyonium prodrom. 2. pag. 48.* omnibus nomen

dedisse, *Floris passionis spurii Malabarici* (omnes enim, pro spuriiis habet speciebus,) hæc appellari posset *Flos passionis spurii Malabarius, flore majore, fructu minore.* Observandum est quod folia omnium specierum *Modecca*, & uniuscujusque speciei, quam maxime inter se invicem differant; in uno enim eodemque caule invenies, quæ non, & quæter, quater, quinquiesve sunt divisa; Ita ut solum discrimen sit in *floribus* & *fructibus*.





*Munda-valli* Lat.

മുണ്ടവളി Mal.

موندنا والي Arab.





## MUNDA VALLI.

## TABULA L.



Convulvulus, arenosa amans, arboribus sese affigens. *Caules* rotundi, virides, non geniculati. *Folia* in petiolis oblongis, crassis, interius striatis, viridibus, proveniunt, novellis furculis hinc inde comitata, formam referunt cordis, anterius cuspidata, ad pediculum sinu excisa, mollia, lenia, viroris in recta parte fusci, in adversa diluti, trita odoris gravis, nullius saporis. *Costa* media lata est, plana, viridi albicans, una cum lateralibus in utraque parte eminens, maxime in adversa. *Flores* ad exortum foliorum duo vel tres juncti proveniunt in petiolis oblongis, crassis, virididilutis, tortuosis, monopetali, prægrandes referentes campanas, oblongo-angusto, viridi diluto collo è calyce exsistentes, lato & amplo orificio, stella quinque oblongorum cuspidum, qui exterius extuberant, striati, ex superiori colli parte, ubi rugulis leviter crispantur, contextura tenui & transparente, valde lenes & molles, coloris nivei nitentis, visu jucundissimi; stella exterius viridis est; odor ut *Lilia nostratum*. *Stamina* ex illis emicant quinque, candida, nitentia, quæ ex inferiori colli parte, cui interius quasi assuta sunt, *apicibus* decumbentibus albis, alba farina aspersis, dotata. *Stylus* ex calyce exsurgit liber, candidus, crassus, super stamina, cum suo rotundo, albo ac farinaceo eminens *capitulo*. *Calyx* quinque folius est, illa oblonga sunt, stricta & cuspidata, coloris viridi nigricantis, florum colum arcte excipiens. *Florum gemmæ* oblongæ, conicæ, viridi dilutæ. *Fructus* ad exortum foliorum brevibus insident petiolis, oblongorotundi, cuspidati; teneri virides, carne intus viridi, succulenta, intus cavitate angusta, grati odoris, cortice crassiusculo obducti. *Uusus* in Medicina nullus vel saltem ignotus.

## TABULA 50.

Pertinet inter species Convulvuli. Ego dicerem *Convulvulus Malabarius flore amplo viridi diluto colore.*

P. XI.

C c


KAT-



Kattú - Keléngú Lat.

കാട്ടുകലേങ്ങ Mal.

قحاطون عجب المنفخ Arab.



○○○○○ ⊗



## KATTU KELENGU.

## TABULA LI.



Convolvulus arenoso gaudens solo. *Caules* rotundi, virides, pilosi, parum lignosi & languidi. *Folia* in petiolis oblongis, rotundis, pilosis, viridibus, ex parte spadiceis, ac fusce rubescentibus, caule crassioribus proveniunt, forma cordis, anterieus brevi cuspidate, ad petiolum excisa, parum pilosa, ob pilorum hirsutiem in recta parte aspera. *Costa* media cum lateralibus in adversa eminent parte. *Flores* in petiolis rotundis, pilosis, supra exortum foliorum prodeunt, cyathiformes sunt, stella quinque cuspidali, ex albo viridi diluta, ex orificio in oram signati, albo flavescentes, in orificio colli fusce rubro purpurei, lenes, in tractu cuspidum stellæ exterius pilosi, nullius odoris, infra calycem in geniculis petiolis, duobus angustis foliolis succincti. *Stamina* ex fundo colli exsurgunt quinque candida, oblongis, albo flavis, surrectis *apicibus* dotata. *Stylus* candidus est, superius duabus rotundiolis, candidis nodulatus gemmulis. *Basis* cui stamina insident, quinque rotundiolis fenestrata est cancellulis. *Calyx* pentafolius est, folia ipsa cuspidata sunt, surrecta; illorum tria ampla sunt & lata, duo interiora angusta. Floribus deciduis succedunt *globuli* rotundi, qui sicci, coloris cinereo fusci, quatuor continentes *semina* intersepimentis mediis à se mutuo separata; trigona sunt, uno rotundo, duobus interioribus planis, ejusdem cum globulis coloris. *Folia* cum *Codiavanacu* & recenti *butyro* trita abscessus maturant & aperiunt. *Radix* cum *aqua Oryzæ* levigata erisipelati resistit.

## TAB. 51.

Parte septima hujus operis pag. 71. alia, ejusdem nominis describitur planta, quæ cum hac nostra ne minimam quidem habet convenientiam; illa enim pertinet inter species *Batattas Sylvestris*, uti suo loco ostendimus; hæc species *Convolvuli* est. Quamvis autem nota Characteristica *Convolvulorum* sit quod Capsulæ seminales sese in tres

partes aperiunt, sed illæ hujus plantæ in quatuor dispertiantur; nihilominus tamen proxime ad illos accedit, & licet claviculis, quas habere oporteret, destituatur, secundum descriptionem DD. Rayi *Hist. Plant. Tom. I. lib. 15. cap. 4.* tamen illi nomen dedi, *Convolvuli affinis Malabarici*, floribus pilosis, variegatis.

*Convolvulus malabaricus*  
L. sp. 221



*Ballel* Lu.

ബരളുകുൾ Mal.

*Taka sivali*

तकाचवाळी Bram.

تکالی Arab.





## B A L L E L.

## T A B U L A L I I.

*Convolvulus repens  
L. 1753. 225*

*Allel*; Bramannes dicunt *Takasiwalli*, convolvus est, cauliculis super aquam repens, ac ex illarum Cymis capillatas, viridisubalbicantes emittens *radices*; illæ, pedunculos caulium obsidentes, ex pluribus constant fibris capillatis, candidis, saporis aquei. *Caules* tenues, teneri, aquei, virides, cymis inflexi, ex cymarum convexa parte, unde & radiculæ prodeunt, foliâ ac flores emittentes. *Folia*, quæ longis, rotundis ac viridibus petiolis proveniunt, hastiformia sunt, postica parte in pedunculos laterales exprorecta, ad eorum oras nonnihil sinuata, textura crassiuscula, viroris in recta parte fusci, in adversa diluti. *Costa* media cum lateralibus in recta maxime eminent parte, minus in adversa. *Flores* monopetali sunt, stella quinque cuspidali notati, in stella ejusque cuspidibus candidi, interius purpureo rubescentes, exterius purpureodiluterubescetes. *Stylus* ex orificio calycis emergens candidus est, in *apice gemmula* albicante farinacea nodulatus; cum illo quinque emicant *stamina*, oblongis, albicantibus, farinaceis dotata *apicibus*, lateri inferiori colli inserta, in ima parte, ubi crassiora, rubescentia, pilisque albicantibus barbata. *Gemmæ* florum oblongocuspidatæ, viridisubflavæ. *Fructus* rotundioli, & tribus veluti rotundis lateribus extuberantes, in cuspidem brevem & angustum striati; teneri adhuc oblongiores sunt & magis cuspidati; maturi magis ad latera extuberant, coloris viridi albicantis, quinque foliis viridibus & acuminatis *calycis*, maxima parte, præcipue autem ad extuberantias, excepti. *Semina*, in illis continentur tria, intersepimentis candidis à se mutuo distincta, trigona sunt, uno exteriori latere rotundo, duobus interioribus planis obtuse concurrentibus; fabam in se continent viri-



dem, anteriori parte in duos lobulos unguatim, per intersepimentum medium, in medio fissam; in convexa parte umbilico seu oculo viridi, qui versus planam partem inflexus velut in sinum sese recipit, dotatam; faba hac resoluta, ex oculo viridi, tanquam communi pedunculo, duo plani conspiciuntur foliosi lobuli, qui singuli in duo folioso, crispa relaxantur linteola. *Planta* cum ebutyrato lacte oleoque simul cocta lumborum abscessus sanat, dolorem mitigat.

## T A B U L A 52.

*Convolvulus* mihi est *aquaticus folio longiore, floribus candidis.*





Tirú-táli Lat.

കുറുതുള Mal.

طير حو طغاي Arab.

അകു ബ്ര.





## TIRUTALI.

## TABULA LIII.



Convolvulus sinuosis ramis arboribus se affigens, arenoso & terreo gaudens solo. *Radix* tenuis, fibrosa, longe excurrens, cortice albicante, cujus sapor subdulcis. *Cauliculi* rotundi, tenues, virides, rubescentes, raris pilis obsiti. *Folia* hincinde, ex diversis cauliculi partibus, petiolis crassioribus, longiusculis, teneris, viridiclaris, interius striatis, nonnihil rubescentibus, proveniunt, figura instar cordis, postica parte ad petiolum rotundis oris profunde incisa, in cuspidem angustum contracta, tenuia, mollia, superficie lenissima, in margine subrubro limbulo circumdata, in recta parte viridifusca. *Costa* media cum lateralibus in marginem progressa in brachia divaricantur, in adversa parte maxime eminent, ubi viridifusciore sunt & nitentes. *Flores* in longis, tortuosis, virididilutis petiolis, qui cauliculis, ex quibus oriuntur, crassiores sunt, ex origine foliorum prodeunt, septem, octo, plus minus congregati, monopetali, albicantes & purpurascens; illorum collum oblongoangustum est, in illo purpureo rubri sunt; extra illum purpureoalbicantes & nitentes; ex inferiori colli orificio stella notati, cujus cuspides ad oras deferuntur & ibi pereunt, nullius odoris. *Stamina* in illis quinque candida, tenuia, collo inserta, *apicibus* flavis & surrectis dotata. *Stylus* candidus est & tenuis, duabus *gemmais* in vertice nodulatus, ortum habens ex globulo viridi, fructus rudimento, in fundo *calycis* sito; ille, collum florum arcte arripiens, viridis est, pentafolius, rotundocuspидatus. *Florum gemmae* virides & cuspidatae. *Fructus* baccæ sunt rotundæ, aliquo modo planæ, primò virides, exinde flavæ seu rufæ, quatuor venulis vel lineis striatæ, in quibus *cortex*, qui duriolus est & tenuis, in quatuor se relaxat partes. *Semina*  
in



in illis quatuor, tenuibus à se mutuo interstincta mem̄  
 branis, de cætero trigona sunt, uno rotundo, duobus  
 planis lateribus, coloris castaneo fusci, ex oculo in verti-  
 ce, fila ejiciunt candida, tenuia. *Succus* expressus pro  
 lotione adhibetur, ad purificationem corporis.

## T A B. 53.

*Convolvulus Malabaricus floribus ex albo purpurascens.*





Ben-tirú-táli Lat.

വെട കടല കടലു Mal.

وهن طبرو طغلي Arab.





## BEN-TIRU-TALI.

## TABULA LIV.



Convolvulus nascens in arenosis. *Caules* tenues, rotundi, virides, glabri. *Folia* oblongo rotunda, crassiuscula, mollia, lenia, odoris debilis & grati, saporis subacris. *Costa* media in utraque parte eminent, laterales in recta extuberant, in adversa tractibus suis conspicuæ. *Flores* monopetali, companiformes, stellati, quinque cuspidales, oblongo collo, candidissimi. *Stamina* in illis quinque surrecta, candida, *apicibus* incumbentibus & candidis nodulata, inferius pilis candidis barbata, collo assuta. *Stylus* oblongior *gemma* albicante instructus; ex *globulo* viridiflavescente, in *calyce* sito emergens; ille quinque folius est, tria illorum ampla & oblongo rotunda, duo angusta & cuspidata sunt. *Fructus* oblongi, filamentum oblongum, viridi dilutum in vertice gerentes; inter quatuor surrecta, scabra, rigida, & viridia folia, calycis locum adimplentes, confiti, illorum cortex crassiusculus & viridi dilutus, intus valde glaber & albicans; in medio mollissima, flocculosa, albicans continetur lanugo. Ex *succo* plantæ infusus præparatur, adversus morbum endemium, *Pitao* dictum: idem cum *fructu* ac *cortice Cadel-avanacu* haustus, alvum laxat.

## TABULA 54.

*Convolvulus Malabaricus, folio longiori, flore candido.*



Tala-neli Lat.

கல்கி Mal.

Calivalli

கல்கலி Tam.

طالنجينجيني Arab.





## T A L A - N E L I.

## T A B U L A L V.

**B**ramannes dicunt *Cali-Valli* vel *Rain Ma-*  
*morad*, convolvulus est arboribus se affigens,  
 vel super terram repens. *Radix* lignosa,  
 fibrosa, cortice viridifusco. *Caules* tenuis-  
 simi, angulati, virides, ad corticem inte-  
 rius membrana albicante, densa, subtilissi-  
 mis pilis pertexta, vestiti. *Folia* oblongoangusta, cuspidata,  
 ad petiolum utrinque pedunculo laciniata, tenuia, mol-  
 lia, lenia; *Costa* in adversa parte eminente instructa, viro-  
 ris communis, nullius saporis. *Flores* monopetali sunt,  
 stella in medio ornati, cujus cuspides in ora nonnihil emi-  
 nent; albicantes, subflavescentes, in collo nota rosaceo-  
 fatura in orbem suffusi. *Stamina* in illis quinque tenuia,  
 candida, albicantibus, surrectis apicibus instructa. *Stylus*  
 tenuis est; illius *capitulum* virididilutum, in duas veluti  
 pennas bifidus. *Calyx* quinque folius est & cuspidatus,  
 florem arcte arripiens. *Fructus* globuli sunt planorotundi,  
 ex albicante virididiluti, striati, ex futuris, per membra-  
 nas intermedias, in quatuor loculos seminales distincti,  
*calyce* quinque oblongorum & cuspidatorum foliorum  
 profunde excepti, coloris ruffi & spadicei ac nonnihil ru-  
 bescentis. *Semina* in iis reperiuntur quatuor, in singulis  
 loculis unum, triangularia, uno latere rotundo duobus  
 planis, primum albicantia, exinde spadicea. Decoctum  
 hujus plantæ, *Samstravari*, *Glycirrhiza* & oleo *Sergelim*  
 permixta linimentum præstat, quo caput illinitur adver-  
 sus cephalæam & comæ fluxilitatem.

## T A B U L A 55.

Miratu dignum, quod omnes *Convolvuli* spe-  
 cies, huc usque descriptæ & quæ impostero  
 sequuntur, claviculis destituantur, & plerum-  
 que quatuor vel plures habeant loculos in capsu-  
 lis feminalibus. Ex genere *Convolvulorum* ta-  
 men minimè sunt excludendæ, sed necessario  
 inter illos recensendæ, cum illis enim quam  
 maximè conveniunt. Hæc mihi est *Convolvulus*  
*Malabaticus, angusto folio, flore variegato.*



*Sporea campanulata* Willd.

Pars 11. Tab. 56.

Adamboe Lat.

අධර්මය Mal.

ءضخامبجؤ Arab.

वधरले Bram.





## A D A M B O E.

## T A B U L A L V I.



Res illius sunt species, *Adamboe*, *Schovanna Adamboe* & *Bel Adamboe*; prior lingua Bra-  
mannum dicitur *Pougia-Valli*, convolvulus  
est, cujus *radix* fibrosa, albicans. *Caules*  
rotundi, tenues, minutis pilis obsiti; super  
terram repentes, radículas, quibus se affigunt,  
emittentes. *Folia*, quorum petioli striati & pilosi, cor  
referunt, textura tenuia, mollia, superficie lenia. *Costa*  
media cum lateralibus in adversa parte eminent. *Flores* in  
uno petiolo plures congregati proveniunt, monopetali,  
in quinque partes incisi, corrugati, stellati, in collo pur-  
pureo rubri & saturi, exteriora versus ex purpureo albes-  
centes, sine odore. *Stamina* in illis quinque albicantia,  
*apicibus* oblongis, surrectis, albicantibus & farinaceis do-  
tata; in inferiori colli orificio, cui inserta sunt, crassiora,  
albis & lanuginosis pilis obducta. *Stylus* inter illa apparet  
tenuis & albicans, crassa & farinacea *gemma* in vertice no-  
tatus, ex *capitulo* flavo, fructus primordio, erumpens.  
*Calyx* pentafolius est. *Fructus* nonnihil planorotundi,  
foliis calycis arctissime inclusi, in vertice caudula eminen-  
tes, tribus seu quatuor lateribus rotundiolis, ac in latum  
nonnihil extuberantibus, cortice primum viridi, in supe-  
riori parte, ubi calyce non obteguntur rubescentes, odoris  
ubi aperiuntur, fortis, illum *Piperis* & *Zinziberis* vi-  
ridis æmulans. *Semina* in illis tria vel quatuor, fructum  
replentia, trilaterialia, intersepimentis tenuibus, mem-  
branaceis, albicantibus, quæ in oris rubescunt, à se invi-  
vicem sejuncta, coloris argentei; in oris lateris convexi,  
pilis argenteis obsita; pulpa viridis est & nullius saporis.  
Contrita cum lacte assumpta, antidotum est adversus mor-  
sum serpentis *Cobra Capella* dicti; fructus triti & cum aqua  
assumpti, idem præstant.

## T A B. 56.

Parte quarta hujus Operis Tab. 20. 21. & 22.  
arboris species eodem nomine *Adamboe* descri-  
buntur, quæ multum inter se differunt, quamvis  
omnes sint species *Malva arborea*; & sic plures in  
hoc opere reperiuntur plantæ, uno eodemque

nomine insignitæ, nullam tamen inter se conve-  
nientiam habentes, uti antea demonstravimus:  
Hæc mihi est *Convolvulus Malabaticus flore maximo*  
*purpurascens*.



*Schoranna adambu* Lat.

ചെട്ടവത്തുണ്ടായു Mal.

جَبْوَانِحَاءُ وَضِحَامِجُوْ Arab.

बागडावले *brun.*





## SCHOVANNA ADAMBOE.

## TABULA LVII.



**L**ingua Bramannum *Bangada-Valli* convolvulus est priori pene similis, excepto quod folia sint bifida, *flores* paulo minores, ut & *fructus*: *semina* pilis in totum villosa vel lanuginosa; ubi maturiere in pilis spadiceo fusca, lenitie instar *Veluti*, sub pilis duro, osseoque cortice obtecta. In aqua decocta fomentum exhibet quo dolores arthritici mitigantur. *Folia* cum *lacte caprarum* in potionem præparata, pro hæmorrhoidibus propinantur.

## TAB. 57.

A°. 1690. Convolvulum hunc in *Horto Medico* ex semine produxi & est *Convolvulus Maritimus* *Cat. Hort. Lugd. Bat. Ceylanensibus Bitamburū;* *Ceylanicus folio crasso, bifido, seu cordi formi. Herman.* *Lusitanis Pes Capra* dictus.






*Bel-adambu-walli* Lat.

വെളുത്തു മാ. Mal.

*Dangado-walli*

बागडवाले Bram.

بھلہ و ضامبو Arab.





## B E L - A D A M B O E.

## T A B U L A L V I I I.



Convolvulus nascens in petrosis, radiculis albicantibus terræ sese affigens. *Radix* ruffa, intus nonnihil lignosa albicans, in longum excurrens, tortuosa, fibris vestita; illius *cortex* saporis est subdulcis & subacris, odoris terrei. *Caules* rotundioli, virides, flexiles, parum lignosi, albicante medulla. *Folia*, quorum petioli fulco striantur, ad exortum proveniunt radicularum, forma lati & obtusi cordis, circa petiolum angulato sinu excisa, crassiola, mollia, lenia, viroris in recta parte furdi, in adversa dilutioris, *costis* crassis instructa, nullius odoris vel saporis. *Flores* campaniformes sunt & stellati, floribus *Adamboe* per quam similes, sed in totum candidi. *Stamina* in illis quinque surrecta, *apicibus* oblongis, candidis, surrectis dotata. *Stylus gemma* nodulatur candida, rotunda & granulata. *Calyx* pentafolius est, tria illorum oblongiora sunt & virididiluta, duo minora & viridifusca. *Globuli* in calyce conspiciuntur feminales, quorum vertex filamento coronatur oblongo, tenui, ubi cæruleo fusci, ad calycem albicantes. *Semina* in illis tria vel quatuor triangulata, oblonga, superiori parte in cuspidem stricta, coloris cinereofusci, intra pulpam unicum, parvum & rotundiolum recondentia nucleum, odoris & saporis fabacei. *Succus* cum oleo *Maro* & *Zingibere* decoctus, linimentum præstat, capiti inungendum, quo morsus rabidi canis irritus redditur.

## T A B U L A 58.

*Convolvulus Malabaricus folio rotundiore, crasso, flore candido.*



*Pulli-schoradi Lat.*

पुलिश्वरि Mal.

يُورِي حَيَوُ كَاغِيَرِ Arab.

अन्ना Brun.





## P U L L I - S C H O V A D I.

## T A B U L A L I X.



Ramannes dicunt *Arty*, convolvulus super terram repens vel etiam arbores scandens. *Radix* brevis, rotunda, tenuis, aquosa, virididiluta, fibras numerosas barbatae à latere emittens. *Caules*, palmitum more super terra currentes, nullasque clavículas eicientes, teneri sunt, duri, flexiles, pilosi, asperi, sub pilis virididiluti; pili ipsi longiusculi & subflavi, coloris *Xerampelini*. *Folia* etiam pilosa sunt, in sex, septem, vel etiam plura folia rotundo cuspidata incisa, omnia *Costa* media & lateralibus instructa, crassa, virididiluta, saporis & odoris sylvestris. *Flores* quorum petioli longiusculi, virididiluti pilosi & asperi, circa originem foliorum proveniunt, ex crassis, foliosis, virididilutis, & cyathiformibus *calycibus*, campaniformes, angusto collo, coloris candidi & nitentis, versus superioriora crispatis & corrugatis, venis subtilioribus in longum striati, pilis rarissimis obsiti. *Stamina* in illis visuntur quinque tenuia, recta, candida, albis & surrectis dotata *apicibus*. *Stylus* candidus est & longiusculus, in vertice *gemma* alba ornatus. *Calycis* folia angusta, hirsuta, viridia, inferius albicantia. *Semina* in gemmis continentur quatuor, quæ *gemmae* tenuibus nervis in quatuor se dividunt latera; ipsa semina oblonga sunt, trigona, parum pilosa, primo albicantia, exinde fusca. *Folia* cum *Pipere* trita & parti affectæ imposita, omnem virulentiam, à morfu canis rabidi contractam, amovent; cum *butyro* trita apostemata resolvunt.

## T A B U L A 59.

*Convolvulus Heptaphyllus Indicus Villosus*. Breyn. Prodr. 1. Vel *Convolvulus Ceylanicus Villosus pentaphyllus* & *heptaphyllus minor*. Cat. Hort. Acad. Lugd. Batav.




*Tsjúria - cránti* Lat.

சுச்சிகாதி மல.

*Tsjúria -- cránti*

सुचिकाती ब्रह्म.

شجر ریا کراڑطی Arab.





## TSJURIA-CRANTI.

## TABULA LX.



Convolvulus cujus *radix* albicans fibrosa & capillata. *Caules* tenues, intorti, virididiluti, nitentes, aquei, cymis inflexi, ex cymarum adversa parte, caules ejicientes tenues, foliosos, virides; etiam & ipsi foliosi sunt, una parte nonnihil fulcati, certo ab exortu intervallo, foliis vestiti, in medio fulcatæ partis velut nervulo obsiti. *Folia* angustissima, oblonga, graminiformia, crassiola, in recta parte viridifusca, nervulo tenui eminente instructa, in adversa viridi dilutiora & nitentia. *Flores* prodeunt in cauliculis oblongis, tortuosis, viridibus, qui cum cauliculis foliosis, ex cymis caulium emicant, & superiori parte nodulis extuberant, ac sæpius in nodulis in binos divaricantur pedunculos, & ad florum confinia nodulo crassiori turgescunt. Ipsi flores stellam referunt quinque cuspidalem, oblongo, angusto collo, in totum purpureo rubri, intus in foliis coloris purpurei scarlatini venustissimi, odoris expertes. *Stamina* in illis quinque rubra, nitentia, rubris & oblique decumbentibus *apicibus*, candido, farinaceo rore aspersis, ornata, colli inferiori parti inserta. *Stylus* albicans, inferius viridis est & crassiusculus, candida & farinacea *gemma* instructus. *Capsulæ seminales* oblongorotundæ, anterieus in cuspidem obtusum strictæ, tribus quatuorve futuris striatæ, primum virididilutæ, exinde ruffæ, *cuspidem* in vertice gerentes oblongum, primo viridem, postea durum & ruffofuscum; membranaceis intersepimentis in tres quatuorve valvulas distinctæ. *Semina* in principio albicant, sicca nigricant, oblonga, nonnihil angulata. *Philtri* efficaciam huic plantæ tribuunt incolæ. *Succus* è foliis expressus errhynum est cephalalgiam fugans.

## TABULA 60.

*Tsjuria-Cranti Malabariensis* est *Cuamoclitto* sive *Fasminum Americanum*. *Clus. Cur. Posth.* sed pro *Fas-* rison in *Hist. Oxoniens.* recte vocatur *Convolvulus ex-* oticus annuus foliis *Myriophylli* seu *Millefolii Aquatici*, *mini* specie haberi non potest; atque ideo à *Mo-* flore sanguineo.

P. XI.

H h

SA-



## SAMUDRA-ST JOGAM.

## TABULA LXI.



Convolvulus nascens in arenosis. *Caules* rotundi, villosi, cinereoalbicantes, subvirides, lenes, sub villosa tunica viridifaturi, intus lignosi & medulla instructi. *Folia* in petiolis videntur valde oblongis, rotundis, crassis, interius sulco striatis, villosis, cinereoalbicantibus, subviridibus lenibus, suntque ampla, oblonga, in cuspidem stricta, forma cordis, ad petiolum finu excisa, crassiuscula, valde mollia, intus glabra, viroris faturi; in adversa parte, densa, cinereoargentea, tomentosa, pannum diceres lanuginosum torculari compressum, tenera, cum lateribus interioribus arcte clausa & unita. *Costæ* in adversa parte eminent, rectam striantes. *Flores* petiolorum vertici plures congregati & fasciati infident, monopetali, campaniformes, stellati, interius fusce rubro purpurei, nitentes, ad oras dilute rubescentes, exterius in collo ut & calyce lanugine albicante, tomentosa vestiti, inferius ad calycem oblongis, cuspidatis, candidis lanuginosis succincti & obtekti foliis. *Stamina* in illis quinque oblonga, candida, apicibus grandiusculis, oblongis, candidis, sulcatis dotata. *Stylus* duabus exornatur junctis & granulatis gemmulis. *Calyx* arctus est, cujus folia cuspidata & convoluta. *Florum Gemmæ* oblongæ, cuspidatæ. *Fructus* subrotundi sunt, alii duobus, alii tribus extuberantes lateribus, cuspidem in vertice gerentes; immaturi corticem habent viridifuscum, qui incisus copiosum & ardens exsudat lac; maturi aurancei coloris ad flavum vergentis, intus medulla carnosâ, dulci, molli, minime lactea instructi. *Semina* in illis tria in distinctis loculis separata, triangulata, viridi flava, carne albicante & dura. Usus non norunt Medici.

## TABULA 61.


*Convolvulus maximus Malabariensis, folio villosis, floribus purpurascens.*



*Batta-valli* Lat.

ಬತ್ತವಳ್ಳಿ Mal.

بوتطع واللي Arab





## C A T T U - V A L L I.

## T A B U L A L X I I.



Convolvulus arbores scandens. *Caules* rotundi, virides, lignosi, vetustiores cinerei. *Folia* formam lati & obtusi cordis referunt, spissa, viroris in recta parte saturi & nitentis, in adversa viridi diluti & cinerei, *costis* tam media quam lateralibus instructa; illa quæ propius ad caulium confident summitatem, inferioribus sensim minora & contractiora evadunt. Flore & fructu caret. Ex *foliis* balneum præparatur adversus bulimum & malaciam. Ex *radice* cum *Curcuma* & *serolactis* trita linimentum conficitur, artuum dolores mitigans.





Máreta-jnáli Lat.  
മരൈകനാളി Mal.  
مَرْهَطَا نَعْلِي Arab.





## MARETAINALI.

## TABULA LXIII.



Convolvulus arboribus se affigens. *Caulis* rotundi, lignosi, geniculati, cinerei, languidi. *Folia* plura congregata in oblongis proveniunt cauliculis, oblongorotunda & angusta, anterius cuspidata, valde crassa ac carnosae, plurimis filamentis pertexta, rigida, dura, in oris rugulis se crispantia, superficie plana & glabra, viridis in recta parte surdi ac fusci, in adversa clari, intus carne viridi aquea & sublaetea. *Costa* in adversa parte alte extuberat, in cuius tractu folia interius sulco sunt striata, saporis amari. *Floribus* destituitur. *Fructus* in geniculis caulium proveniunt oblongo rotundi, nodos referentes lignosos, rugosi, asperi. *Succus* cholerae medetur.

T A B. 62. 63.

Descriptio harum plantarum imperfecta est, ita ut de illis nihil certi possim affirmare.





*Vistnú-jlándi* Lat.

കിഴിതടയ്ക്ക *mal.*

پیشخو کلازنی *Amb.*

വഴുകി *brah.*





## VISTNU-CLANDI.

## TABULA LXIV.



Uæ hujus plantæ sunt species, *Vistnu-Clandi* & *Sendera-Clandi*. Prior planta humilis est cum cauliculis transversim super terram diffusa. *Radix* tenuis est & recta, in terram se demittens, fibris tenuibus vestita, cortice rufo, interius albicante, saporis subdulcis.

Ex illa per plures, valde tenues, rotundi, pilosi, lanuginosi ac virides exeunt cauliculi, cubitum plus minus longi, non in altum sed in latum diffusi. *Folia* valde parva sunt & oblongo rotunda, crassiola, mollia, lenia, in utraque parte lanuginosa, longis ac densis pilis obsita, viroris communis, saporis subdulcis. *Costulae* in adversa parte nonnihil eminent. *Flores*, quorum petioli tenues lanuginosi, pilosi, virides, longi, qui digitali à floribus intervallo, minutis & cuspidatis sunt vestiti foliolis, supra ex origine foliorum proveniunt, monopetali, stella quinque cuspidem signati, coloris in exteriori superficie inter stellæ cuspides cæruleo diluti, ad umbilicum in stella purpureorubicundi, in umbilico albicantes, exterius in stellæ cuspidibus ex purpureo albicantes. *Stamina* in illis quinque *apicibus* brevibus dotata, cum quibus etiam quatuor vel quinque albicantia erumpunt filamenta. *Calyx* viridis, pilosus, in quinque foliola divisus. *Gemmae* in vertice pilis albicantibus sunt instructæ. *Flores* ipsi sub vesperam arctissime clauduntur, adeo ut visum pene fugeant; æstivo tempore etiam secunda à meridie hora clausos invenies. *Capsulae seminales* parvæ & rotundæ, primo virididilutæ, dein flavescentes. *Semina* pro numero angulorum quatuor, tria, vel etiam duo inveniuntur, nullis intersepimentis à se mutuo seclusa, trilaterialia, uno rotundo, duobus planis, depressa, flava vel ruffa, matura rubrofusca. Tota hæc planta vegeti & haud injucundi est odoris



præcipue aquis imposita; tempore pluvioso maximè reperitur, æstivo non nisi in locis umbrosis. Antifebrile est cum *Cumino* decocta; etiam pro extenuatione corporis & morbis chronicis exhibetur. Cum *lacte* assumpta etiam calidas curat febres. *Oleo* incocta & capiti illita capillos promovet.

## T A B U L A 64.

Minus genus est *convolvuli*; à me vocatur *Convolvulus Indicus minor*, *Alfine folio, flore rubicundo, purpureo.*






*Sénoera - Sandi* Lat.

ಎಂಟುಕೆ Mal.

جياز فحمة اكل ارضي Arab.

ವೆವಕಾತಿ Brum.





## SENDERA-CLANDI.

## TABULA LXV.



Ecunda *Clandi* species. *Radix* tenuis, fibrosa, cortice rufo, albicante. *Cauliculi* quinque angulati, glabri, non pilosi, viridi fuscescentes. *Folia* in utraque parte glabra sunt, oblongoangusta, illis primæ speciei longiora, superiora versus lateribus magis deductis, semilunata, vel etiam duabus semilunulis tricornuis excisa, ad petiolum duobus pedunculis, bicuspidalibus vel tricuspidalibus eminentia. *Flores* odoris expertes, majores sunt illis primæ speciei, monopetali, stellam referentes quinque cuspidalem, alboflavescentes, ad umbilicum purpureorubri. *Stamina* in illis quinque, surrecta, albicantia, apicibus dotata. *Capsulæ* seminales cuspidatæ, foliis *calycis* maxima parte comprehensæ, ex vertice filamentum ejicientes tenue & albicans. *Semina* in illis passim reperiuntur quatuor, trigona, duobus planis, uno rotundo, costula, in medio extuberante, striantur; colorem referunt feminis *Nasturii*. Tempore pluvioso etiam quam maxime invenitur, æstivo non nisi in locis umbrosis. In decocto assumta antifebrile is. Cum *Zaccharo* ardorem jecoris restringit. In pulverem redacta & cum aqua capiti illita, omnes sedat dolores. Trita & cum *Vaccæ urina* epota omnes arthriticos dolores, præcipue in pedibus, mitigat.

## TABULA 65.


*Convolvulus Indicus minor, folio anguloso, flore ex albo flavescente.*

F I N I S.



# I N D E X.

*Prior numerus tabulam, posterior paginam designat.*

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">A.</div>  <p>Damboe. 56. 115          Ambel. 26. 51          Arega Ambel. 52</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">B.</div> <p>Ballel. 52. 107          Bel Adamboe. 58. 119          Belam Canda Schularmani. 37. 73          Bela Pola. 35. 69          Belutta Pola Tali. 38. 75          Bem Tamara. 31. 61          Ben Tiru Tali. 54. 111</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">C.</div> <p>Cadenaco, feu, Katu Kapel. 42. 83          Carim Gola. 44. 91          Cata Valli vel Kadanaca. 3. 7          Catulli Pola. 40. 79          Cattu Valli. 62. 127          Cit Ambel. 27. 53          Culi Tamara. 45. 93</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">E.</div> <p>Ela Pola. 36. 71          Eleitari. 45. 6. 9</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">I.</div> <p>Infchi vel Infchi Kua. 12. 23</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">K.</div> <p>Kadanacu vel Catavalla. 3. 7          Kapa Tsjaka. 1. 2. 1          Karin Pola. 23. 45          Katou Infchi Kua. 13. 25          Katsjoula Kelengu. 41. 81          Kattu Kelengu. 51. 105          Katu Bala. 43. 85          Katu Kapel feu Cadenaco. 42. 83          Katu Schena. 21. 41          Kodda Pail. 32. 63          Kua. 7. 13          Kurka. 25. 49</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">M.</div> <p>Mala Infchi Kua. 14. 29          Malan Kua. 8. 17          Manja Kua. 10. 19          Manjella Kua. 11. 21          Mareta Inali. 63. 129          Mundi Valli. 50. 103          Muïen Schena. 19. 37</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">N.</div> <p>Naru Kila. 34. 65          Nedel Ambel. 28. 57          Nelenschena major. 20. 39                                            minor. 17. 33          Nir Tjembu. 16. 33</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">O.</div> <p>Ottel Ambel. 46. 59</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">P.</div> <p>Pal Modeca. 49. 101          Panavera Tjeraua. 33. 56          Parua Kelenga. 15. 31          Pongati. 24. 47          Puli Schovadi. 59. 121</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">S.</div> <p>Samudra Sjogam. 61. 125          Schena. 18. 37          Schovanna Adamboe. 57. 115          Sendera Klandi. 65. 133          Sjovanna Pola Tali. 39. 77</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">T.</div> <p>Tala Neli. 55. 113          Tamara. 30. 59          Tjem Cumulu. 47. 97          Tiru Tali. 53. 109          Tsjana Kua. 8. 15          Tsjeroea Cit Ambel. 29. 57          Tsjuria Cranti. 60. 123</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">V.</div> <p>Va Embu. 48. 99          Viftnu Clandi. 64. 131</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">W.</div> <p>Weli Ila. 22. 43</p>
---	--



H O R T I  
M A L A B A R I C I  
P A R S D U O D E C I M A , & U L T I M A ,  
D E  
H E R B I S

ET DIVERSIS ILLARUM  
S P E C I E B U S

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, Brachmannum characteribus nominibusque expressis.*

*Adjecta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera delineatione,  
colorum viriumque accurata descriptione,*

*A D O R N A T A*

*Per piæ memoriæ Nobilissimum ac Generosissimum D. D.*

**HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,**

*Toparcham in Mydrecht, Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Confessus apud  
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, & Equestris Ordinis nomine Illustribus  
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum.*

*In ordinem redegit & latinitate donavit,*

**ABRAHAMUS A POOT M. D.**

*Notis ex parte adauxit, & Commentariis illustravit*

**JOANNES COMMELINUS;**

*Reipublicæ Amstelodamensis (dum viveret) Senator, ac Horti Medici Præfektus.*

*Accedit, præter hujus partis specialem, generalis totius Operis Index.*




*A M S T E L A E D A M I.*

*Sumptibus Viduæ JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van  
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,*

*Anno c1o 1o c c i i i.*



*Anseli Maravara. Lat.*  
20237 . Malabar.  
*Ponoffau-kely. Bram.*





H O R T I  
 M A L A B A R I C I  
 P A R S D U O D E C I M A,  
 D E  
 H E R B I S  
 E T D I V E R S I S I L L A R U M  
 S P E C I E B U S.

*A N G E L I M A R A V A R A.*

T A B U L A I.

**M***Aravara*, Bramannes dicunt *Ponossou-kely*, commune nomen est omnium plantarum, supra arbores crescentium, quæ in terra nec excoli, nec feri nec transplantari possunt; omne quod habent ex corticibus arborum extrahunt, quare etiam nomen *Maravara*, venenum arborum dicit. *Mara* enim arborem, *Vara* malum significat; omnes enim ejusmodi plantæ arbores quasi suffocant, ita ut brevi pereant. Nomen sortiuntur ab arboribus quibus insident; quare & hæc ab arbore *Angeli*, *Angeli Maravara* dicitur. Planta est altitudinis duorum cubitorum. *Radix* alba, lignosa, dura, inflexa, crispata, capillaribus, duris, teneris, pilosis radiculis, corticibus arborum sese affigentibus. Saporis aquei, odoris musci. *Caulis* è radice exsurgit, inter duas foliorum series, simplex, nitens, glaber, viridis, annulatus, intus carne viscida, glutinosa, filamentis lignosis in longitudinem pertexta, quæ quamquam lignosa, nunquam tamen ad duritiem ligni



accedunt, sed semper viscida medulla replentur. *Folia* quæ ex se invicem in vertice caulis proveniunt, & exsiccata ipsum caulem constituunt, oblongo angusta sunt, ab omni parte æque crassa & lata, complicata, glabra, viroris nitentis, sine venis & nervis conspicuis, duobus semicirculis ad se invicem excavata, densa, ita ut vix flecti possint, odoris & saporis expertia. *Florum* petioli, ex ipso caule inter folia, decem vel duodecim simul rectà exsurgunt, virides sunt & rigidi, in longitudine firmioribus nervis instructi, intus carne & humore viscido repleti; ubi excrescunt magna copia minutissimarum gemmularum obducuntur, illæ albæ sunt, pedetentim sese ampliātes at non aperientes, antequam justam consecutæ sint magnitudinem. *Flores* omnes simul sese aperientes, caulem suis investiunt petalis, caudam vulpinam egregiè referentes, aspectu jucundi; petioli albicant, ad verticem caulis reflexi, cauli parvo, acuto foliolo annexi, primo virides exinde ruffi; ipsi flores *hexapeli* sunt, rigidi, crassi, oblongo rotundi, difformes, candidantes, maculis rubris, cæruleis, luridis, aspersi sextum illorum lingulam habet inflexam, præ cæteris eminens, ex cæruleo-rubro optime refulgens, intus & extus pure candidum instar *Lilii*, ex illo deorsum descendit capsula, instar crucibuli, interiori parte cava & alba, exteriori iisdem maculis, ut *florum* petala, aspersa. In medio *florum* circa finem petioli, elegans quasi avicula conspicitur, ex viridi nitens, maculis rubris cæruleisque variegata, crista candida in capite instructa; pes cui insistit colore intense purpureo se diffundit, usque in congeriem petalorum, ubi color tandem sub petalorum albedine disparet. Elegans rostellum aperturæ concavæ illius gemmularum obvertitur, quasi semina ex illa appeteret. Brevi, elegantia & vera effigies, excellentissimæ hujus plantæ, verbis vix exprimi potest, omniumque spectatorum oculos trahit. *Odoris* in totum grati & amæni. *Fructus* ex petiolis *florum* proveniunt, oblongi, rotundi, circa pedem angusti, ad extremitates contracti, vertice tripartito, totidemque extuberantibus costis; viridinitentes sunt & glabri, exinde ruffi & subfusci, intra costas,



M A L A B A R I C U S. 3


Itas, in latere plano, tres conspiciuntur futuræ, in quibus fructus sese aperiunt, & trifariam finduntur. *Cortex* crassus est, intus albus, lineis rubris notatus, illic loci ubi futuræ inter se invicem junguntur, lana candida mollissima fasciatim repletus, quæ fasciæ densissime sunt conjunctæ & quasi intricatæ, oris futurarum affixæ; lana ipsa exsiccata repleta est pulvere ruffo, subtili, instar pollinis, seminis vicem referentes; ipse fructus, petiolus, semen vix ullius sunt saporis vel odoris. Diu superstes est hæc planta, bis quotannis floret, in principio & fine temporis pluviosi, mensibus nempe Aprilis & Octobris. *Flores* per binos supersunt menses; ramus decius, in vitro vel vase aqua repleto impositus, non ante mensem exarescit. Ab incolis nulli adhibetur ornatui, neque in templis, pro monstro enim illam habent, ut quæ contra naturam à terra exulare videatur. Nota quod omnes hæc plantæ *Maravara* in quatuor dispescantur ordines. Prior, qui hic exhibetur, simplici gaudet caule è radice exfurgente, atque eodem modo fructus & ramos floriferos edente. Alter ex communi radice diversos profert, ex quibus quedam plantæ non nisi flores & fructus, aliæ nil nisi folia gerunt. Tertius è radice fructum, è fructu folium, flores, & iterum alios producit fructus. Quartus, ita se arboribus inserit & commiscet ut non nisi magno labore ab illis possit dignosci, flores gerens & folia & fructus. Tota planta cum sero lactis & butyro concocta, vellicationes nervorum, spasmus, motus epilepticos infantum curat; in pulverem redacta & aquæ canne ex qua saccharum conficitur immixta, caput confortat, cerebrumque, vertiginem, febribus præcedentem, tollit: in cinerem combusta, & sale ex cinere extracto, palpitationem cordis sedat: majora folia cum illorum succo umbilico imposita, urinam, arenulas imo calculum & menses promovent. Radix trita cum melle recenti & bene cocto antiasthmaticum est imo antiphtysicum medicamentum: succus viscosus ex caulibus & foliis expressus temporibus & manuum arteriis impositus, febris sistit ardorem.

T A B.



## T A B. I.

Omnes hæ plantæ ordine sequentes sub cognomine *Maravara* descriptæ, ab Authore nostro pro specie *Visci* haberi videntur, quoniam ex sua sententia nunquam in terra progerminarent. Sed, cum pace magni illius viri dictum sit, meo iudicio errat: in hisce enim regionibus multas videmus plantas arboribus vetustioribus insidentes, quæ terræ mandatæ, sola cultura ad plantas possint referri terrestres; ut quam plurimæ species *Filicis Adiantum* &c. Unicum hoc tantum addam, nempe hanc *Angeli Maravaram* speciem esse *Orchidis abortiva*, vel *Orobanche*, ideoque à me vocatur *Orchis Abortiva Aizoides Malabariensis*, flore odoratissimo variegato, intus aviculam representante.





*Biti maram Maravara. Lat.*

203420. Mal.

Giriy. Bramin.





## BITI MARAM MARAVARA.

## T A B U L A I I.



**I**ngua Bramannum. *Giry*, priori speciei admodum similis est. *Radix* crassiola, fungosa, glabra, cineritia, intus viridis, carnosae, viridi mucagine repleta, filamento ligneo suffulta, cui se arboribus vel illarum corticibus affigit. *Caulis* ex foliis conficitur, quibus à radice circumquaque concluduntur, deinde in duas se dividunt series, sed illa exsiccata & decidua caulem reliquunt nudum, qui viridis, vestigiis pedum foliorum in cortice geniculatim notatus, admodum tenuis est, nullo modo divellendus, in una parte viscidis & viridi albicantibus tubulis & medulla mucilaginosae repletus. Saporis & odoris expers. *Folia* cum illis *Angeli Maravaram* in omnibus conveniunt. *Flores* ejusdem sunt formæ, sed rubentes, cæruleis, flavis viridibusque maculis aspersi, avicula purpurea est. *Fructus*, qui ex petiolis florum conficitur, rotundus est & glaber, sine laciniis, in quo ab illo primæ speciei differt. *Succus* cum oleo *Sergelim* & recenti butyro concoctus febris ardorem restringit, stranguriæ medetur, calculos & menstrua provocat, hydropi adversatur, tympanitidem discutit, morbum endemium curat, sanguinem melancholicum purgat. Sed ubi hæc planta supra arborem *Kansjiram* invenitur, tum vomitum ciet, totum corpus immodice turbat, alvum laxat & quidem tanta cum vehementia, ut non nisi summo cum periculo & præcautione adhiberi possit; nam illico sæpius hominem occidit. Nota quod hæc planta tum in totum, fellis instar, amara sit, & flores sine odore vel sapore; raro tamen invenitur, & quam minime in prædicta arbore.

## T A B. 2.

Convenit hæc cum priori, mihi est *Orchis abortiva Aizoides Malabariensis altera, flore odorato, sanguineo colore, intus aviculam purpuream referente.*

P: XII.

B

PON-



*Ponnampu Karavara Lat.*

മുട്ടുപുഷ്പം Malab.

*Suanna-puspā*

सुवर्णपुष्पा Brami

سوارى Arab.





## PONNAMPOU-MARVARA.

## TABULA III.



**I**ertia species quam Bramannes *Souanna-Pouspa*, quasi diceret *flos aureus*, Belgice *Goudblom*; *Ponna* enim *aurum*, *Pou* flos est, vel *Robosa* vocant. *Radix* longa, rotunda, glabra, subviridis, fungosa, interiori parte viridis, humore viscido repleta, filamentum cinereo pertexta, saporis & odoris aquei. *Caulis* ad duos exurgit pedes viridi fuscus est, intus viscida, crassa, alba, limpida aqua & viridi medulla repletus, filamentum carens, odoris & saporis expers. *Folia* cum præcedentibus pene conveniunt, viridia, glabra nitentia, rotundis oris, sine nervis, carne molli, viscida, mucaginosa repleta. *Florum* petioli proveniunt, octo vel decem simul, in altum sese erigentes, circa finem quam pluribus subflavis, & viridi intermixtis gemmulis, tribus eminentibus oris notati, & totidem lateribus planis; ubi cauli affiguntur, foliolo teguntur parvo concavo & viridi. *Flores* hexapetali sunt, crassi, oblongo-rotundi, flavi, interiori parte instar auri coruscantes; illis secundæ speciei admodum similes; *gemmula* in extremitate petioli oblonga est & alba, ad latera glabra, superiori parte quasi ore aperta, ex quo filamentum prodit rubrum, duobus flavis nodulis dotatum. Gratissimi sunt odoris, sed non tam diu supersunt ut illi *Angeli Maravara*. *Fructus* illis primæ speciei similes sunt, excepto quod horum vertices erecti, illorum magis dilatati sint; forma quasi sexagoni, quod in prioribus non item. *Folia* ab incolis coquuntur & multifariam comeduntur, sed non cum supra arborem *Tsjero* vel *Bibo* crescat planta. Bis quotannis floret. Tota planta trita, cocta & cum *Cootsji-Leetsji-Pulle* & oleo *Nucis Indicæ* usurpata lepram sanat; Pulvis cum flore *Oryzæ*, *Nuce Moschata*, *Naega-Pou* & melle



melle permixtus diarrhæam sistit; succus cum Nuce Moschata dysenteriam. Pulvis cum melle exhibitus furiosos sanat, bilem temperat. Flores in pulverem redacti, contra phtysin, asthma, maniam adhibentur.

## T A B. 3.

Hæc mihi est *Orchis Anzides abortiva Malabariensis*, foliis obtusis, flore aureo odorato;









## THALIA MARAVARA.

## TABULA IV.




Quarta species est, Bramannibus dicitur *Thali*.  
*Radices* longæ, corrugatæ, simplices, cinereæ, carneæ, filamento fortiter nervoso, humore viscido & carne subviridi repletæ; odorem referentes Musci viridis, saporem subsalsum.  
*Caulis* idem ut præcedentes sed magis corrugatus, viridis, vetustior cinereus; interiori parte filamentis lignosis repletus, quæ ruffa sunt & subviridia, mucagine obsessa. *Folia* cum prioribus conveniunt, sed densiora, & quasi coreacea, flectu fractuque difficilia; succus expressus & virgula aquantulum agitatus saponis instar spumescit, unde & nomen *Thali* quod spumam significat, plantæ inditum est. Sapor subsalsus est, odor gramineus. *Florum* petiolus cum præcedentibus convenit, sed brevior est, in totum rigidus & lignosus, primo viridis, exinde ruffus, intus albus, humoris, odoris & saporis pene expers. *Flores* ut reliqui sed fasciatim provenientes, multo minores, flavi, rubeis radiis transversim quasi undulati, gratissimi odoris. *Fructus* ut illi *Biti-Maravari*, sed trigoni. Diu superstes est hæc planta, semper progerminans, floret mense Octobri, semel quotannis; ipsi flores à trunco avulsi longo tempore conservantur. *Radix* trita & in pulverem redacta, adhibetur in febribus ardentibus, morbillis, variolis; sudorem enim promovet. Succus Foliorum recens melle permixtus, alvum laxat.



*Kau Tsierou maravira. Lat.*

කෙරුමරු  
*Ambo Kely bram.*

جَهْرُو مَعْرَهُ وَالصَّخْعُ  
*Arab.*





## TSFEROU. MAU. MARAVARA.

## TABULA V.




Quinta species, lingua Bramannum *Ambo Keli*, prioribus multo minor; *Radices* longæ, rotundæ, fuscæ, duræ, tenues, lignosæ. In arbore *Mangus*, unde & nomen sortita est, quam maxime invenitur, odoris Musci; saporis subastringentis amari. *Caulis* arundinis instar erigitur, primo viridi clarus, exinde fuscus; viridi, aquea mucagine repletus, filamentis albis, lentis, nervosis pertexta; hæc a radice per caulem usque in folia divaricantur. *Folia* admodum angusta sunt, una parte concava, exteriori convexa, viridi clara, glabra, crassa, viridi & viscida carne repleta, sine sapore vel odore. *Florum* petioli intra folia proveniunt & caulem, decussatim dispositi, numero decem vel duodecim, teneres, rotundi, lignosi, virides, punctis rubris notati. *Flores* cum suis cauliculis, simul proveniunt, sine ordine viridi, trigono & superiori parte reflexo petiolo insidentes; illis *Ithalia - Maravara* admodum similes; differunt tamen; hextapetali sunt, difformes, quorum quinque flava, rubris quasi flammis circa oras notata; sextum candicat, ora rubent, sed tandem quasi flavescentia in albo disparent; in totum egregii sunt flores, aspectu jucundissimi, odore gratissimi. In medio rotundus, depressus, albus conspicitur globulus, elegantiori flavo penicillo ornatus. *Fructus* admodum exiguus est, oblongus, angustus, viridis, trigonus, inter angulos sutura instructus. Tarde admodum provenit hæc planta, per multos annos superstes, floret mensibus Januarii & Februarii, sed non priusquam aliquot annorum ætatem fuerit consecuta, flores quatuor mensium spatio perdurant. Tota planta in formam cataplasmatidis præparata abscessus sine dolore ad maturitatem perducit, in tempore adhibita affluxum humorum impedit. Pulvis cum aceto omnem renum pituitam expellit, ardorem in urinando & gonorrhæa restringit, ut & influxu albo mulierum; menses supra modum fluentes sistit.



Kally Tserou mau Maravara. Lat.

മലബാർ. Malab.

جوز مكر وكضيق. Arab.





## K O L L I - T S F E R O U - M A U - M A R A V A R A .

## T A B U L A V I .



Uasi diceret Belgice *Bladdrager*. Braman-  
nibus *Ambo-tia* vocatur, masculus quasi  
prioris plantæ, a qua non differt, nisi quod  
nunquam floreat, & folia paulo longiora,  
latiora & rigidiora sint; in medicina plane  
nullum habens usum.

## T A B. 4. 5. 6.

Hæ species plantæ sunt peculiare, quare ad species *Orchidis abortiva* non facile possent referri,  
nec etiam ad *Sedi* species pertinent; quapropter aliis istud iudicium relinquo.





Anantaly Maravara Lat.

മലബാർ കപ്പലി Malab.  
عنان كغلي Arab.





## ANANTALI-MARAVARA.

## TABULA VII.



Rima planta secundi ordinis *Maravara*, etiam supra arbores crescens, sed tales quæ in arenoso inveniuntur solo, ad altitudinem trium quatuorve exurgens pedum. *Radices* habet quam plurimas, tenues, albas, curvas, duras, lignosas, quibus sese corticibus vetustiorum affigunt arborum, saporis & odoris expertes. *Caules* numero plures & quasi stolones è radice proveniunt, arundinacei, rotundi, virides, cochleatim intorti, geniculati, circulis flavis notati, duabus membranibus obducti, quarum exterior nodos geniculorum obtegit, primò viridis, deinde cinereus: interior exteriori parte viridis est & nitens, interiori sanguineo rubra, filamentis albis pertexta. *Caulis* medulla viridi humoreque viscido repletus, filamentis tenuibus & robustioribus suffulto, coloris ruffi; simplex est è radice in rectum excrescens, semper foliis, vel floribus & fructibus instructus. *Folia* quæ suis pedibus instar tubuli concavi caulem investiunt & exornant, oblongo rotunda sunt, sine caulibus, antrosum & retrorsum in acutum desinentia, sed anteriori parte acutiora, oris glabra, secundum longitudinem costis instructa & striata, crassa, rigida, viridi clara, succo & medulla viscida repleta; Odore & sapore destituta. *Florum petiolus*, semper foliorum expers, etiam ex radice progerminat, ad altitudinem trium quatuorve pedum, ex quibus gemmæ, geniculi vel annuli & membranæ, proveniunt, aliquando duo simul, pluribus parvis gemmulis, rudimentum florum, obducti, qui totum caulem investiunt & eleganter exornant. *Flores* propriis suis petiolis striatis ex communi caule plurimi simul proveniunt, candicantes, hextapetali, tribus majoribus constantes foliolis & tribus angustioribus; lingula intus rubra est & crassifolia.



fiola. Gemmæ adhuc clausæ bifariam reflectuntur ab una parte corniculam, ab altera globulum referentes, aspectu jucundæ. Florum petala crassa sunt & rigida, grati & amœnissimi odoris. *Fructus* ex petiolis florum proveniunt, trilaterales, in lateribus planis sutura instructi, ita ut quasi sexagoni videantur. Semine, colore, substantia destuuntur, illis primi ordinis in omnibus similes. Omnem hæc planta respuit culturam; diu superstes est; semel quotannis floret circa mensem Junium, flores quinque mensium spatio perdurant, quo tempore nec exarescunt nec decidunt. Florum caulis circa illud tempus avulsus & loco ficco suspensus, omnes suos profert flores & gemmas, quæ fructibus ad maturitatem perductis decidunt; ita ut nil nisi aëre, sine ulla alia materia, hæc planta ad progerminationem indigere videatur. Perennis est, per radices nempe, è quibus continuo novæ producuntur. Tota hæc planta recens usurpata, succus imprimis exhibitus, omnis generis ventris dolores & colicam sistit, bilem movet, alvum laxat.

## T A B. 7.

Hæc mihi est *Orchis abortiva latifolia Malabarica, Clitoride, flore luteo, piloso.*





*Kanspram Marabara. lat.*  
Ἐξ ἔβ3ε Malab.  
Sonou. bram.





## KAN S FIR A M - M A R A V A R A .

## T A B U L A V I I I .



Ramannibus dicitur *Sonou*; secunda species ordinis secundi; præsertim supra arborem *Kansjera Maram* crescit, in cujus fructibus rotundis, depressa illa, & in officinis notissima semina inveniuntur, *Nuces Vomicae* dicta, quod in descriptione istius arboris omisimus. *Radix* crassa, fungosa, crinita, carnea, nodosa, ruffa, muscosa, quæ se corticibus affigit & illis quasi adhæret, instar tuberis enim cum illo unitur. Saporis subamari, odoris aquei. *Folia* plura ex nodo radice proveniunt ad longitudinem duorum triumve pedum, latitudinem duorum digitorum, circa pedes angusta, ad extremitates latiora, obtusa, duabus suturis incisa, glabra, nitentia, viridi fusca, crassa, sine costis, interiori parte tenui textura, in longitudine filamentis oblongis repleta, succus viscidus est, caro viridis; saporis amari, sine odore. *Florum caules* quam plurimi, simplices, indivisi ex radice proveniunt, nodo vel fasciculo gemmarum instructi, quæ in progressu ad pollicis latitudinem à se invicem distant; rotundi, virides, nitentes, hinc inde membrana alba, tenui obtekti, quæ tegumentum gemmarum, nodo adhuc contentarum, fuerunt; intus albi, lignosi, clara, viscida aqua repleti, saporis amari. *Flores* hextapetali sunt, multum à se invicem differentes, petiolo, sex lacunis instructo insidentes; petalorum tria oblongo angusta sunt, intus egregie rubentia, oris albis, exteriori parte albo & viridi striata, cui sese rubicundus intermiscet color, anteriori parte in acutum contracta, futura extuberante instructa; ex adverso horum petalum invenitur flavum, rubro colore quasi lineatum, duabus auriculis inflexis. *Stamen* sanguineo rubrum est, tribus rotundis, flavis globulis instructum; duo reliqua quæ huic à latere sunt, non tam longa nec tam acuta

P: XII.

E

sunt,



sunt, crispata, alba, rubro colore interstincta. Sine odore vel sapore. *Fructus* ut illi *Talia* & *Maravara* sed multo crassiores, in vertice coronam quasi divisam gerentes, virides, intus fasciculis parvis seriaceis repleti, in quibus femina, pulveris instar, includuntur, quæ, ut & fructuum cortex, rubescunt. Diversis arboribus insidet hæc planta, maxime illi *Caniram* vel *Cansjiram*, semper cum hoc discrimine, quod in posteriori, à qua etiam denominatur amara sit, flores inodori; ast in aliis arboribus odoris sint fortis, grati & amœni; bis quot annis floret mensibus nempe Aprili & Octobri, diu superstes est, tardè crescit, nullis sacris, nec recreationibus ab incolis consecratur. In pulverem redacta cum *Zinzibere*, & aqua assumpta vomitum excitat & diarrhæam, morbos inveteratos, oculorum caliginem, vertiginem, paralyfin curat.

## T A B. 8.

Inter plantas diversis temporibus nobis ex America allatas, etiam illæ erant, quæ illic loci *Aloë* arbores appellabantur, non quod *arborescentes* sint, sed quia supra arbores invenirentur; hanc quod attinet, vocari posset *Aloë affinis Indica supra arbores crescens*.





*Maravara Tsjem bu la*

മരവര തട Malab.

Lucalu.

पुखताड bramia.

رُجْعُ جَمِينُو Arab.





## MARAVARA TSJEMBO.

## TABULA IX.

**B**Ramannicè *Roukalou*, tertia species secundi ordinis. *Radix* alba, rotunda, nodosa, aspera, ab omni parte fibrillis intricatim dispositis, obsita, intus carnea, paucissimis per texta filamentis, admodum aquea, qui humor aëri, expositus statim incrassescit & coagulat, linguam ardens imo vellicans, odoris fortissimi, saporis ingrati, ad amarum vergentis. *Folia* plura numero è radice proveniunt, quorum caules longi, extus glabri, virides, nitentes, rotundi, circa pedem rubri ibique linea interna quasi bipartiti, intus fungosi, tubulis, medulla aquea repleti, qui humor primo limpidus, crassus, flavus & rubeus evadit. *Folia* illis arboris *Bupariti* admodum similia sunt, oblonga, lata, circa caulem viridi diluta, admodum mollia; anteriori parte glabra, viridi fusca, nitentia; *Costæ* altum eminent, linguam vellicant imo ardent; odoris nullius vel paucissimi. *Florum* *Caules*, eodem modo ut folia ex radice proveniunt, circa principium crascentiam digiti adæquantes, in acutum desinentes, rotundi, subruffi, viridi fusci, geniculis & nodulis obliquis interstincti, introrsum & extrorsum intorti, in quibus flores fasciatim proveniunt, ordine decussato; ipse caulis admodum aqueus est, sed non ita ardens, sine odore. *Flores* calices sunt albi, piriformes, sine petiolo cauli annexi, ubi se aperiunt decem vel duodecim subtilia, candidissima, rotunda conspiciuntur filamenta, penicilli instar; rosas dices vel stellulas, odoris expertes, saporis aliquo modo acris. *Semen* à subtilissimo pulvere non distinguitur, coloris ruffi. Toto anno foliis & floribus instructa est, hæc planta, per multos annos in radice superstes. *Radix* cum *Manjella* vel *Curcuma* & oleo *Nucis Indicæ* in formam unguenti redacta, herpem omnesque inveteratas scabiei species sanat.

Suc-



Succus cum vaccæ urina haustus, omnis generis venenum expellit, præcipue autem serpentis *Marapentho*, belgice den *Verrotter* dicti, qui alias incurabilis. Si quis ab hoc serpente ictus per antidota superfit & non statim moriatur, corpus tamen putredine afficitur, ita ut quotidie frustra ex illo decidant, & sic miserrima morte pereat æger.

## T A B. 9.

Folia hujus plantæ externa facie illis *Colocasia*, vel *Ari Ægyptiaci* similia sunt, sed pro conspecie illius haberi non potest, flos enim & semina non conveniunt.





*Patitsjevi Maravara. Lat.*

പട്ടിടജി. Malab.

Suna Sjiba

सुनाडीवा. Bram.

چھوٹی چھوٹی. Arab.





## PATITSIVI MARAVARA.

## TABULA X.



Inguā Bramannum *Souna-Sjiba*. Quinta species secundi ordinis. *Radices*, parvæ, ruffæ, duræ, fibrosæ, saporis aquei, odoris muscosi. *Folia* plura simul è radice proveniunt: quorum caules longi, rotundi, firmi, lignosi, nigri, nitentes, hinc inde lana floccida, candida, vestiti; ubi primò progerminant, in totum illi obducti, quæ postea perit; folia juniora formam harpaginis referunt, viridia, lana candida tecti, deinde fuscescunt, oblonga, tenera, glabra, in acutum desinentia, circa pedem ut illa *Poe-Paretti* duobus circulis incisa, dura, nitentia, sine costis vel venis conspicuis; cauli videntur affixa, non inserta. Nunquam floret, diu superstes est. Folia toto anno decidunt & de novo proveniunt. *Succus* radicis cum pulvere dentis *Tigris*, dolorem ex morfu serpentum & scorpionum sedat, illorumque venenum tollit, fluxum sanguinis narium sistit, sanguinem ex casu vel ictu, in corpore coagulatum, attenuat & discutit.

## TAB. IO.

Non dubitarem quin hæc planta sit ex genere *Phyllitidis*; sed illud mihi non certo constat, meo iudicio appellari posset *Phyllitidis affinis Indica, foliis Ari*.



*Polypodium quercifolium*

Pars XII Tab. 11.

Panna-kelengo. Maravara Lat.

21 03 28 03 Malab.

Kadekou. bram.





## PANNAKELENGO-MARAVARA.

## TABULA XI.



*Panna* commune nomen est omnium illarum plantarum, quæ cum *Filice* arborea aliquo modo conveniunt. Plures hujus plantæ sunt species, hæ autem cognomine *Maravaræ* indicatæ, à Botanicis Malabariensibus seorsim tractantur, & inter arborum venena recensentur, quanquam reliqua genera cum hisce maximam habeant convenientiam. Nostra hæc à Bramannibus *Kadehou* appellatur; belgicè *Wortel Varen*, *Kelengou* enim radicem dicit; quarta species est secundi ordinis. *Radix* rotunda, longa; crassa, exterius fusca & muscosa lanugine obsessa, qua se arboribus affigit; interius flava, carnea, densa, sine filamentis vel nervis, pastinacum instar, non lignosa, flectitur at non facile frangitur; humor aqueus est non mucaginosus, saporis amari, odoris gravis. *Folia* plurima numero è radice proveniunt; cancellatim fuscis & pene nigris venis pertexta, admodum rigida, vitri instar, nullo modo flexibilia, primo viridia, exinde ruffo-fusca, admodum nitentia, circa radicem, duabus eminentibus subrotundis auriculis, crispata, lata, in acutum, apice spinoso, pedetentim desinentia; humoris pene expertia, ferratim incisa. *Costa* media in adversa parte eminent. Præter hæc diversi è radice protruduntur caules, ad altitudinem duorum cubitorum, constantes ex nitente, fusca, dura, semicirculata & inflexibili costa, utrimque foliis alata; cum prioribus in omnibus conveniunt, sed dimidio longiora sunt. Nec floret, nec fructus fert hæc planta, semper virens, per multos annos superstes; circa tempus pluviosum, quam maxime progerminat, imo toto anno; radices vetustiores, funis instar arbores obvolvunt; folia vix pereunt; ab omnibus insectis immunia. Tota hæc planta, si quando supra arbores *Cansjiram* inveniatur, etiam easdem habet vires; si supra *Nucum Indicæ*; aphtas nigricantes  
cu.



cura ; si supra *Alou*, omnem ardorem viscerum refrigerat ; cum *Sandalo* & lacte mulierum post aures applicata, oculorum fluxum & caliginem abigit.


## T A B. II.

Nullus dubito quin hæc planta sit species *Polypodii*. Doctiss. Dom. Breynius *Centur. 1.*, adhuc alias *Polypodii Indici* species recenset ; sed cum hujus foliis minimè convenientes ; hæc à me vocatur *Polypodium Indicum foliis latissimis*.





*Allypodium*



Wellipanna kelengul  
Malab.  
يعنق  
فخره نغز




(præced.)

Pars XII. Pag. 13.

Weli panna Kelengou maravuru la

മലബാർ Malab.

وَقَلِيُّ يَحْنَاءُ Arab.





WELLIPANNAKELENGU-  
MARAVARA.

## TABULA XII. &amp; XIII.



Uasi diceret Belgice *Groot-Wortel-Panna*; *Welli* enim *magnum* significat; à Bramanibus *Kadehou-Maa* vocatur. *Radix* longa, crassa, subrotunda, nodosa, aspera, castaneo fusca, rigida, lignosa, intus cinerea, filamentis nigricantibus, fortioribus, nervosis pertexta, succo albo, limpido, mucaginoso repleta; odor gravis est injucundus, limosus; sapor amarus, adstringens, & summopere ardens. *Caules* tres quatuorve simul ex extremitatibus radice proveniunt, ad altitudinem octo vel novem pedes exsurgentes, indivisi, illis *Nucis Indicæ* similes; exteriori parte spinosi, fusci, nitentes, admodum duri, interiori multis filamentis in longitudinem suffulti. *Folia* oris non serratis magno numero ex caule proveniunt, cui, mediante costa rigidiori, ordine decussato, sunt affixa; tres digitos lata, viridi clara, rigida, duas spithamas longa, alatum expansa, ficcata diu durant etiam in aperto aëre; ad amarum vergunt; odor muscosus est. *Flores* nec *fructus* unquam visui objiciuntur; sed vetustior facta planta, ex adverso foliorum lanugo quædam ruffa invenitur, pulvere repleta; qui seminis locum supplet. Incolæ ex ramis hujus plantæ, sepimenta hororum & agrorum conficiunt. *Succus* radice vermes enecat, bilem sistit & temperat. *Folia* in pulverem redacta cum *melle* assumpta secundinas, menses, imo foetum ipsum fortiter ejiciunt; mulieres ergo cavete vobis.

## TAB. 12. 13.

Clarissimus D<sup>o</sup>. Breynius, Centur. 1. Cap. 96. | *serratis maxima India Orientalis; eandemque à Bon-*  
 mentionem hujusmodi plantæ, forte ipsissima est; | *tio sub nomine Phyllitidis esse descriptam.*  
 ab illo vocatur *Filix non ramosa, foliis integris, non*

P: XII.

G

TA-




Tama Poulpaalsja maravara lat.

തമിഴുകിലി. Malab.

Bendarli.

बेदरलि. bramin.

طَمْعُ عَلِيجِيَا. Arab.





TAMA-POVEL-PAATS J A-  
MARAVARA.

VEL

ENEADI-KOURENGO.

TABULA XIV.



U Ndecima species secundi ordinis; Bramannicè *Bendarly*; admirabilis cognominatur, hoc enim dicit *Tama-Pouel*. Christiani montis *S. Thomæ* vocant illam *Flagellum S. Thomæ*; Lusitani *Couda de S.<sup>o</sup> Francisco*. *Radix* è multis constat tenuibus filamentis fibrisque curvis, lignosis; exteriori parte flavis, interiori pallidis, aliquantulum glutinosis, odoris fortis, non injucundi; saporis subsalsi. *Caulis* simplex è radice progerminat, ad altitudinem duorum circiter pedum, ubi se bifariam dividit, rursusque ad illam altitudinem exfurgit, sicque tertio, quarto, quinto & sexto; ramuli ubique ejusdem sunt longitudinis, exactissime flagellum referentes. Ipse caulis octo costis profunde striatus est, rotundus, albus & viridis, vetustior ruffus; plurimis albis nervis instructus, intense cum suis ramulis erectus, aspectu jucundus. Odoris & saporis pene expers. *Folia* parva sunt, concavo reflexa, apicibus deorsum vergentibus, illorum cauliculi parvi sunt, in adversa parte sese exporrigentes, ubi folia aliquo modo convexa, interiorem formam concavam faciunt, sine nervis vel venulis conspicuis; de cætero viridiclara, glabra, nitentia, densa, admodum rigida, humore parum mucaginoso, modice repleta; totam plantam ambiunt, costis caulis affixa, ita quidem ut quatuor folia in uno circulo, sibi invicem ex adverso opponantur, ac intra unumquodque illorum spatium relinquatur vacuum; quò sequentia commodum haberent locum, pedetentim minora evadunt; usque ad quintam & sextam divisionem, ubi foliorum formam amittunt, squammis non absimilia, quibus ramulorum extremitates in totum ob-



obteguntur; florum locum suppleant, coloris viridi flavi, sub quibus ruffus invenitur pulvis, tum temporis, quando planta jam inverata, sicca & ruffa facta est. Pes caulis à radice oblongis, acuminatis, angustis obtegitur foliolis, ad altitudinem minime digiti; unde folia ordine initium habent. Saporis aquei sunt, aliquo modo ad subsalsum vergentis. Odorem, si referant, fœni exsiccati referrent. Multum temporis requiritur, antequam justam acceperit magnitudinem, per plures annos excrefcens. Etiam diu superstes est vel supra arbores, vel inde desumta; ita ut nulla pene mutatio in illa vel hyeme vel æstate, vel tempore pluvioso vel sicco, multò minus vel flores vel fructus videantur. Arbores quibus plerumque insidet sunt *Mau*, *Jaca* & *Alou*. Radix trita lacte permixta, jejunoque stomacho epota, nauseam ventriculi sistit, menses promovet, pulmones & lien emollit, hydropisim curat. Tota planta aquæ incocta & lacte *Nucis Indicæ* permixta dysenteria medetur; veneno resistit; cum Saccharo Arboris *Kavi* vel *Karimpanna*, generationem adjuvat tam in viris quam in foeminis, imo & foecunditatem promovet. Nota. Arbor hæc *Karim-Panna* vel *Palmeira Brava*, prima Parte Tab. IX. pag. XI. descripta, non est illa arbor, quæ ab incolis Cylanensibus *Talas Gas*, vel *Talagaha* nominatur, ut doctissimus D<sup>o</sup>. *Arnoldus Syen* piæ memoriæ, ex aliquali foliorum convenientia judicavit. Præter hæc salutiferas vires, quæ multæ & revera egregiæ sunt; incolæ adhuc alias illi adscribunt, quæ extra rationem & ridiculæ videntur. Nugis non delector, adeoque illas enarrare non lubet, nec ex parte nec omnes; omnium loco sit sequens hæc narratio. Firmiter persuasi sunt incolæ, ut si duobus hominibus ramus cum priori divisione detur, atque ille ita laceretur, ut quisque justam dimidiatam partem retineat, sudore humectet, & continuo penes se calefaciat; illi vesano quasi amore erga se invicem ferantur; sed si alter illorum partem suam amittat vel à se deponat, amorem quidem suum fervet, ab altero tamen ita odio, & quidem tanta cum averfione habeatur, ut ipsum  
vel



vel videre, vel de illo cogitare non sine tædio possit; usquedum & alter etiam suam deposuerit partem; quo facto uterque in integrum restituatur. Nec ad hoc solum sed etiam ad libidines venereas excitandas & incitandas adhibetur; imo inter personas ejusdem sexus, quo amicitia inter illos perpetua fiat; extenditque se hoc mysterium eo uique, ut non vereantur herbam hanc clanculum insuere vestibus, calceis & armillis illorum vel illarum, quorum amicitiam sibi velint vendicare. Præterea ab illis habetur pro clypeo, contra omnis generis fascinationes, incantationes, execrationes, atque omnibus bene fore, modo secundum regulas ab illis præscriptas adhibeatur; sed illæ tot cavillationibus, observationibus & determinationibus sunt implicitæ, ut merito à sapientioribus detestentur & repudiantur. Quæ quamvis fabulosa sint & incerta, hoc tamen verum est, plantam esse omnino præstantissimam, cujus virtutes excellentissimas & efficacissimas ex asse describere, majorem requireret paginam. Doctissimus atque excellentissimus D<sup>o</sup>. *Paulus Herman*, Medicinæ Doct<sup>or</sup>, jam vero, Lugduni Batavorum Botanices Professor celeberrimus, obnixè à me petiit ut illam, cum in Insula Ceylone degeret, transmitterem, sed licet totæ regiones & illarum incolæ, ex auctoritate principum illorum, mihi ad manum essent, nunquam tamen illam potui consequi; sed jam ad iter accinctus, transmissa mihi est per celeberrimum Dom. *Alexandrum* istius regionis indigenam, Archiepiscopum Montis & Christianorum Sancti *Thomæ* in insula Malabariensi.

## T A B. 14.

Multi diversiq<sup>ue</sup> docti viri, quasi admiratione rapti fuerunt super hujus plantæ figuram & virtutes, miraculum enim magni & nunquam fatis laudati videtur creatoris. Expertissimus, perdoctissimusq<sup>ue</sup> D<sup>o</sup>. *Breinius*, Centur. 1. Cap. 92. | illam descripsit nomine *Selaginis India Orientalis*; | sive *Plegmaria admirabilis Ceylanica*. Nostri auto- | ris descriptio prolixior est, viventem enim illam | viderat, sed *Breynii* delineatio multo accura- | tior.



*Diplazium malabaricum*

Pars XII. Tab. 15.

*Pā-pāna Maravara. Lat.*

പാപാന മാലബ. Malab.

پان پنا Arab.





## PARA-PANNA-MARAVARA.

## TABULA XV.



Uasi diceret *ramosa*, *Paraa* enim ramum significat; nona species secundi ordinis; Bramannice *Bosaya*, æque supra terram ac arbores crescit. *Radix* fusco ruffa, rotunda, geniculata; pilosis vestita, fibrillis, pollicem crassa, interiori parte rubra, carne densa, fuscis nervulis pertexta, humore viscido repleta; subamara, astringens, odoris gravis & muscosi. *Caules* numero plures è geniculis proveniunt ut illi specierum *Vallia*, belgice *Kruipers*; formæ & figuræ ut illi *Kari-Welli-Pannæ*, sed non tam altè exsurgentes; viridi clari, succosi. *Folia* etiam ut illa *Kari-Welli-Pannæ*, excepto quod non tam profunde sint incisa, neque etiam tam rotunda; sed in hoc differunt, illa quasi rotunda pomula gerunt, hæc rugosistantum, fuscis, obliquis lineis (illorum semina) obducuntur; sine sensibili odore vel sapore, aliquo modo tamen gravi & injucundo. Nec flores habet nec fructus, præter fuscam illam hirsutiem, quæ exsiccata, pulveris instar avolat, & supra arbores incidens, novam plantam producit, sicque suum genus conservans. Non tam diu superstes est, hæc planta ut quidem reliquæ, biennio enim vel ad summum triennio radices interiunt, & facillimè exsiccantur. Adversus morbos adhibetur endemios, febres intermittentes curat; tussim sedat, alvum laxat. *Succus* cum sanguine gallinæ permixtus ardorem expulvere pyrio & ferventi oleo contractum refrigerat.



*Kal-panna-maravara* Lat.

കുളിപ്പന്നം Malab.

فجل ينعغ Arab.





## KAL-PANNA-MARAVARA.

## TABULA XVI.




Ramannes dicunt *Alpam*; etiam supra arbores crescens, sed in solo petroso, unde & nomen consecuta est; *Kal* enim petram dicit. *Radix* tenuis, fibrosa, pilosa, nigra, densa, nervosa, intus cinerea, odoris fortis; saporis aliquo modo subamari. *Caulis* simplex è radice exsurgit, ad altitudinem pedis, in multos se dividens ramos, viridi clarus, depressus, angulosus, laciniis ab una parte striatus, intus aqueus, hinc inde pilis obsessus. *Folia* mutantur in ramos; costa enim folium constituens, se longius exporrigens, unaquæque incisio in privatum folium, folium vero in ramulos excrescit; qui iterum multa producant folia, oblonga, anteriori parte obtusa, tribus quatuorve punctis rotundiolis profunde incisa, unumquodque punctum nervulo costæ mediæ infigitur, rami & folia communi cauli sunt annexa, decussatim disposita, glabra, viridi clara; *costa* media in adversa parte eminent; in qua plura sese oblonga, ruffo fusca exhibent ova, feminis locum suppleant. Admodum tenera est hæc planta, umbram amans, annua, è radice de novo progerminans, tempore pluvioso à mense Aprili ad Septembrem usque. Adversus morbos chronicos, hecticos, tussim, dispnæam adhibetur cum *Para-Panna* & *Kari-Welli-Panna*.



*Kari-beli-panna maravara Lat.*

കരിവലിപ്പന്നം. *Mal.*

قحاري و هلي پغناء *Arab.*





KARI-WELLI-PANNA  
PARAVARA.

## TABULA XVII.



Octava species secundi ordinis, sive *Panna major sylvestris*; Belgice *Groote Wilde Panna*, *Kari* enim *sylvestre* dicit; Bramannice *Maa Panna*; supra omnium generum arbores crescens. *Radix* aquea, nigra, nodosa, circumquaque fibris fuscis, capillatis obsita, carne densa & fragili; odoris & saporis pene expers. *Caules* è radice ad altitudinem quinque vel sex pedum exsurgunt, rigidi, lignosi, pene quadrati, viridiclaro, ab una parte lacinia excavati, interiori parte albo pallidi, humidi, simplices, indivisi, odoris ingrati. *Folia* ut illa *Nella Panna* proveniunt, spithamam longa, pollicem lata, acuminata; *costa* media in adversa parte parum eminent, instar caulis, viridi clara; ab hujus utraque parte foliorum ora, rotundis sunt incisa laciniis, similitudinem parvorum foliorum referentibus; in adversa parte supra costulas transversas, parva, rotunda, fusca reperiuntur ova, & quidem magno numero, nitidissime decussatim disposita; præter illa nullos habet vel flores vel fructus; diu superstes, in totum sua natura quoad mutationem nempe cum *Nella-Panna-Maravara* conveniens. Tota planta adhibetur in Morbo Endemio, ille est languor vel infirmitas membrorum, decoloratio viridi cutis coloris; indigenæ enim non tantum instar mortui pallidi sunt, sed & flavi, imo ipsa oculorum albedo, dispnæa & intolerabilibus corporis doloribus continuo subjecti, qui ex malignis ventis nocturnis, & irregulari vita causantur. Cadavera horum dissecta, semper lien deprehenditur lapidis instar induratus.



*Asplenium platyneuron* Host.  
*canaliculatum* P.

Pars XII Tab 18.

*Nella panna marocana* Lat.

نيللا پاننا  
مراکش





## NELLA-PANNA-MARAVARA.

## T A B U L A X V I I I.

**B**Ramines dicunt *Panna* septima species secundi ordinis; à virtute & viribus nomen habens, quasi diceret *Panna bona*, *Nella* enim bonum vel salutare notat. Crescit supra arbores qui in petroso inveniuntur solo, quare etiam & *Kal-Maram-Panna* nominatur. *Radix* nihil aliud est quam massa vel fasciculus multarum fibrarum, filamentorum capillarum & radicularum, quæ fusco nigræ, lignosæ, alia adhuc muscosa hirsutie complicatæ & intricatæ sunt. Odoris sunt gravis, saporis subamari, limpido humore repletæ. *Caules* plures simul è radice exsurgunt ad altitudinem trium quatuorve pedum, simplices, indivisi, rotundi, glabri, castaneo fusci, nitentes, rigidi, lignosi, ab una parte plani, sed lacinia excavati; adhuc teneri summitates circumflectuntur & corrugantur, fuscosa lanugine, quæ deinde perit, vestiti, sine odore vel sapore. *Folia* oblongo angusta sunt, gradatim utrinque incisa, in acutum desinentia, dura, rigida, erecta. *Costa* folium inæquale dividens in adversa parte eminet. Sine odore vel sapore. Per multos annos in radice superstes est, bis quotannis progerminans mensibus nempe Septemb. & Octob. nec florens nec frugens. *Radices* in pulverem redactæ & cum bubuli lacte epotæ, disenteriam vel tenesimum sistit. *Folia* contusa cum illorum succo assumpta, alvum leniter laxant, sanguinem purgant. Tota planta in formam balnei præparata, & pro infessu, ad umbilicum usque, usurpata, mirum in modum partum promovet, pituitam pulmonum attenuat, lienem induratum & obstructum aperit & emollit, si quando succus cum radice arboris *Canellæ* jejune assumatur.



*Acrostichum flagelliforme*

Pars XII Tab. 19.

Pannā Kara-maravara Sa

Malab.

Pannā

Bram.

عنتج Arab.





## PANNA MARA-MARAVARA.

## TABULA XIX.



Sexta species secundi ordinis; Bramannes dicunt *Thola*; etiam supra arbores, loco petroso dispositas, crescens. *Radix* ab una parte excurrit, curva, nodosa, exterius fusca, interius ruffa, lignosa, plurimis fibris capillisque nigris, circa inferiorem partem coriacea hirsutie, cui se corticibus arborum affigit, obfessa; odoris gravis & ingrati, saporis amari. *Caulis* plures ex radice proveniunt, ad altitudinem quatuor vel quinque pedum, tenues, glabri, nitentes, intus pallido virides, carne densa, albis nervulis secundum longitudinem pertexti; ab una parte rotundi, ab alia plani, ubi costa quædam extuberat, in medio & circa oras glabri, ubi duæ foliorum series sex vel septem numero, decussatim videntur, quibus caulis ab utraque parte alis quasi instructus videtur, quæ plumarum instar flammearum sese offerunt; vetustiores factæ punctis & dentibus exporriguntur, caudam referentes flammeam; rigidæ, flexiles, viridi claræ, siccæ, amaræ, odoris gravis & ingrati. *Folia* forma & figura sunt diversa, juniora tenuia, parvum digitum longa, duos lata, in acutum desinentia, posteriori parte parùm rotundiora, rigida, fuscoviridia, nitentia, oris glabra, cum costa in utraque parte eminente; vetustiora sese ad sesque spithamam extendunt, quando margines serratim inciduntur, costæque altius extuberant. Nec floret nec fruget, per multos annos superstes, continuo, circa initium temporis pluviosi, & quidem toto anno, æstate humida, è radice progerminans. Cum *Saccharo* in syrupum redacta, tussim, morbum endemium; omnia pulmonum vitia, dispnæam, morbum lunaticum, phtysin curat.




*Scindapsus pertusus.*

*Pars XII Tab. 20.*

*Elitta di maravara lat.*

കവനമി. Malab.

خهلن طائضه Arab.





(1700)


Pars XII. Tab. 21.

*Elettadi-maravara* Lat.

ਅਲੀ ਸਰਕੀ Mal.

ਅੱਚਲੀਂ ਕਲਾ ਸੁਬੰ

*Soumala* bram.





## ELLETTADI-MARAVARA.

## TABULA XX. &amp; XXI.

**S***Oumalla* Bramannes dicunt, duodecima species secundi ordinis. *Radix* sesquidigitum crassa, rotunda, geniculata, caudarum instar magnorum, nigrorum agrestiumque scorpionum; alba, viridipallida; intus fungosa, admodum aquea, hinc inde multis crassis, curvis carnosisque radicibus, ab illa parte ubi alba, obseffa, quibus se corticibus arborum affigit; intestina referentes glabra & nitentia; odoris sylvestris & muscosi, saporis ingrati; adstringentis. *Folia* plura numero ex radicis extremitate proveniunt, ut illa *Anseli Maravara*, quorum caules admodum glabri, cavi, virides, nitentes; illis folia insident simplicia, oblongo angusta, tres pedes longa, duosque & dimidium lata, viridi clara, fungosa, glabra, admodum nitentia, ut illa *Ponnam-Pou*. *Caulis* ab una parte ad supremam excurrit. *Costa* media in adversa parte eminent; folia inter costas profunde sunt incisa; multis in locis magnis foraminibus, vel ocellis, veluti fenestris perforata; decidua, illic loci radicem constituunt, geniculis interstinctam; & illa quoniam in vertice semper nova producat folia, quæ iterum folia, illæque iterum novas constituent radículas & hæ continuo rursus proserpent, hinc fit ut arbores in totum pene ab hac planta obtegantur. Nec floret nec fruet, per multos annos superstes, imo pene perennis, arbores pene suffocans. Nullius in Medicina usus.



Teka-marabara.

മരവൃക്ഷം Malab.

Zuca keli.

सुककोकी Bramin.

ساقه و عصبه Arab.





## THEKA-MARAVARA.

## TABULA XXII.



Secundum Bramannes *Rou-Kakely*; prima species tertii ordinis; sic vocata ab arbore *Theka*. Radix admodum fibrosa est, tenuis, lignosa, dura, rigida, ruffa, ab una parte fasciæ (quæ se arboribus affigit) ad aliam, veluti funiculis reticulatim excurrens; ex hac radicis fasciâ, nodus progreditur, in principio octo lateralis, sed major evadens & intumescens, quadratus, cujus latera plana sese in medio aliquantulum quasi costæ extollunt, unde in junioribus nodis octo illa constituuntur latera; nodus ipse oblongo angustus est, in acutum desinens, viridis, glaber, nitens, cortice crasso, viridi, densa carne repletus, humor viscosus est, qui nodo disrupto, filamentis extenditur, telæ aranearum instar, saporis subsalsi. *Folium* ex unoquoque nodo, unicum provenit, oblongum, ovale, vertici nodi insidens, crassum, lene, glabrum, nitens, ut illud *Ponnam-Pou-Maravara*; lim-pido & viscoso humore repletum, in medio rectæ partis futura striatum, textura densa, rete referens, saporis subsalsi. Nodus si pro fructu habetur, fruget, sed in fructu nullum reperitur semen, nec floret; tamdiu superstes est planta, quamdiu arbor cui insidet supermanet; terræ mandata nequaquam progerminat. Planta cocta & in formam lotus adhibita, omnis generis catharros & gravedines sanat. In pulverem redacta & false mixta Hydatides. Cum foliis *Cassia fistulæ* vel *Connæ*, *Zingibere* & *Muria* supra ignem ficcata & torrefacta, herpeti medetur, variolis, scabiei. Pulvis fructus cum stercore glirium circa inferiorem abdominis partem, cum melle, oleo *Nucis Indicæ* illitus, urinam brevi tempore promovet. *Succus* nodi auribus inditus, illarum apostemationem juvat, surditatemque accidentalem abigit.



*Tsjerou. Tecka maravara, Lat.*

അറുവു. Malab.





## TJSEROU-TECKA-MARAVARA.

## TABULA XXIII.



Uasi diceret *Theka Maravara minor*; Bra-  
mannicè *Bouka-Kely* cum priori in omnibus  
convenit; excepto quod omnes partes sint  
minores, fructus rotundiores. *Folia* in  
acutum non desinant sed in extremitate ex-  
caventur, & in duo dividantur. Sapor,  
odor, vires, usus idem.





*Wellia Theka-maravara*  
sive *Mau-marabara* Lat.

മരവര . Malab.

Talassi . Bramin .

شقفق ووعضف . Arab.



13



## WELLIATHEKA-MARAVARA

VEL

## MAU-MARAVARA.

## TABULA XXIV.



Uasi diceret *Maravara magna*, tertia species tertii ordinis; Bramannum lingua *Tolassi*; radices habet plurimas, parvas, tenues, lignosas, curvas, nigricantes, fasciatim arboribus *Theka* & *Mau* insidentes, odoris & saporis expertes. *Folia* ex radice proveniunt, primò brevia & simplicia, ad longitudinem cubiti excrescunt; in adversa parte convexa in recta concava, ubi folia glabra, plicas aliquas referunt, quæ penes caulem profunde in puncto folii in nihilum abeunt. *Costæ* quatuor vel quinque in adversa parte altum eminent; concham instar illius S. Jacobi in interstitiis, conficientes. Folium ipsum admodum rigidum est, caro densa, lenta, coriacea, flexu difficile, viridi fuscum, glabrum, nitens. Quo major evadit eo magis in pede incrassatur, imo in nodum evadit, qui prius trigonus, exinde glaber est & rotundus, ex quo, similitudinem fructus *Thekæ Maravaræ* referente, deinde nova folia, prioribus nempe deciduis, progerminant, ex unoquoque nodo unum non plura; nodi ipsi ex flavo virides sunt, carnosissimi, humore glutinoso, sicut & folium, repleti; odor exiguus est; sapor inter falsum & acidum, sed nauseabundus. Ex cavofoliorum caule, longa, angusta, plano rotunda, viridis excrescit spica, similitudinem referens parvi serpentis, squammis, in duas series, obtecta, cujus cauda longa, nuda, glabra, viridis, ab una parte futura striata. Sub foliolis illis squammosis *semina* concluduntur; intra unamquamque squammam unicam, depressum, rotundum, viride, cucullula incurvata obtectum, cujus cavitati affigitur, cuculla ipsa, brevi pedunculo, cauli; spica ad maturitatem perducta, squammæ sese elevat, semen excidit. Nodi quo vetustiores & ma-



majores, eo etiam majores sunt spicæ & semen, quod viride humore etiam viscoso repletum; saporis subsalsi. Nec tempus nec ordinem observat hæc planta; semper progerminans; ad multos annos, modo arbores maneant, superstes; quæ ad bis & ter centum annos, ut illa genera arborum *Alou* perdurant, ni ab hisce & aliis *Maravaris* ita opprimantur ut brevi pereant. *Radices* capillares tritæ, & capiti raso impositæ, furorem in febribus ardentibus, imo extra illas, curat, modo in tempore adhibeantur, imo morbum ipsum impediunt. *Nodi* fructus, purgant inveterata & maligna ulcera, aurium dolorem sistunt, non tantum sed & totius capitis; somnum excitant, evaporationes biliosas expellunt. Plantis pedum applicati, febres intermittentes & illarum symptomata tollunt. Tota planta in formam cataplasmatum redacta, & circa lumbos applicata, partum promovet, menses & urinam, semper aliquid virium illarum retinens arborum quibus insidet.





*Pholidota imbricata.*

Pars XII Tab. 25.

Katou. *Theka-marubara* Lat.

3 ~~29940~~ Malab.

*Tholassi*. bramin.





## KATHOU-THEKA-MARAVARA.

## TABULA XXV.



Erinde est ac si diceret *Maravara sylvestris*, *Kathou Theka* enim *sylvestre* dicit; quarta species tertii ordinis; Bramannes vocant illam *Tholassy*. Radix flava, aquea, intus alba, filamento fortiori nigricante suffulta, fractu difficilis, circumflexa & in longum sese extendens. Ex radice *folia* progerminant ut illa *Wellia-Theka-Maravara*, conformata & disposita ut illa *Thalia Maravara*, excepto quod multo angustiora sint, tenuiora, flexibilia; de cætero illis *Wellia-Theka* in omnibus similia. Nodi vel bulbi nova quidem producant folia, nunquam vero flores, fructus vel semina. Rarissime invenitur hæc planta & non nisi in maximis & densissimis sylvis; arbores quibus insidet vetustissimæ sunt, transplantationem non admittit. Medicis Malabariensibus ignota est, ab illis nunquam visa; traditione tantum nota; viderunt tamen, sed cum summa admiratione, cum illam illis exhiberem, mihi à rege *Calicot* sive *Magno Samoryn* transmissam. Radices siccatae in foliculis repositæ serpentes abigunt; in pulverem redactæ & assumptæ, veneno resistunt ex morfu canis rabidi contracto, vulnera & omnem illorum malignitatem sanant; Bulbi per medium dissecti & affati, omnia apostemata resolvunt. Bubulis venenum sunt, furibundi enim evadunt, si de illis comedant.



*Agrostis carinata*

Pars XII. Tab. 26.

*Katou kaidā maravara Lat.*

കട്ടു കോട് മലബ.

*Boin-cadeki.*

बडकेदका bramin

قحاطو قحاطي Arab.





## KATOU-KAYDA-MARAVARA.


## TABULA XXVI.



Uinta species tertii ordinis; Bramannicè  
*Boin-Kakely*; planta est quæ æque supra arbo-  
 res quam in terra progerminat. *Radices* lon-  
 gæ, curvæ, tenues, fibrosæ, filamento albo  
 intus instructæ, humore viscido repletæ, sine  
 notabili odore vel sapore. Ex hisce *Bulbus*  
 provenit, pene cum illo *Kathou-Theka* conveniens, viridi-  
 fuscus, glaber, nitens, in acutum desinens, hinc inde fu-  
 turis striatus, cujus caro viscosa est & viridis, fibris lignosis  
 in longum pertexta, sine odore, saporis subfalsi. *Bulbus*  
 è vertice prolongatur, triaque constituit folia longa, ensifor-  
 mia, tres pedes alta, pollicem lata, viridia, glabra, nitentia,  
 complicata; utraque parte tribus nervis instructa, rigida,  
 erecta, fractu facilia, succo glutinoso repleta. *Costa* media  
 in adversa parte altum eminet. Inter hæcce folia, è medio  
 bulbi, simplex, rotundus, viridis, glaber, nitens, pro-  
 truditur caulis, arundinis instar geniculatus; ex quo *flores*  
 proveniunt; eodem modo, ut illi *Angeli-Maravara* ex-  
 crescentes, forma cum illis *Anantaly-Maravara* convenien-  
 tes, excepto quod petalorum sextum, majorem habeat  
 cucullulam, & albis capillis instructa sit; flores exteriori  
 parte viridi fusci sunt, ad rubrum vergentes, interiori,  
 eximie rubris, albis, viridi admodum claris, purpureisque  
 venis striati & notati; accuratissime maculis flavo albis  
 ornati; circa inferiorem petioli partem, lingula fusca vi-  
 detur, postea in spinam evadens; odoris gratissimi. *Fructus*  
 in omnibus cum illo *Angeli-Maravara* convenit; sic &  
*semen*. Diu superstes est. *Bulbus* bis vel ad summum ter  
 flores producit, tum perit, sed è radicibus de novo pro-  
 germinat, sine ullo, vel hyberni vel æstivi temporis,  
 discrimine. *Succus* radicis si supra arborem *Kansjira* in-  
 veniatur amarus est, alvum laxat, bilem promovet. *Succus*  
 bulbi & foliorum omnem adustionem ex pulvere pyrio,  
 oleo



oleo ferventi, vel igne causatam, cum sanguine canino mixtus, tollit. Pulvis venenum, five externum five internum expellit. Si supra arborem *Fava*, vermes intestinorum enecat, feбри resistit, ventriculum corroborat, flatus dissipat. *Succus* cum carne totius plantæ in formam cataplasmatidis redactus apostemata emollit, & sine dolore, ad maturitatem perducit.





*Basaala-poulou marabara Sat.*

കരിങ്കല്ല . Malab.

Keli.

केळि . bram.

بَعَثَالَا پُولُوعُ Arab.





## BASAALA-POULOU-MARAVARA.

## TABULA XXVII.

**P**roprio nomine *Basaala-Maravara*; cognomen *Poulou* additur, omnes tales significans plantas, quarum semina, granorum instar, in spicis inveniuntur; Bramannicè *Keli*; tam supra arbores petroso in loco positas, quam supra petras ipsas crescens. *Radix* ex multis filamentis & fibris conflatur, alba, intus carneo aqueoque humore repleta, odoris gravis, saporis amari. *Caulis* è radice progerminat, sesquipedem longus, ab omni parte, foliorum pedibus, circumvolutus, quæ ex se invicem proveniunt, ut illa *Thalia-Maravara*; non decussatim disposita, sed giris sese in orbem flectentia, caulem ipsum nunquam detegentia; angusta, spithamam longa, tres digitos lata, superiori & inferiori parte in acutum desinentia, mollia, lenia, viridi clara, oris glabris, costis plicisque sulcatis; fracta multæ fibræ ad longitudinem cubiti ex illis extrahuntur, telæ aranearum instar, humore aqueo instructa. Odoris sylvestris, saporis amari. Inter folia ex radice florum caulis producitur rotundus, viridis, lignosus, glaber, rigidus, in quo flores fasciatim dispositi videntur; eodem modo ut illi *Angeli-Maravara* provenientes; minutissimi sunt; tam eleganter confecti, ut pro merito nec delineari nec describi possint; egregiè miniato rubri, monopetali, petalum ipsum soleæ instar equinæ circumflexum, cujus ora filamenta serica dependentia referunt; in medio orbis è diametro duo sese opponuntur globuli, similitudinem *testudinum* cum omnibus illarum partibus repræsentantes; illorum petioli in altum caulis diriguntur, circa pedem foliolo parvo viridi instructo; gratissimi & amœnissimi odoris *Fructus* ex florum petiolis producuntur, illis *Angeli-Maravara* in totum similes, excepto quod hi in vertice ampliores sint, & circa pedem in acutum desinentes. *Caule* florifero emoriente, è radice novus denuo progerminat, sole supra ipsum



fulgente, semper pene florens, idque singulis quinque mensibus bis. Sylvas, & loca inculta amat hæc planta, atque ideo non sine magno labore & difficillime invenitur. Malabarienses enim nullos medicinales excolunt hortos; si quo indigeant medicamento, illud ex sylvis & agris sibi comparant. Bilem purgat, antifebrilis est; terminos, sive motus epilepticos infantum, morbillos curat, diaphoretica est.





*Katou Lonnam-maravara Sa*





## KATOU-PONNAM-MARAVARA.

## TABULA XXVIII.



Uasi diceret *Maravara sylvestris*, aurea; septima species tertii ordinis; lingua Bramannum *Pon-kely*. Radices tenues, breves, fibrosæ, fuscæ, carnosæ, subflavo, crasso, lacteoque humore repletæ, saporis acris, adstringentis; odoris non injucundi. Ex radice caulis producit, primùm unico constans folio. Folia numero tria ex radice proveniunt, pedibus intra se invicem complicatis. Unum illorum parvum est; reliqua duo majora & longiora, decussatim disposita, in adversa parte costis eminentibus secundum longitudinem dotata; in recta glabra, plana, futuris notata, coriacea, lenia, viridifusca, acuta, rigida, flectuntur, sed non facile franguntur. Inter hæc caulis erumpit floriferus, perinde ac ille *Basaala*; sed striatus est & angulatus, viridis, rigidus, lignosus, intus filamentis & nervis lentissimis instructus. Flores eodem modo ut illi *Basaala* in caule proveniunt, flavo-clari, pentapetali, illorum tria longa, parva, angusta, duo rotunda, circumflexa, apicem constituentia cum procumbente penicillo, illud cavum est & circumflexum. Odoris admodum grati. Fructus ut illi *Basaala* sed pentagoni sunt: Semel tantum floret hæc planta & interit, mensibus Januarii & Februarii; nunquam è radice de novo progerminans. Solem amat & solitudines; descissa & extra solem posita, deflorescit; sub sole reviviscit, quod rarum & in paucis plantis deprehenditur. Succus cum radice trita, adustionem, Carcinomata, Gangrænam curat. Succus foliorum omnem ardorem febrium sistit malignarum; magna efficacia humorem superfluum ex tumefactis manibus, brachiis, pedibus, illic loci pedes *S. Thomæ* dicti, qui sæpius ita intumescunt, ut crassitiem hominis superent, expellit.



*Maretla-mala maravara* Lat.

മരവരം മലബ. Malab.

Bendarli. Bram.

बोदयली

مغز مطه مے Arab.





## MARETTA-MALA-MARAVARA.

## TABULA XXIX.



Rima species quarti ordinis; Bramannes dicunt *Bendarly*; supra arbores initium fumens, seseque illis circumvolvens. *Radices* admodum tenues sunt & subtiles, brevioribus nigrisque fibrillis, corticibus sese insinuantes, illæ lignosæ sunt, continuo iterum alias protrudentes, viridi claræ, hirsutæ, vetustiores nitentes, fusco ruffæ, membrana, quæ deglubi non potest, obtectæ. *Folia* in parvis fuscisque petiolis, plura numero ex ramulis prodeunt, parva, pyriformia, depressa, ab utraque parte glabra, viridia, nitentia, crassa; carnosa; juniora hirsuta, intus viridia & humida, ita ut fracta aquarum guttæ per corticem exsudent; formam margaritarum depressarum referentia. Saporis aquei, salsi, acidi. *Fructus* in ramulis, quibus folia affiguntur, proveniunt; juli sunt oblongo angusti, plano depressi, circa superiorem partem plani & glabri, parva futura in longitudinem striati, viridi nitentes, circa inferiorem reflexis oris, in ipsa cavitate, seriaceis albisque membranulis instructi, quæ postea ruffescit, in pulverem mutatur, & semen exhibet; saporis subsalsi, odoris gravis & fungosi. Semper folia profert & fructus, sine ullo temporis discrimine, semel arbori affixa, nunquam deserit, cum illa vel vivens vel moriens. *Succus* foliorum cum aqua juniorum Nucum Indicæ permixtus, dentes firmat, intumescentiam gingivarum tollit. In morbillis cum fructu adhibetur, citissimè illos producens. Cum planta *Tandela Kotti*, omnes affectus venercos sanat.



Vallivura Koy maravara Lat.

മളളു മര മ കറ മ Malab.

Gagana. bramin.

واللي Arab  
واضحاً فصيحاً





## VALLI-VARA KODY-MARAVARA.

## TABULA XXX.



Secunda species quarti ordinis, quasi diceret *Hedera arborea venenata*. *Valli* enim *hedera*, *Vara* venenum, *Kody* talis planta est, quæ ligationi, funum instar, apta deprehenditur. *Radices* fusco ruffæ sunt, rigidæ, lignæ, saporis subamari. *Rami* cinereo virides, hinc inde nodosi, cortice tenui, interiori parte albi, densi, lenti, ligno duriori, qui funis instar flectitur & ligaturæ inservit. *Folia* ab utraque parte ramulorum sine ordine videntur, spithamam longa, sine caule; lenia, flexibilia, viridiclarâ, in adversa fusciora, costa, in adversa parte eminente, instructa. Circa pedes foliorum *fructus* proveniunt hastiformes, manubrio glabro, viridi instructi, de cætero rotundi, hirsuti, coriacei, pulvere, sive semine ruffo in adversa parte obducti. Diu superstes est hæc planta semper foliis & fructibus ornata. *Folia* cum illis *Avanaco* calce trita in totum antipodagricum medicamentum conficiunt, in formam cataplasmatidis redacta & applicata.






*Arana-panna. Lat.*

അറണച്ചെടവു. Malab.

عَرَبِيَّةٌ يَغْنَا. Arab.





ARANA-PANNA.

## TABULA XXXI.



*C*ules ex radice simplices exsurgunt, rotundi, interius lato sulco profundè striati, rigidi, lignosi, spadiceo rubri. *Folia* in duabus seriebus geminata proveniunt, illorum pedunculi brevissimi; de cætero oblongo angusta, in cuspidem desinentia, in oris angulis rotundis excisa, rigida, viroris vividi ac nitentis, maximè in adversa parte ubi *costa* eminent, in adversa duæ ovorum series extuberant, quæ rotunda, croceo fusca, rubra, oram folii circumcingunt & in recta parte vestigia ac notas imprimunt, aspectui jucunda. In medicina nullum habet usum.





*Lycopodium*

Pars XII Tab. 32

*Valli-panna Lat.*

മുളുപ്പന്നം Malab.

وعلى ينعج Arab.





## VALLI-PANNA.

## TABULA XXXII.

**N** Ascitur in petrosis, frutices scandens. *Caules* tenues & lignosi. *Folia* in petiolis, qui ex brevioribus caulium tuberculis geminati erumpunt, terna proveniunt oblongo-angusta, cuspidata, tenuissima, lenia, viroris in recta parte vividi, in adversa dilutioris. *Costa* media utrinque eminent, ex illa venæ subtilissimæ ac condensæ, oblique in oram ipsam excurrunt, ibique minutissimis crenulis incisæ. Nec floret nec fruget. *Folia* in vaccino lacte trita venenum abdominis præcordia & viscera urens expellunt.






Tjeru-välli-pänna wranapoly. Lat.

മല 3 മറ്റു മല 11 Mal.

چھرو والی پنا Arab.





TS FERU-VALLI-PANNA.

VEL

WARAPOLI.

## TABULA XXXIII.

**P** *Anna* species est, maxime cum illa conveniens, cujus folia apicibus sunt oblongis: sed hæc minor, æquabili ora sine apicibus Ignoti usus.





*Tsjeria Vallipanna. Lat.*

മലബാർ Malab.

والله عينا Arab.





*TSFERU-VALLI-PANNA*. Altera.

TABULA XXXIV.



**E** Tiam *Panna* species, arbores scandens, solo gaudens arenoso. *Caules* tenues, lignosi, rotundi, virides. *Folia* in furculis tenuibus, rotundis, lignosis, qui ex adverso caulium geminati erumpunt; plura congregatim, ac in duabus seriebus proveniunt, oblongo angusta, cuspidata, tenuia, plana, in oris apicibus oblongis, crassiusculis eminentia; viroris in recta parte saturi, in adversa dilutioris. Saporis & odoris expertia. *Costa* media in utraque parte extuberat. *Floribus* & *seminibus* destituitur; nec ullius in medicina usus.





*Pinna-Villi Lat.*

Malab.

يعنق والحري Arab.





PANNA-VALLI.

TABULA XXXV.



**C**onvolvulus nascens in arenosis, undique *radiculis* fibrosis, nigricantibus vel supra terram repens, vel arboribus sese affigens; *caules* tortuosi sunt, rotundioli, viridi fusco ac crasso cortice, filamentis lignosis per-texti. *Folia* in cauliculis proveniunt planis,

plana & glabra, exteriora versus inflexa, viroris in recta parte fusci & valde nitentis, circa oras albicante limbulo, ac cuspidibus acutis, rigidis, anteriora versus reflexis, munita. *Costa* media utrinque altum eminent. Nec floret nec fruet. *Succus* cum oleo *Sergelim*, *Zinzibere* ac *Pipere* longo permixtus, capitique illitus, cephalalgiam biliosam emendat & abigit.





36. *Stoltonia indica*  
*(Hydrocotyle palanensis?)*  
 DC. Prodr. L. 422.

35. *Scirpus squarrosus.*

Pars XII Tab. 36.

*Tsjadaen-tsjira. Lat.*

മരടരമമമമ. Malab.

*Amuli.*

आवली *Bramin.*

چياضحيهين چيراہ *Ar.*



Tab. 38.



*Motta-pullu. Lat.*

മരടരമമ. Malab.

مطلا وولكو. Arab.

Tab. 37.



*Puem-peda. Lat.*

മരടരമമ. Mal.

پوهن چوضا. Arab.



## TSFUDAN-TSFERA.

## TABULA XXXVI.



**P**Lantula nascens in arenosis & sudo solo. *Radix* fibrosa, albicans. *Cauliculi*, qui ex radice plures exfurgunt, simplices, rotundi, aqueo albicantes, tortuosi, geniculis ordine interstincti, internodiis ad apicem contractioribus. *Folia* angustissima, *fœniculi* instar dissecta, in geniculis verticillatim cincta, viroris in recta parte saturi ac levi nitoris, in aduersa dilutioris. *Flores* hinc inde solitarii, ex origine foliorum, in geniculis, pedunculis oblongis, tenuibus, rotundis, ac nonnihil ex viridibus rubescentibus, prodeunt, tetrapetali, surrecti, cuspidati, candidi, exteriora versus reflexi, collulo oblongo, viridi, in medio, in colli orificio, lanugine flava obsiti. *Staminula* in illis duo, apicibus rotundiolis, candidis; *stylus* in medio apparet. *Florum gemmæ* conicæ. *Calyx* ex quatuor constat surrectis, angustis, cuspidatis foliolis. Tota planta odoris est subacris & grati. *Flores* cum *Gingibere* & *Cardamomo* in sero *lactis* potiunculam antidyntericam suppeditant.

## PUEM-PEEDA.

## TABULA XXXVII.



**N**ascitur in petrosis. *Cauliculi*, qui radiculis suis sese affigunt, & plures conjuncti nascuntur, foliolis vestiuntur brevibus, viridibus, densis; super hosce surrecti, tenuissimi, purpureo rubescentes, rigidiusculi emicant *cauliculi*, in vertice cuspidatis, ruffis *gemmaulis* instructi, cum cuspide versus pedem cauliculorum inflexis, quæ siccæ non nisi flavum continent pollinem. Unguis pollicis dextri pedis, hujus plantulæ *succo* illitus, cataractam finistri oculi depellere creditur, & vice versa.



M O T T A P U L L U.

## T A B U L A X X X V I I I.



Umillima plantula nascens in arenosis. *Radices* tenues, albicantes, ac etiam rubescentes. *Caules* tenues, rotundi, virides, gramineis angustis foliolis vestiti. Singulis caulibus, infra corticem, transversæ insident *spicæ*, numero tres vel quatuor, unico foliolo gramineo, brevi succinctæ, oblongæ, rotundæ, numerosis brevibus filamentis, penicilli instar, dotataæ, ex parte spadiceo-fusco-rubræ, ex parte virides, maxime in vertice. Integra planta in aqua *Orizæ* & oleo *Marotti*, & virente *Curcuma*, vel etiam in oleo *Nucis Indicæ* & *Cumino Pipereque* longo decocta, linimentum præstat adversus morbum hepaticum, vitiligine & speciatim Alpho comitatum.

A V E N K A.

## T A B U L A X X X I X.



Plantula ad altitudinem cubiti nascens in arenosis. *Caules* ex radice lignosa & fibrosa, plures exsurgunt simplices, tenues, lignosi, duri, rigidi, rotundioli, spadiceo nigricantes, glabri & nitentes. *Folia* in superiori parte caulium in duabus proveniunt seriebus, quorum petioli tenuissimi, surrecti, spadiceo nigricantes, nitentes; lata sunt, anterius ora convexa, cauli obversa, tenuia, lenia, mollia, venis striata. Nullius vel saporis vel odoris. Nec floret nec fruet, neque ullius in medicina est usus.



*Auenka. Lat.*

സുപുലി . Malab.

*Supuli*

सुपुली . bramin.

أونفأ . Arab.





*BELLAN-PATSFA.*

## TABULA XL.



Rutex est dilute viridis, hirta mollitie vestitus.  
*Cortex* subacutis, capillaribus & virididilutis  
 foliolis, ramusculis adhærentibus, undiquaque  
 cinctus; arenoso humidoque gaudet solo.






*Tsjama-pullu*. Lat.

കുരുമുള . Malab.

Tana.

रण . Sramin.

طهونج . Arab.



111



TSFAMA-PULLU.

## TABULA XLI.

**P**Lanta nascens in arenosis. *Radix* fibrosa, albicans. *Caules* rotundi, glabri, virides, geniculati, foliis gramineis vestiti. *Spicæ* vertici caulium in petiolis viridibus insident, virides; complanatæ, ex pluribus, minutis foliolis imbricatim conformatæ; vetustiores fusce purpureæ. *Semina* in illis continentur arenacea. Ignoti usus.





(prosci.)

Pars XII Tab 42.

*Wara-pullu, Lat.*

വറാപുലു Malab.

*Pena.*

पेन ब्रामिन.

وَعْرَمٌ يُّوَالْحَوْ Arab.





WARAPULLU.

## TABULA XLII.



Uncus est in irriguo nascens solo. *Caules* glabri, triangulati, angulis parum obtusis, intus albicante, fistulosa medulla instructi. *Radix* albicans est, fibrosa, pedibus foliorum vestita, exterius ex rubro rufescens, carne aquea cum corculo albo. *Folia* oblongo-angusta, cuspidata, venis in longum striata. *Spicæ*, in vertice caulium, foliis oblongis succinctæ prodeunt, in duabus seriebus distinctæ, petiolis transversim insidentes, oblongæ, planæ, compressæ, angustæ, viridi flavescentes. Intra singularum spicarum folia, imbricatim se mutuo obtegentia, *semina* continentur. *Succus* cum *Nuce Moscata* permixtus ventris dolores, Malabaricè *Rama Cua* & *Sura* dictos, mirum in modum sistit & emollit.





*Scirpus corymbosus.* 2.

Pars XII. Tab. 43.


*Kudira-pullu* Lat.

കുടിരപ്പുല്ല് Malab.

Tana.

ନା Bramin.

فوطيرا يولا Arab.





KUDIRA-PULLU.

## TABULA XLIII.



Lanta est quolibet gaudens solo. *Radix* convolvuli instar supra terram repit, fibris albicantibus, lignosis illi se affigens. *Caules* lignosi sunt, tortuosi, viridi flavescentes, nitentes, gemmulis quasi interstincti, in geniculis asperi, maxime cum versus inferiora stringuntur; superna parte, qua surrecti, virides & *foliis* vestiti; illa oblongo angusta sunt, in cuspidem desinentia, graminiformia, in oris, manibus adhærentia. In vertice caulium *spicæ*, filamentis tenuibus, rubescentibus, quaternæ simul proveniunt, cuspidatæ, rubescentes, inferius in exteriori parte a caule averſæ, *plumulas* duas emittentes argenteas, candicantes, & cum illis *apices* grandiusculos albicantes, qui in tenuissimis stamunculis penduli nutant. Extra usum in Medicina.






*Téreta-pullu. Lat.*

ര ര റ ട് ഞ ല്ല Malab.

طهره طی بولجا Arab.





## TERETA-POLLU.

## TABULA XLIV.

**N** Ascirur in arenosis, repens & terræ se affigens. *Caules* geniculati, rotundi, virides, glabri, *foliis* oblongis, angustis, cuspidatis, viridibus in geniculis vestiti. In vertice caulium spicati & geminati prodeunt petioli; *spicæ* in duabus seriebus sunt confitæ, rotundæ, parum cuspidatæ, duræ, albicantes. Nullius in medicina usus.





*Festuca indica*

Pars XII Tab. 45.

*Tsjama pullu* Lat.

တီၤဆဲၤ Mal.

بنیامان پوتلخو Arab.





TSFA MAPULLU.

## TABULA XLV.

**P**Lanta arenoso gaudens solo. *Caules* rotundi, oblongi, tenues, intus tubulo pervii, glabri, virides, geniculati, in geniculis extuberantes, pedibus foliorum oblongis, angustis, gramineis vestiti, quæ inferiori pede articulos instar involucris includunt, rigida, proximè ad caulem pilis albicantibus in interiori latere barbata. In vertice caulium petioli breves, spicati prodeunt, foliosis involucris involuti. *Spicæ* ipsæ parvæ sunt, oblongæ, cuspidatæ, viridi dilutæ, quatuor constantes foliolis cuspidatis, in singulis *semen* includitur unicum. In vaccino *lacte* lævigata abscessus phlegmonodes desiccat: cum *Assa Fætida* & *Zingibere* in potiunculam præparata tormina ventris mitigat.





*Kirpa. Lat.*

കുവഴി *Malab.*

*Bula*

बाल *Bramin.*

فرفرغ *Arab.*





K E R P A.

## T A B U L A X L V I.

**B**Ramannicè *Bala*, ad altitudinem duodecim pedum nascens in aquosis. *Radix* geniculata, primò rubescens, vetustior albescens, fibris capillatis, quas è geniculis emittit, se affigens. *Caules* rotundi, cavi, primùm viridescentes, adultiores & sicci albicantes, ligno duro, venis striato, calami instar, circa radicem caules emittentes laterales. *Folia* ex geniculis prodeunt, eosque convoluta includunt, ensiformia, stricta, crassiuscula, ima parte, qua à caule abcedunt, geniculo viridi diluto, albicantibus pilis vestito, interstincta, in interiori latere concava & albicante tunica obducta; in superiori caulium parte plumei conspiciuntur *glomi*, ex plurimis tenuissimis filamentis ceu petiolis compositi, qui argenteis, longiusculis ac glomulatis dispositis pilis sunt vestiti. *Semina* hisce filamentis insident condensa, parva, ruffo-rubra. *Cadi Pullu* similis est hæc planta, sed odoris expers, novis, oblongis, cuspidatis, albicantibus ac subflavescentibus oculis, qui ex radicis geniculis quasi extruduntur, se propagans. Ex *foliis* Apozema fit emmenagogum. Abscessibus imposita, illos ad maturitatem perducunt & aperiunt. *Radix oleo* incocta scabiem ac pruritum tollit.



*Beli Caraga. Lat.*


മലിക്കരക. Malab.

*Durba.*

ദുവാ

Bramin.

وولبي نخا وفتي Arc.






BELICARAGA.

## TABULA XLVII.

**G**Ramen est, caulibus tenuibus, rotundis, glabris, viridibus, qui foliis vestiuntur oblongis & angustis. Plurimis ceremoniis in religione Bra-  
 mannum celebratur hæc planta. Rheumata  
 capitis & oculorum minuit linimentum ex hac planta,  
 affuso *Nucis Indicæ* oleo & *Sandalo*, applicatum: Gingi-  
 varum dolores lenit, si nempe cum *Orizæ* decocto te-  
 ratur.






*Kaden-pullu*, Lat.

കടൻപുലു Malab.

كادون يولا Arab.





K A D E N - P U L L U .

## T A B U L A X L V I I I .




**P**Lanta quolibet gaudens solo. *Radix* nodosa, fibris plurimis capillatis, rubro nigricantibus, duris ac lignosis vestita. *Caules* omnes ex radice exsurgunt, virides, tenues, triangulati, oris acutis, intus parum lignosi, *foliis* oblongis, gramineis vestiti, illa in interiori parte profundo striantur sulco, in cujus tractu exterius *costula* extuberat. *Flores* in summitate caulium spicati proveniunt in petiolis tenuibus, planis, viridibus, qui supra foliorum exortum ex caule erumpunt, ramulis petioli transversis infidentes; *spicæ* sunt, quarum folia angusta & cuspidata. Illis deciduis in unoquoque calyce aperto unicum conspicitur semen rotundiolum ac trilaterale; primò viridi dilutum, deinde candidum & nitens; ad maturitatem ubi pervenerit albocinereum ad persicum vergens, forma gemmulam referens. Ex *radice* antinephriticum conficitur apozema.



Tagadi. Lat.

കോക്കു Malab.

طحاغياضي Arab.





## TAGADI.

## TABULA XLIX.



**O**Mnem amat fundum. *Caules* tenues, rotundi viridi albicantes, durioli, geniculati, viridibus foliorum involucris, vestiti. *Folia* arundinacea, oblongoangusta, pilis longis, albicantibus obsita, venis in longum striata, *costula*, in adversa parte eminente, instructa, interius sulco striata, viroris communis. *Flores* in summitate caulium proveniunt; *spicae* sunt oblongae, cuspidatae, mutuo se ipsas imbricatim obtegentes, viridialbicantes, nitentes, rigidae, circa cuspidem viridi fuscae; quando se aperiunt, in medio lateris exterioris, ubi nonnihil convexae, in longum hiant; inferius ex hiatu plumulam ceu *globulum* exserunt conicum, candidum; in cuius medio *stylus* oblongus, tenuis, candidus, pilis condensis in orbem circumdatus, conspicitur, & cum illo nonnulli apices oblongi albicantes. Nullos fert fructus & ignoti usus est.



Potta-pullu. Lat.

ഓട്ടുക്കുട്ടി Malab.

Lauou.

तालवो Bramin.

قطيع Arab.





P O T A - P U L L U .

## T A B U L A L.



**I**Uncus est aquaticus. *Radix* transversim prorepat geniculata, in geniculis late extuberans, alba, fibrosa, intus fungosa & aquea, exinde rufescens. *Caules*, qui ex radice exsurgunt triangulati ac glabri, uno latere nonnihil excavato, intus medulla candida, aquea, fungosa instructi, ad radicem foliosis involucris succincti, viroris communis, odorem Piperis spirantes. *Spicæ* in petiolis viridifuscis, planis, vertici caulium insident & plures congregatæ proveniunt, ad exortum petiolorum tribus, oblongis, graminiformibus foliis succinctæ, ruffæ. Inter scutellata foliola, candidissima *filamenta*, quorum *staminula* viridia & oblonga, emittentes. Cum hocce junco ædes obteguntur, incolas per biennium contra æris æstus, ventorumque injurias, fartos & integros servans. In medicina extra usum est.



*Chloris barbata* Sw.  
Fr. Poir. 353

Pars XII. Tab. 5.

*Konda-pullu*


കണ്ടു പുല്ലു Malab.

*Tana*.

तण

*bramin.*

قما أرضها يولا Arab.



↙ ↘



K O U D A - P U L L U .

## TABULA LI.



Lanta quodlibet amans solum. *Radix* albicans, fibrosa. *Caules* rotundi, glabri, virides, geniculati, in geniculis cymis inflexi, *foliis* gramineis vestiti. *Spicae* petiolis viridibus, surrectis, qui ex vertice caulium plures erumpunt, in duabus seriebus confertæ insident, fuscerubescentes & nitentes, ex vertice *pilis* oblongis, surrectis, rubescentibus barbatae. Vires ignorantur.





*Mottenga. Lat.*

വരകാ ॐ Mal.

موتنجا Arab.

मुस्ता bram.





## MOTTENGA.

## TABULA LII.



Uæ illius sunt species, *Mottenga* & *Pee-Mottenga*; prior Bramannibus dicitur *Musta*, herba submissa nascens in arenosis. *Radix* glandulosa, fusca, capillaceas & fuscas emittit fibras; ex quibus hinc inde novæ glandulosæ radices enascuntur, ex illis iterum fibræ & sic porro, aromatici & gratissimi odoris, maxime ubi siccæ, saporis subacris. *Caules* qui cum *foliis* ex radicibus proveniunt *triangulati* sunt, tenues, viridifusci, superius nodulo distincti, in nodulo *foliis* vestiti; illa graminea sunt, angusta, viridifusca, interiori parte striata, saporis subastringentis, sine odore. *Flores* in summitate caulium proveniunt, quorum petioli breves, & plures congregatim exeunt; *spicæ* sunt parvæ, tenues, planæ, ex rufforubescentes; *filamenta* tenuia, brevia, flava ceu ruffa è medio ejicientes. Decoctum hujus plantæ sitim restringit. *Radices* Lusitanicè *Coquinha* dictæ in decocto usurpatæ, conducunt in febribus calidis & Diabete; *Oleum* ex radicibus extractum hepatis inservit, sitim restringit, ardorem febrium sistit, diabetem curat, costis illo inunctis, etiam crines auget. *Oleum* per destillationem ex radicibus extractum, crassum est & turbidum, cum tempore multas fæces ad fundum demittens, pinguis & unctuosæ consistentiæ, coloris viridi-flavo-fusci, odoris grati, saporis pinguis & subacris, in destillatione cum aqua simul adscendens eique innatans.



*Pee Mottenga. Lat.*

വെളുത്തു കടലിട . Malab.

سجق مؤطهفيا . Arab.

मुस्ता . bramin .





## P E E - M O T T E N G A .

## T A B U L A L I I I .



Secunda species, lingua Bramannum *Badera-Musta*, quasi diceret *Mottenga sylvestris*, cum priori specie in omnibus pene convenit; in eo tantum differens quod radices glandulosæ non sint, sed fibrosæ, ruffo nigricantes, tenues, in diversas conglomeratas fascias partitæ; ejusdem odoris, sed fortioris; propagatur per fasciarum avulsionem. Cum *oleo* decocta pruritus sedat facta corporis inunctione. Reliquæ virtutes cum illis primæ speciei conveniunt.





Mulien-pullu. Lat.

செவ்வெயிலு

Mal

تولاهن يولاجه

Arab





M U L E N . P U L L U .

## TABULA LIV.

**G**Ramen est *caulibus* viridifuscis, planis foliis vestitis. *Spicæ* summitati caulium insident, in uno quasi capitulo congregatæ, ac foliis succinctæ, virides, ex plurimis constantes imbricatis foliolis. Julculum ex hoc gramine præscriptum æstum corporis temperat.





*Ira. Sat.*

ബ. ൩ Malab.

سبب Arab.

ब्रम Bramin.





## I R A.

## T A B U L A L V.




Uæ hujus sunt species ejusdem nominis. Hæc Bramannicè dicitur *Rana Derpu*, planta est altitudinis duorum cubitorum. *Radix* nodosa est, quam plurimas confertas & arctè junctas subtus ejiciens fibras. E radice cum foliis gramineis *caules* exeunt rotundioli, triangulares, in summitate nodulo distincti, ex illo graminea *folia* sex, septem, plus minus in orbem transversim emittentes, inferiori parte à foliis arctè comprehensi, ac in plures fascias compositi: ipsa folia oblonga sunt, versus anteriora magis contracta, in latere superiori se nonnihil in medio claudentia, in adversa parte nervo eminente striata, oris acutis munita, coloris in utraque parte hyali & surdi. Ex caulis summitate à nodo supra folia graminea tres, quatuorve emicant petioli rigidi; illis *spicæ* densæ ac confertæ transversim, rectè, obliquè, omni ex parte insident, oblongo angustæ, compressæ, cuspidatæ, plano rotundiolæ, squamosæ, primùm ex albo viridi dilutæ, exinde rufescentes. *Semina* in illis minuta, angulata, spadiceofusca. *Folia* in decoctum præparata dolores ventris sedant, menstrua provocant.



*Tra eu Basuri. Lat.*

ἄ. ἄ. Malab.  
ربضياء Arab.  
दमक Bramin.





I R A ceu B A L A R I.

## TABULA LVI.



Secunda species, quæ à Bramannibus *Derpu* vocatur, cum prima in multis conveniens. Foliorum ora maximè acuta sunt & incidentia. *Caules* triangulati, sed acutioribus angulis, qui ex suo nodo petiolo spicatos non solum emittunt, sed & cum illis plures cauliculos, etiam ex suis nodulis spicatos proferentes petiolos, qui longiores sunt ut illi primæ speciei; *spicæ* in iis raræ & diffitæ, in duabus seriebus transversim sitæ, planiores, vel magis compressæ, ex flavoruffescentes. Vires conveniunt.






*Kodi-pullu*. Lat.

കുടിപുലു Malab.  
*Dirbu*.

दरभु bram.

قفا صغرى بولا Arab.





K O D I - P U L L U .

## TABULA LVII.

**B**Ramannes dicunt *Darpu*; nascitur in arenosis. *Radix* nodosa, duriola, fibris capillatis, rigidis vestita, albicans, oculis se propagans. *Caules* rotundi, geniculati, in superioribus internodiis ab una parte magis plani, & late sulcati, glabri, venis subtilissimis striati, primò viridi albicantes, vetustiores ex albicante flavescentes, nitentes, carne albicante, fungosa, sicca stipati, foliis oblongis, quæ geniculis sunt inserta, ac inter se mutuo convoluta, vestiti. *Folia* oblonga sunt & striata, quæ se cum cauliculis relaxant, & interiora versus claudunt; in adversa parte *costula* eminente & glabra obsita, interius in illius tractu lato sulco excavata, superficie glabra; oris acutis & incidentibus, viroris in recta parte communis, in adversa hyali, odoris aromatici. *Flores* spicatim ac condensi proveniunt, quorum petioli tenues, pandi, geniculati, ex geniculis novos etiam projicientes furculos floriferos, parti cavæ internodiorum accumbentes. *Spicæ* ipsæ primò virides sunt, oblongoangustæ, cuspidatæ in cuspidibus rigidiusculæ & nonnihil pungentes, ad pedunculos candidis capillis, cum quibus postea rufescunt, vestitæ, ex vertice unicum, tenuem, longiusculum eicientes capillum; sed apertæ tenuissima ac albicantia *filamenta*; quorum *apices* oblongi, penduli, nutantes, subflavi, vetustiores crocei, lyra striati, demissi; præterea spica in uno pedunculo plures imbricatim sunt junctæ, folioso involucro primum obtectæ, sed tandem denudatæ; In singulis unicum continetur *semen* oblongoangustum, ex una parte cuspidatum, quod siccum rufescit. *Radix* in potiunculam præparata salivationem in febribus sistit.



*Beera-kaidā*. Lat.

വെറകൈദാ. Mal.

بيرة قايضا. Arab.





## B E E R A - K U I D A.

## T A B U L A L V I I I.

**N** Ascitur in arenosis. *Radix* fibrosa & ruffa. *Folia* ex radice exsurgunt, inferiori parte, circa radicem, se mutuo amplectentia, oblongoangusta, venis striata; *costa* in adversa parte eminent unica, in recta duæ. *Caules* tenues sunt, triangulati, interius à foliorum pedibus investiti, superiori parte geniculati, in geniculis foliis oblongis obsiti. *Flores* in capitulis proveniunt spicatis, quæ, cum suis petiolis, in cacumine caulium ex geniculis erumpunt; *Spicæ* sunt cuspidatæ, virides; in singulis unicum continetur *semen* rotundiolum, angulatum, spadicei coloris. Extra usum in Medicina.





*Nela pāna kelangu. Lat.*

നെലപ്പനക്കുളി. Malal.

نيلبان كحلونج. Arab.

मसळकोब. Bramin.





## MELLA-PANAKELANGU.

## TABULVLIX.



Renosa amat. *Radix* fusca, subtus fibras crassiunculas albicantes emittens & obfuscatas, quæ vetustiores in annulos se corrugant. Caro albicans est & densa, non lignosa, nullius saporis, odoris haut injucundi, sed minus vegeti. *Folia* quæ duo, tria, plurave è radice erumpunt, arundinacea sunt, venis in longum striata, tenuia, in medio longo eminente nervo obducta, reflexa, cum suo cuspide terram perforantia, ac novam radicem constituentia. Utrum floreat dubitatur. Decocta cum *Oleo Nucis Indicæ* & supino cervice epota, capitis dolores sedat, vertiginosos affectus & oculorum caligines abigit, visum acuit. Cum aqua decocta & epota antifebrile præstat medicamentum præsertim in colera; in pulverem redacta & ventri imposita stranguriæ medetur. *Radix* trita & assumpta idem efficit; in *lacte* dulci assumpta ardorem renum & ossium restringit.





Kalu-Tjölam Lat.

കുറ്റംപട്ടി Malab.

Luzalo.

കുന്മാळे Bramin.

قحاطو شالام Arab.





KATOV-STFOLAM.

## TABVLV LX.



Renoso gaudet solo. *Caules* rotundi, in *geniculis* foliis viridibus, oblongis, angustis, rigidis, anterieus cuspidatis, vestiti. Ex *geniculis* petioli prodeunt tenues, illi in calycibus foliosis *gemmas* concipiunt rotundas, nigricantes, vitreas. *Fructus* cum succo *Areka* levigatus, aphtas infantum sanat, si nempe lingua cum illo illinatur.





*Kuren-pullu. Sat.*  
 കുറമ്പുഴ . malab.  
*Tana*  
 തണ . bramin.  
 قحورين . Ar.  
 پولا






## KUREN-PULLU.

## TABULA LXI.



Uodlibet amat solum. *Caules* rotundi, oblongi, pilis capillati, *foliis* oblongis, angustis, cuspidatis, viridibus in geniculis vestiti. *Spicæ* conicæ sunt, virides, deinde rufescentes; in singulis unum continetur *semen* rotundum sed aliquo modo oblongum.

Extra usum in Medicina.






*Tsjeria kuren-pullu. Lat.*

മലർ കറൻപുല്ലു Mal.

Tana.

ब्रह्म ब्रह्मिन.  
چیریا فخره بولا Ar.





TSFERIA-KUREN-PULLU.

## TABULA LXII.

**N**Ascitur in petrosis. *Caulis* rotundi, glabri, viridi diluti, geniculati, in geniculis qui extuberant ac rubescunt, cymis inflexi, & folioso involucro, quod pedem folii constituit, investiti. *Folia* oblongo-angusta in cuspidem desinunt, in oris pilis hirsutis obsita, manibus adhærentia, tenuia, lenia, venis subtilissimis in longum striata. In superiori caulium parte *pluma* geminata conspicitur, cujus *stamina*, rubropurpurea & tenuia, quæ ex spicis nigricantibus, oblongis, strictis, transversis prodeunt, atque ex illarum vertice emicant. *Spicæ* florentes flocculos emittunt albicantes. Ejus usus in Medicina ignotus.





*Kol-pullu. Lat.*  
കളമുള. Malab.  
قحان يولحور. Arab.





K O L - P U L L U

## TABULA LXIII.



Uncus in arenoso & irriguo nascens solo. *Radix* ruffa, fibrosa. *Caules* triangulati, lateribus planis, glabri, virides, nonnihil nitentes, inferius *foliis* graminiformibus vestiti, medulla fungosa, albicante instructi. In illorum vertice oblongorotunda prodeunt spicæ capitula, foliis gramineis, ad exortum petiolorum succincta. *Spicæ* cuspidatæ sunt, virides & obliquè surrectæ. De viribus nihil constat.





Tjeru-tjures Sat.

മലബാർ Malab.

Vite.

वेति. brahin.

جفرو چورول Arab.





*Calamus rotang  
L. 24. 403.*

## T A B U L A L X I V.



Rutex nascens in petrosis, alio nomine *Rottang*. Rami arundinacei, cortice crassio-  
lo, rigido, viridi, spiculis spinosis, rigidis,  
oblongis, condensis, nigro rufescentibus  
obducti. Folia illis *Ily* similia sunt, in in-  
teriori parte, circa venarum tractum, pilis

hirsutis obsita. Flores simul cum fructibus, quorum  
vertici insident, proveniunt racemati, parvi, rubro fusci,  
tripetali, quorum petala rigida, versus fructum annulatim  
inflexa. Fructus globosi, parum oblongi, superficie ad-  
modum æquali & glabra; illorum cortex ex albo flavescit,  
rigidiusculus est, interius albicans, exterius cancellis qua-  
dratis ad normam linearum paralellarum nitidissime de-  
pictus; ex hac pictura fructus aspectu jucundi sunt. Pulpa  
viridis, succulenta, exigua, saporis acidi; in medio *ossi-  
culum* continetur, in totum petrosum, una parte planum,  
in meditullio umbilico lacunoso excavatum. In eduliis  
sunt. Ex hac arundine, quæ in filamenta finditur, can-  
cellatim contexta, indigenæ sedes conficiunt. Succus  
*radicis* super craticulam torrefactæ, capiti illinitur adver-  
sus Cephalæam.



*Natu-tsjures* Lat.

കാട്ടുകുമ്പളി Malab.

*Rana-vete*

गान्धर्व ब्रह्मिन्.

قحاطو جیورسل Arab.





K A T U - T S F U R E L:

## TABULA LXV.

*Calbaricus notant, videri  
Pec. Syn. 1. 383*

priori tantum differt, quod foliis sit majoribus ac etiam fructibus, qui maturi nigricant & comeduntur. *Nucleus* fructus siccat & pulverifatus genuum ulcera sanat.





*Perim-tsjuer. Lat.*

മലബ. ചുവര Malab.

*Todi-vele*

वडिबेति Bramin.

پھروم چورہل Arab.





## PERIM-TS FUREL.

## TABULA LXVI.



**L**ertia species, cæteris major. Lusitani illam vocant *Rotas Grandes*; quæ ubi se arboribus affigit, ad altitudinem sex, septem, imo octo hominum exsurgit. *Arundines* rotundæ, duræ, virides, geniculatæ, in geniculis spinis densis, oblongis, aculeatis, duris, viridi flavescentibus, verticillatim cinctæ. *Folia* quæ geniculis supra spinas insident longa sunt, in cuspidem oblongum stricta, in oris spinis aculeata, in longitudine plicis striata, coloris viridi obscuri. *Flores & fructus* prioribus pene similes sunt, sed hi sunt majores, etiam in eduliis adhibentur. Medici virtutes ignorant.





*Schoenus paniculatus*

Pars XII. Tab. 67.

Tsjolap-pullu. Lat.

മലഗുളി : Malab.

حبالا پو الحو : Arab.





T S F O L A P - P U L L U.

## T A B U L A L X V I I.



Uncus qui in aquosis nascitur locis. *Radix* fibrosa, albicans. *Caules* triangulati, angulis acutis ac hærentibus; intus medulla albicante, fungosa, aquea; foliis gramineis, quæ in oris & costa media manui adhærent, vestiti. *Spicæ*, quæ à foliorum pedibus,

tanquam thecifirmi involucro substringuntur, parvæ sunt, oblongæ, angustæ, fusce rubescentes & nitentes; ubi florent singulæ tria transversum ejiciunt filamenta pilosa & candida. In unoquoque unicum continetur *semen*, instar gemmæ nigerrimæ ac nitentis cyatho oblongo, corallino insidens, ex quo cum *capitulo* emicat. Tota planta cum axunguia *Aprugna* in linimentum redacta contractos refocillat nervos. *Folia* cum aqua *Oryzæ* trita ossium dolorem leniunt. *Succus* in variolis, si nempe febris adsit, adhibetur.





Tsjeru Cotsjiletta-pullu

വെരിയ കെ, കുറേക്കു കുറ്റ

جھریا قاجیلتی پو لکھ





Eleusine  
Cynorus indicus  
Pars XII. Tab. 69.

Cavara-pullu Sat.

இலமசுடி Malab.

القوة عرق يولجا





## TSFERU-KOTSFILETTI-PULLU.

## TABULA LXVIII.



Lanta est aquatica. *Radix* rotunda, oblonga, candida, viridibus, oblongis, densis vestita fibris, ex cujus summitate, inter *folia* graminea, exsurgunt *Caules* simplices, tenues, rotundi, virides, capitulo plano, rotundo, ruffo nodulati, inferius folioso, theciformi involucro, superius in orificio cuspidibus hiante, ac venis in longum striato, involuti. Oleo *Nucis Indicæ* incocta scabiem & impetiginem sanat.





KAVARAPULLU.

*Cynosurus indicus*  
L. 106

## TABULA LXIX.



Ramen est *caule* oblongo, plano, gracili, foliis oblongis vestito, in summitate quatuor spicatis, transversis, decussatim (in formam crucis) dispositis, alato; quibus *spicæ*, in duabus seriebus, conferto ordine insident, illæ virides sunt, deinde rufescentes, complanatæ, ex pluribus constantes petalis inter se imbricatis, intra quæ *semina* continentur. De viribus nihil constat.





Cafri - Conda. Lat.

കളികരകുടം Malab.

Zen-Camani.

शरवमणि Bramin

تخا بجزیره قماضه Arab.





## C A T R I - C O N D A.


## T A B U L A L X X.



*Aules* hujus plantæ virides sunt, in internodiis geniculati, ab una parte plani. *Folia* quæ articulos pedibus suis investiunt, oblongo angusta, cuspidata, graminiformia, in recta parte ac in oris quam maxime adhærentia. *Fructus* caulibus insident rotundi, parum conici, ex quorum vertice petioli spicati, ex singulis unus emittuntur, ex basi emergentes cum duobus staminulis albicantibus, capitulis, veluti cornubus viridibus, ex vertice emicantibus, primo flavi, tum viridescentes & nitentes, postea albescentes, ex inde ex albo rubescentes & nigricantes, tandem ex albo cærulei, quorum bina filamenta oblonga sunt, tenuia, crispata, purpureorubro fusca. *Spicæ* oblongæ sunt & rotundæ, obtusi cuspidis, virides, se mutuo imbricatim obtegentes, bipetalæ; apertæ ac florentes, tenuissima candidaque eji-  
ciunt filamenta, in vertice bifida, quorum apices, oblongi, grandiusculi, flavi, postea rufescentes, nutantes. Notandum quod ubi fructus adhucdum sint virides spicæ sese aperiant & florent; si flavi, petioli spicati nondum se exserant; si ex viridi albescant petiolis spicatis spolientur. *Fructus*, corallæ instar, in armillas nectuntur.



Tsjelli. Lat.  
മലബ. Malab.  
Tanapocala.  
तणपोकळ. Bramin.  
جيجلی. Arab.





T S F E L L.

## TABULA LXXI.

**B** Ramannicè *Tanapocala*; planta est ex genere juncorum, nascens in aquosis & arenosis. *Radix* curta, numerosis fibris capillatis, nigricantibus vestita. *Caules* qui simplices ex radice exsurgunt, juncei, larga cavitate, virides, geniculatis annulis interstincti, sed non in una parte, foliosis involucris vestiti, singuli fascia spicata, ruffa, ad geniculum inferiorem verticillatim maxima parte succincti. *Spicæ*, quæ ex foliis se invicem imbricatim contegentibus, viridibus, ac postea rufescentibus sunt compositæ, tria, cum florent, extra singula foliola, ejiciunt *filamenta* pendula, oblongis, nutantibus, flavescens dotata *apicibus*. *Semina* parva, triangularia, sicca, nigricantia nitentia, inter edulia sunt; ex illorum vertice unicum prorumpit filamentum; ubi maturi sunt spicæ filamentis suis privantur. Ex *Radice* cum *Mirabolanis* syrupus conficitur catharticus.

*Scirpus artrioides*  
L. sp. 70



Ramacciam Lat

ब्रह्म. Mal.

غيا ما حيان

बानके. bamin.





## TABULA LXXII.

**S**Ecunda species *Iribéli*, alba dicta; lingua Bramannum *Bocalo*, planta est quæ per totam invenitur Malabariam, in arenosis nempe & petrosis locis. *Radix* tortuosa, oculis se propagans, fibris implexis, densis, tenuibus, capillofis, quarum filamenta intus lignosa, coloris albi, nonnihil ad flavum vergentis, saporis amari, odoris, fragrantis sed minus vegeti. Illa quæ in Tutocorim invenitur; non est radicibus albis, sed ruffis, atque huic quam maximè præfertur, utpote vegetioris odoris. *Folia* ex radice prodeunt, oblongo angusta, gladiolorum instar, crassiola, plana, glabra, duriola, ab una parte in summitate se cludentia, venis subtilibus in longum striata, coloris viridis, cuspidibus minutis, incidentibus in oris minuta, interiori parte, versus quam clauduntur, viridi albicantia, ad radices, ubi fasciatim coadunata, albicantia, nullius saporis. Vetustior facta planta, ex radice unicus exsurgit *Caulis* planus, solidus, nodulatus, in nodulis pluribus foliis circumvestitus, in cuius summitate proveniunt *Flores* spicati, inter plumata quasi filamenta, quæ caulem in summitate investiunt. Propagatur hæc planta radicum avulsione in terra arenosa, albicante, dissoluta. *Radix* in mercimoniis est, & magno studio ab incolis excolitur, minoris tamen pretii quam illa *Iribelli Nigræ*. Pro variis indispositionibus in infusionibus & decoctis adhibetur; Radicis autem decoctum, pro lotionem corporis usurpatus, quam maxime confert ad corroborandos artus, vitales etiam ac animales spiritus quam maxime fovens; hypochondriacis prodest ut & melancholicis, capitis dolors sedat. Apud indigenas principem obtinet locum pro febribus, ventris doloribus, capitis affectionibus, intestinorum torminibus & colicis passionibus, in decocto simpliciter vel cum aliis medicamentis propinata.



Nain Cannasat.

നാമി കന്നട മാ

Piscobo.

पिसकोब ब्रामिन.

پسکوب





N A I N - C A N N A.

## T A B U L A L X X I I I.

**H**X genere *Cannarum* est, quas *Cannas sylvestres* vocant, nascens in arenosis. *Caules*, qui pedibus foliorum theciformiter convolutis investiuntur, rotundi sunt, viridi diluti, glabri, intus carne fungosa, alba, inter filamenta lignosa, striati, in medio fistulosa cavitate pervii, valde leves. *Folia* oblonga sunt, in cuspidem stricta, acutis oris, inflexura, qua à caulibus recedunt, interius geniculata, circa geniculum candida lanugine obducta. *Costa* media in adversa parte eminent, venis subtilibus in longum striata, intus tubulis pervia. In caulium vertice petioli prodeunt spicati, in interstinctis caulium intervallis, ubi rubescunt, idque plures congregati, in orbem dispositi ac oblique surrecti, ex nodulis rubescentibus, minores emittentes ramulos spicatos, plumæ instar diffusi, virididiluti, sed teneri rubescentes. *Spicæ* ipsæ ex spadiceo nigricant & nitent, in penicillis filamentorum argenteorum, per quæ transparent, consistæ. *Succus* per se sumptus, vel cum *Allio* tritus, palmisque cum manuum, tum pedum inunctus, spasmo medetur; cum *Zinzibere* lævigatus temporibusque illitus, maniacis hypochondriacisque confert. *Flores* cum *canino stercore* in lotura *Oryzæ* triti, idem præstant, temporibus applicati.



Tiri-panna Lat.

കിരിപ്പന്നം Malab.

طيرين يحنها Arab.





T I R I - P A N N A .

## TABULA LXXIV.

**N**ascitur in petrosis. *Radix* fibrosa, lignosa. *Folia* sola ex radice exfurgunt, pedibus rigidis ac fuscis, oblongo angusta, in cuspidem stricta, crassiola, carnososa, plana, viroris fusci, interius in medio striata, in oris rufforubra, pulverulenta lanugine obducta. *Floribus & fructibus* destituitur. *Succo* ex foliis extracto aurium leniuntur dolores.





*Spinifex squarrosus* L.

Pars XII. Tab 75.

*Ty multu*. Lat.

ἄβραξ. Mal.

جملی نولف. Arab.





I L Y - M U L L U.

## T A B U L A L X X V.



Renosa amat. *Radices* albicantes, fibrosæ.

*Caules* rotundi, duri, rigidi, geniculati, cymis tortuose inflexi, novellos ex geniculis ejicientes caules, virides, cæruleo albicante rore ad-

sperfi. *Folia* pedibus caules circa geniculos amplectuntur, oblongo angusta, rigida, crassiola, interiori lato sinu sulcata, in cuspidem valde rigidum & aculeatum stricta, viridia, atque etiam cæruleo albicante rore suffusa, ubi siccescunt dilute rufescentia. *Capitula* caulibus insident rotunda, ex oblongis, viridibus, gramineis, in orbem diffusis cauliculis conformata, hi versus inferioria stringuntur, asperi sunt & manibus adhærent. In *Capitulis*, ad exortum cauliculorum, oblongæ, angustæ, cuspidatæ, virides emergunt *spicæ*, foliosis involucris comitatæ; ubi florent ac se aperiunt è vertice duo emittunt filamenta oblonga, albicantia, pilis albis barbata, ac cum illis minora quædam filamenta, ruffis apicibus dotata. In caulibus quibus hæc capitula adnascuntur, ad huc alii cauliculi spicati, & quidem plures congregati conspiciuntur, qui ex vertice emicant, spicis seriatim obsessi. *Spicæ* ipsæ virides sunt. *Radix* trita & cum cinere capilli humani decocta à maniacis cum succesu assumitur.



*Telutta-mudela-muceu. Lat.*

വെട്ടുതുമ്പമുക്ക	Malab.
تَلُطَّةٌ مُدَلَّةٌ مُعِيَّةٌ	Arab.
تالو	bramin.





## VELUTTA-MODELA-MUCCU.

## TABULA LXXVI.



Uæ hujus sunt species, *Velutta-Modela-Muccu*, quasi diceret, *Modela-Muccu alba*, sic dicta a floribus albis, & *Schovanna-Modela-Muccu*. Prior Bramannibus dicitur *Davisiori-Touda*, planta est quæ nascitur in aquis, cum inferiori caulium parte super terram repens, ex geniculis radices, quibus se affigit, emittens. *Radices* fibrosæ, capillatæ, albicantes & fuscescentes, in fascias implexæ, saporis adstringentis & subamari, odoris expertes. *Caules* saporis sunt adstringentis, rotundi, glabri, virididiluti, geniculis ceu nodis laxis ac flexibilibus interstincti, in exortu articulorum extuberantes, è nodis hinc inde novos ejicientes caules, in ipsis nodis tenui, folioso, viridi albicante involucro amicti, illud pilosum est, extra nodos extensum, ex superiori parte longiuscula ejiciens filamenta, in exortu, paulo intra nodum, rubicundo circulo terminatum, dein fuscescens. *Folia* è geniculis proveniunt singula, oblongo angusta, in cuspidem contracta, saporis amari, sine odore. *Costa* media in utraque parte eminent, maximè in adversa. *Flores* in summitate caulium spicatim proveniunt in petiolis qui è nodis ex origine foliorum oriuntur; parvæ sunt *gemmæ*, pentapetalæ, oblongo rotundæ, albicantes; *stamina* in medio parva sunt, tenuia, albicantia, purpureorubris ac parvis dotata apicibus, sine odore. *Flores* primum aperti, postea se iterum claudunt ac viridescunt; constituentes gemmas oblongas, quæ feminum capsulæ sunt. In singulis unicum continetur *semen* rotundiolum, nonnihil planum, nigriferve flavi, deinde nitentis coloris, trigonum, glabrum, nigrum & nitens. Floret hæc planta toto anno. Contrita & in lacte acido data, intestinorum tormina lenit.



*Schoranna-mudela-muccu Sat*

മലബാർ മരുന്നുകളുടെ Malab.

چيوانضفا ما فضلا سفنو Arab.

അടി bramin.





## SCHOVANNA-MODELA-MUCCU.

## TABULA LXXVII.



Uasi diceret *Modela Muccu rubra*, altera species, lingua Bramannum *Tambiri-Siusori-Touda*, cum priori quam maxime convenit, sed hujus *caules* in totum rubescunt, intus corculo purpureo rubro instructi. *Folia* oblongoangustiora sunt. *Flores* nonnihil majores ac rosacei, ad petiolum rubicundiores, in summitate subalbicantes. Etiam *Gemmae* majores sunt, in summitate rubroalbicantes, inferiora versus rubicundiores & nitentes. Et *semina*, sed illa ad spadiceum vergunt. Decocta cum *Oleo* linimentum praestat antiarthriticum. *Radix* cum aqua calida assumpta ventrem expurpat: *foliorum* decoctum in *lacte* acido datum, tumores ventris detumescere facit.






Tjetti-pullu lat

മുളകു : Malab.

Nazano.

नावणो bamin.

جوتون : Arab.





T S F T T I-P U L L U.

*Cynodactylon* *coro canis*  
L. Sp. 107

## TABULA LXXVIII.



Lanta est ex genere frumentorum nascens in arenosis, & ad altitudinem quinque pedum assurgens. *Radix* nodus est brevis, plures capillatas, albicantes subtus dimittens fibras. *Caules* qui ex radice plures exsiliunt, rotundo plani sunt, albicantes, nitentes, venis striati, intus albo corculo, subulis subtilibus pervio, repleti, geniculis tuberosis interstincti, foliosis viridibus involucris vestiti, ex geniculis caules viridiores, planiores atque etiam geniculatos, suis quoque involucris obtekti, emittentes, qui caules seu culmi superius ad geniculos pluribus ac spicis sunt dotati capitulis. *Spicæ* in culmis densa serie ad unum latus confident primò virides, dein albicantes & nitentes, postea ex rubroruffescentes, vetustiores & siccaë ruffæ, valde planæ, quatuor vel quinque cuspidibus præditæ, intra suas vesiculas totidem includentes semina, nempe cum ad huc sunt immaturæ, sed maturæ semina rotunda sunt, & in totidem cuspidatas exturgescunt gemulas, cortice rubrofusco, quo inter pilandum depredataë, albescunt. Pista ex hac planta farina in pillulas formatur, quæ capiti adversus maniam imponuntur. Eadem farina cum *Ovi* albumine, vel *Nuce Indica* in scobem conquassata & commixta, distortisque manibus, pedibus aliisque partibus magno cum levamine circumlinitur; lumbis applicata robur genitale promovet. Prædictæ pillulæ in *Oleo Sergelim*, hoc est, *Tzit Elu* frixæ, panno insutæ ac dolenti parti impositæ, artuum dolores sedant; cataplasma ex hac farina confectum idem præstat; *semen* nodulo illigatum & in aqua coctum cum successu in cholera adhibetur.



*Panicum spicatum.*  
Pars XII Tab. 79.

Tenna. Lat.  
മരം. Malab.  
Tara.   
वन्ड. Bramin.  
طهنيج. Arab.





T E N N A.

## TABULA LXXIX.




**R**Tiam ex genere frumentorum nascens in arenosis. *Radix* ad instar est caulis nodosi, pluribus capillatis, rigidis, ex albicante subviridibus vestita fibris. *Caulis* seu culmi, qui duo tresve numero, vel etiam simplices è radice exsurgunt, rotundi sunt, ex viridi albicantes, nitentes, geniculati, ad geniculos foliosis angustis involucris, manu adhærentibus vestiti, in cacumine oblongum & spicatum gerentes capitulum, filamentis viridibus inter spicas eminentibus, barbatum. *Spicæ* ipsæ gemmulæ sunt oblongorotundæ, quæ filamentis viridibus, longiusculis, tanquam proprio conspiciuntur calyce. Maturescentes non tam longæ sunt, albicantes, subflaviusculæ, nitentes, in capitulo inter filamenta flavescencia gemmulas referentes. *Semina*, quæ in eduliis adhibentur, sunt gemmulæ rotundæ, parum oblongæ, utrinque nonnihil cuspidatæ, albicantes, ad unam partem, ubi planiores sunt, hiulco cortice, sed illo inter pilandum detrito, magis albicant. Planta sola trita bubonibus venereis imponitur, cum aqua levigata & epota, sanguinem ex gravi casu aliave externa causa grumescentem rarefacit, dolorem colicum lenit, ventris torminibus, gonorrhææ, abscessibus illinendo medetur.

F I N I S.



# I N D E X

*Prior numerus Tabulam, posterior Paginam designat.*

	A.				P.
 nantali-Maravara.	7:	15		Panna-Kelengu-Maravara.	11: 23
Angeli-Maravara.	1:	1		Panna-Mara-Maravara.	19: 39
Arana-Panna.	31:	67		Panna-Valli.	35: 69
Avenka.	39:	71		Para-Panna-Maravara.	15: 31
				Patitsjivi-Maravara.	10: 21
				Pee-Mottenga.	53: 99
B. Bafaala-Poulou-Maravara.	27:	53		Perim-Tsjurel.	66: 125
Beera-Cuida.	58:	109		Ponmampou-Maravara.	3: 7
Beli-Caraga.	47:	87		Potta-Pullu.	50: 93
Bellan-Patsja.	40:	73		Puempeda.	36: 71
Biti-Maram-Maravara.	2:	5			
				R. Ramacciam.	72: 137
C. Catri-Conda.	70:	133			
				S. Schovanna-Modela-Muccu.	77: 144
E. Elettadi-Maravara.	20. 21:	41			
				T. Tagadi.	49: 91
I. Ili-Mullu.	75:	143		Tama-Pouel-Paatsja-Maravara, Vel	
Ira.	55:	103		Eneadi Kourengo.	14: 27
Ira ceu Balara.	56:	105		Tenna.	79: 151
				Tereta-Pullu.	44: 81
K. Kaden-Pullu.	48:	89		Thalia-Maravara.	4: 9
Kal-Panna-Maravara.	16:	33		Theka-Maravara.	22: 43
Kansjiram Maravara.	8:	17		Tiri-Panna.	74: 141
Kari-Welli-Panna-Maravara.	17:	35		Tsjan-Pullu.	41: 75
Kathou-Theka-Maravara.	25:	49		Tsjama-Pullu.	45: 83
Katou-Ponnam-Maravara.	28:	55		Tsjelli.	71: 135
Katou-Kayda-Maravara.	26:	51		Tsjeria-Kuren-Pullu.	62: 117
Katou-Tsjolam.	60:	113		Tsjerou-Mau-Maravara.	5: 11
Katu-Tsjurel.	65:	123		Tsjerou-Tecka-Maravara.	23: 45
Kavara-Pullu.	69:	131		Tsjeru-Valli-Panna vel Warapoli.	33: 65
Kerpa.	46:	84		Tsjeru-Valli-Panna.	34: 67
Kodi-Pullu.	57:	107		Tsjeru-Tsjurel.	64: 121
Kol-Pullu.	63:	119		Tsjeru-Kotsjiletti-Pulli.	68: 129
Kolli Tsjerou-Mau-Maravara.	6:	13		Tsjetti-Pullu.	77: 149
Kouda-Pullu.	51:	95		Tsjola-Pullu.	67: 127
Kudira-Pullu.	43:	97		Tsjudan-Tsjera.	36: 71
Kuren-Pullu.	61:	115			
				V. Valli-Panna.	32: 63
M. Maravara-Tsjembo.	9:	19		Valli-Vara-Kody-Maravara.	30: 59
Maretta-Mala-Marava.	29:	57		Velutta-Modela-Muccu.	76: 145
Mella-Pana-Kelengu.	59:	111			
Motra-Pullu.	38:	71		W. Wara-Pullu.	42: 77
Mottenga.	52:	97		Wella-Theka-Maravara vel Mau-	
Mulcu-Pullu.	54:	101		Maravara.	24: 47
				Welli-Panni-Kelengu-Maravara.	12. 13: 25
N. Nain-Canna.	73:	139			
Nella-Panna-Maravara.	18:	37			



# INDEX GENERALIS

## TOTIUS OPERIS.

*Prior numerus Partem, alter Paginam dicit.*

A.		B.	
<b>A</b> Cara-Patsjotti.	5. 15	<b>B</b> Adukka.	6. 110
Acatsja Valli, ceu		Bahel-Schulli.	2. 87
Mudila-Tali.	7. 83	Bahel-Tsjulli.	9. 171
Ada-Kodien.	9. 9	Bala, ceu Musa Serapionis.	1. 17
Adaca-Manjen.	10. 85	Balam-Pulli, seu Tamarindus.	1. 39
Adamaram.	4. 15	Balia-Mucca-Piri.	8. 21
Adamboe.	4. 45	Ballel.	11. 107
& II. 115		Ban-Karetti.	6. 35
Adel Odagam.	9. 81	Bara-Mareca.	8. 85
Agati.	6. 73	Basaal.	5. 23
Ain-Pariti.	1. 95	Basaala-Pou-Maravara.	7. 45
Alpam.	6. 51	Bafella.	7. 47
Ambalam.	1. 91	Batta-Valli, vel Natsjam-Crua.	7. 1
Ambapaja, ceu Paxaja.	1. 21	Batti-Schorigenam.	2. 75
Ambel.	11. 51	Beénel.	5. 7
Amelpodi.	5. 101	Beéra-Cuida.	12. 109
Ameri, ceu Anil.	1. 101	Beésha.	5. 119
Amologo.	7. 31	Beetla-Codi.	7. 29
Ampana.	1. 13	Bel-Adamboe.	11. 119
Amvetti, ceu Vetta Tali.	5. 107	Bel-Ericu.	2. 56
Anantali-Maravara.	12. 15	Bela-Schora.	3. 9
Ana-Coluppa.	10. 93	Bela-Pola.	11. 69
Ana-Mullu.	8. 77	Belam-Canda-Schularmani.	11. 73
Ana-Parva.	7. 83	Belilla.	2. 27
Ana-Schorigenam.	2. 77	Beli-Tsjera.	9. 165
Ana-Schovadi.	10. 13	Beli-Caraga.	12. 87
Ana-Schunda.	2. 57	Bella-Modagam.	4. 121
Anavinga.	10. 93	Bellan-Patsja.	12. 73
Andi-Malleri.	10. 149	Bellutta-Tsjampkan, seu	
Angeli-Maravara.	12. 1	Castanea-Rosa-Indica.	3. 63
Angolam.	4. 39	Bellutta-Amelpodi.	6. 83
Anona-Maram, ceu Anon Oviedi.	3. 23	Beloere.	6. 77
Ansjeli.	3. 25	Belutta-Tsjori-Valli.	7. 19
Appel.	1. 47	Belutta-Areli.	9. 3
Araka-Puda.	10. 39	Belutta-Kaka-Kodi.	9. 7
Arana-Panna.	12. 67	Belutta-Onadu.	9. 99
Arealu.	1. 27	Belutta-Itti-Kanni.	10. 7
Arena-Ambel.	11. 52	Belutta-Modela-Muccu.	10. 159
Aria-Bepou, ceu Nimbo a Costæ.	4. 107	Belutta-Adeka-Manjen.	10. 75
Aria-Veela.	9. 41	Belutta-Pola-Tali.	11. 75
Asjogam.	5. 117	Bem-Curini.	2. 33
Ara-Maram.	3. 21	Bem-Schetti.	2. 19
Atti-Alu.	1. 25	Bem-Nofi, vel	
Atti-Meer-Alou.	3. 75	Negunda fœmina Acoftæ.	2. 15
Avankou, vel Ricinus.	2. 57	Bem-Pavel.	8. 35
Avænka.	12. 71	Bem-Tamara.	11. 61



# INDEX GENERALIS.

Bengieiri.	4.	105	Cattu-Schiragam.	2.	37
Ben-Kadali.	4.	89	Cattu-Molago.	7.	25
Ben-Theka.	4.	63	Cattu-Tirpali.	7.	27
Ben-Kalesjam.	4.	71	Cattu-Picinna.	8.	14
Ben-Kara.	5.	69	Catu-Bara-Mareca.	8.	87
Ben-Moenja.	5.	113	Catu-Paeru.	8.	97
Ben-Pala.	10.	115	Catu-Tsjandi.	8.	83
Ben-Tiru-Tali.	11.	111	Cattu-Tirtava.	10.	171
Bena-Patsja.	10.	95	Catulli Pola.	11.	79
Bilen-Schora.	3.	9	Cattu Valli.	11.	127
Bilimbi.	3.	55	Cavalam.	1.	89
Biti.	5.	115	Caunga seu Faufel.	1.	9
Biti-Maram-Maravara.	12.	5	Champacam.	1.	31
Blatti, seu Jambos-sylvestris.	3.	43	Cheru-Chunda.	2.	67
Bruxaneli.	5.	83	Chunda.	2.	69
Brami.	10.	27	Chovanna-mandaru.	1.	57
Bupariti.	1.	29	Chovanna-mandaru, secunda species.	1.	59
Bula.	10.	59	Cit Ambel.	11.	53
<b>C.</b>			Cit-Amerdu.	7.	39
Caca-Mullu.	10.	143	Codaga-pala.	1.	85
Caca-Palam.	8.	7	Codagen.	10.	91
Cada-pilaua.	1.	97	Codda-panna, seu Palma Montana Malabarica.	3.	1
Cadel-Avanacu.	2.	61	Coddam-pulli seu Carcapuli Acoftæ.	1.	41
Cadelari.	10.	155	Codi-Avanacoe.	2.	34
Cadenaco, seu Katu Kapel.	11.	83	Coletta-Veetla.	9.	42
Caicotten-Pala.	10.	65	Colinil.	1.	103
Cajenneam.	10.	81	Coluppa.	10.	21
Caipa-Schora.	8.	9	Conna, seu Cassia Fistula.	1.	37
Cammetti.	5.	89	Corinti Panel.	5.	27
Caniram.	1.	67	Corosinam.	9.	133
Canschena-pou.	1.	63	Cottam.	10.	153
Canschi.	1.	76	Covalam, seu Cidonia Exotica Bauh. Pin.	3.	37
Cansjen-Cora.	10.	103	Covel.	8.	27
Capo-Molaga, vel Capsicum.	2.	109	Courondi.	4.	103
Car-Elu.	9.	107	Courov-Moelli.	5.	77
Cara-Nofi, vel Negunda mas Acoftæ.	2.	13	Cudu-pariti.	1.	55
Cara-Schulli.	2.	91	Cupa-Vela.	9.	33
Cara-Carinam.	9.	109	Cupameni.	10.	161
Cara-Veela.	9.	24	Cupi.	2.	37
Carambu.	2.	95	Culi Tamara.	1.	193
Careloe-Vegon.	8.	49	Cumbulam.	8.	5
Caretti, vel Lobus Echinoides Clusii.	2.	35	Cumbulu.	1.	75
Cari Viflandi.	7.	59	Curigi-Tali.	7.	49
Carim-pana.	1.	11	Curinil, vel Curignil.	7.	47
Carim-Curini.	2.	31	Curutu-pala.	1.	83
Carim-Tumba.	10.	185	<b>E.</b>		
Carim Gola.	11.	91	ELa-Calli.	2.	83
Carua seu Canella Malabarica.	1.	107	Ela Pola.	11.	71
Cat-Ambalam.	1.	93	Elettadi-Maravara.	12.	41
Cata Valli vel Kadanaca.	11.	7	Elettari.	11.	71
Catri-Conda.	12.	133	Elengi.	1.	33
Cattu-Carambu.	2.	97	Ene-pael.	9.	159
Cattu-Gasturi, vel Bammia.	2.	71	En-		



# INDEX GENERALIS.

Entada.	9.	151	Kapa-mava, seu Acajous.	3.	65
Ericu, of Beid-el-Offar Alpini.	2.	53	Kappa-kelengu, vel Batatas.	7.	95
Erima-Taly.	7.	73	Kara-angolam.	4.	55
Erima-pavel,	8.	23	Kara-Tsjira.	10.	71
F.			Kare-kandel.	5.	25
FUla-mestica-Incarnata.	9.	1	Kareta-Tsjori-Valli.	7.	85
Fula-mestica-alba.	9.	3	Karetta Amelpodi.	5.	65
H.			Kari-bepou seu Nimbo altera.	4.	109
HAndir-alou.	3.	77	Kari-vetti.	4.	111
Hina-pareti.	6.	69	Kari-Welli-Panna-Maravara.	12.	35
Hummatu of Datura.	2.	47	Karii-kandel, seu Kanil-kandel.	6.	59
I.			Kariil.	4.	75
IDou-moulli.	4.	41	Karin-Njoti.	6.	31
Iripa.	4.	65	Karin Tagera.	6.	45
Ili Mullu.	12.	143	Karin-kara.	4.	49
Ilii, seu Bambu.	1.	25	Karin Pola.	11.	45
Inota-Inodien.	10.	139	Karinta-kali.	10.	41
Inschi vel Inschi Kua.	11.	23	Karivi-Valli.	8.	49
Intsia.	6.	7	Kasjavo Maram.	5.	37
Iribeli.	9.	145	Katapa.	5.	93
Ira.	12.	103	Katou-alou.	3.	37
Ira ceu Balara.	12.	105	Katou-Indel.	3.	15
Ifora-Murri.	6.	55	Katou-Tsjaca.	3.	29
Itti-alu.	1.	45	Katou-adamboe,	4.	47
Itti-Arealou.	3.	66	Katou-kadali.	4.	91
Itti-canni.	7.	55	Katou-kalesjam.	4.	69
K.			Katou-naregam.	4.	29
KAda-kandel.	6.	67	Katou-Theka.	4.	59
Kadali.	4.	87	Katou-Tjeroe seu Cheru.	4.	19
Kadanacu vel Catavalla.	11.	7	Katou Bellutta Amelpodi.	5.	66
Kaden-kara.	5.	71	Katou-karua.	5.	105
Kaden-pullu.	12.	89	Katou-Mail-Elou.	5.	3
Kaida.	2.	1	Katou-patsjotti.	5.	13
Kaida Taddi.	2.	3	Katou-Conna.	6.	21
Kaida Tsjerria.	2.	7	Katou-Pul-Colli.	6.	41
Kaipa-Tsjira.	10.	47	Katou Inschi Kua.	11.	25
Kaka-Njara.	5.	55	Katou-Theka-Maravara.	12.	49
Kaka-toddali.	5.	81	Katou-Ponnam-Maravara.	12.	55
Kaka-mulla, vel Kaka-moullou.	6.	33	Katou Kayda Maravara.	12.	51
Kaka-kodi.	9.	11	Katou Tsjolam.	12.	113
Kaka-pu,	9.	103	Katsjau-panel.	5.	35
Kaku-Valli.	8.	63	Katsji-kelengu.	7.	71
Kal-Panna-Maravara.	12.	33	Katsjoula-kelengu.	11.	81
Kal-Vetadagou.	5.	61	Kattu-katsjil.	7.	69
Kal-todda-valli.	6.	15	Kattu-kelangu.	7.	71
Kalengi-kansjava.	10.	119	Kattu-Tagera.	9.	55
Kalesjam.	5.	67	Kattu-Tjetti-pu.	10.	89
Kalrsjerou-panel.	5.	33	Kattu-Tumba.	10.	183
Kalu-polapen.	9.	129	Kattu kelengu.	11.	105
Kalu Tali.	9.	157	Katu-beloeren.	6.	79
Kametti-Valli.	9.	23	Katu-mulla.	6.	99
Kandel.	6.	57	Katu Pinsjegam Mulla.	6.	93
Kanneli-itti-kanni.	10.	9	Katu-kurka.	10.	179
Kansjiram Maravara.	12.	17	Katu-mailosina.	10.	131
Kapa Tsjaka,	11.	1	Katu-Tsjiregam-mulla.	6.	95
			Katu-		



INDEX GENERALIS.

Katu-kara-Walli.	7.	33	Manja-kutini.	9.	121
Katu-Nuren-kelengu.	7.	63	Manja-Adeka-manjen.	10.	33
Katu-Ulini.	8.	95	Manja kua.	11.	19
Katu-karavi.	9.	83	Manjapumeram.	1.	35
Katu-Pal-Valli.	9.	17	Manjella kua,	11.	21
Katu-Pee-Tsjanga-puspam.	9.	113	Manneli.	9.	69
Katu-Viftna-klandi.	9.	119	Manyl-kara.	4.	51
Katu-Uren.	10.	107	Mao feu mau vel mangas.	4.	1
Katu Bala.	11.	85	Maravara-Tsjembo.	1.	19
Katu kapel feu Cadenaco.	11.	83	Mareta Inali.	11.	129
Katu Schena.	11.	41	Maretta-Mala-Marava.	12.	57
Katu-Tsjurel.	12.	123	Marotti.	1.	65
Kavara-pullu.	12.	131	Mella-Pana-Kelengu.	12.	111
Kedangu.	6.	49	Mendoni.	7.	107
Kerpa.	12.	84	Meriam-Pulli.	7.	91
Kilckola Tsjetti.	10.	113	Min-Angani.	9.	141
Kirganeli.	10.	29	Modagam.	4.	119
Koda-Tsjeri.	9.	131	Modeca.	8.	39
Kondam-palu.	9.	57	Modera-Canni.	2.	29
Kodda pail.	11.	63	Modira-Valli.	7.	87
Kodi-pullu.	12.	107	Modira-Caniram.	8.	47
Kol-pullu.	12.	119	Moetoe.	10.	139
Kolli-Tsjerou-mau-maravara.	12.	13	Molago-Maram.	5.	49
Konni.	8.	71	Molago-Codi.	7.	23
Kotsjiletti-pullu.	9.	139	Motta-Pullu.	12.	71
Kouda-pullu.	12.	95	Mottenga.	12.	97
Kua.	11.	13	Moul-Elavou, feu Arbor lanigera		
Kudda-mulla.	6.	89	Spinofa.	3.	61
Kudici-Valli.	8.	51	Mouli-ila.	5.	67
Kudira-pullu.	12.	97	Moullava.	6.	11
Kuren-pullu.	12.	115	Mouricou.	6.	13
Kurka.	11.	49	Mouringou.	6.	19
Kurundoti.	10.	35	Mu-Kelengu.	8.	97
			Mucca-Piri.	8.	25
M.			Mudela-Nilu-Hummatu.	2.	51
<b>M</b> Ail-anschi.	1.	73	Muel-Schevy.	10.	135
Mail-Elou.	5.	1	Mulen Schena.	1.	37
Mail ombi.	5.	51	Mulen-Pullu.	12.	101
Mal-naregam, feu Malus limonia			Mullen-Belleri.	8.	11
Pumula Sylvestris Zeylanica.	4.	27	Mundi Valli.	11.	103
Mala-Elengi.	5.	109	Muriguti.	10.	63
Mala pœnna.	5.	17			
Mala Infchi kua.	11.	29	N.		
Malacca, Schambu.	1.	27	<b>N</b> Aga-Mu-Valli.	8.	57
Malacka Pela.	3.	33	Naga-Valli vel Mandaru-Valli	8.	55
Malam-Todda-Vaddi.	9.	37	Naga-Dante.	10.	151
Malan kua.	11.	17	Naga-Pu.	10.	111
Malla-katou-tsjambou.	4.	57	Nagam.	6.	37
Mallam-roddali.	4.	83	Nai-Corana.	8.	61
Mallam-Tsjulli.	9.	163	Nain-Canna.	12.	139
Man-Onapu.	9.	95	Nala-Tirtava.	10.	169
Man-Todda-Valli.	9.	29	Nalla-Mulla.	6.	87
Manam-Podam.	10.	129	Nalugu.	2.	43
Mandari-Valli, vel Naga-Valli.	8.	55	Nandi Ervatam major.	2.	105
Mandsjadi.	6.	25	Nandi Ervatam minor.	2.	107
Manga-Nari.	10.	11	Nanschera Canschabu.	10.	99
			Nans-		



# INDEX GENERALIS.

Nansjera-Patsja.	9.	21	Nyrvala.	3.	48
Narinam-Poulli.	6.	75	O.		
Nari-Patsja.	10.	123	O Dallám.	1.	71
Naru-nundi.	10.	67	Oepata.	4.	95
Naru Kila.	11.	65	Onapu	9.	89
Narum-Panel vel Nimbo Acofta.	2.	2	Orela-modecta.	8.	45
Nati-fchambu.	1.	29	Ottel Ambel.	11.	59
Natsjam-Crua, vel Batta-Valli.	7.	1	P.		
Nehoemeca	8.	37	PAda-Valli vel Pada Kelengu.	7.	93
Nedel-Ambel.	11.	57	Pada-Vara.	7.	71
Nedum-Schetti.	2.	21	Pada-Valam.	8.	29
Nela-Naregam.	10.	43	Padri.	6.	47
Nela-Tsjira.	10.	61	Paenoe.	4.	33
Nela-Vaga.	10.	137	Paeru.	8.	75
Nelam-Muri.	9.	161	Pai-paroea, feu Couradi.	5.	91
Nelam-pata.	10.	97	Paina-Schulli.	2.	93
Nelam-pullu.	10.	37	Pajanelli.	1.	79
Nelem-pala.	9.	5	Pala.	1.	11
Nelem-parenda.	9.	117	Palega-pajanelli.	1.	81
Nelen-Tsjunda.	10.	145	Pal Modeca.	11.	101
Nelenschena major.	11.	39	Pal-Valli.	9.	19
minor.	11.	33	Panambu-valli.	7.	99
Neli-pouli, feu Bilimbi altera			Panavera Tjerata.	11.	56
minor.	3.	47	Pandi-Pavel.	8.	17
Neli-Pu.	9.	137	Pandi-Avanacu.	2.	60
Neli-Tali.	9.	31	Panel, vel Nimbo.	2.	9
Nella-Panna-Maravara.	12.	37	Panem-palka.	4.	9
Nellia-Tandali-Cotti.	9.	49	Panja, Panjala, feu arbor Lanigera		
Njara.	5.	53	Bontii.	3.	59
Niir-notsjiiil.	5.	97	Panitsjica-maram.	3.	45
Niir-Pongeliori.	6.	53	Panna-Kelengu-maravara.	12.	23
Nila-Hummatu.	2.	49	Panna-mara-maravara.	12.	39
Nila-Barudena.	10.	147	Panna-Valli.	12.	69
Nili Camaram.	1.	69	papajamaram.	1.	23
Njota-Njodem-Valli.	9.	27	Para-panna-maravara.	12.	31
Nir-murri.	9.	59	Parili.	5.	5
Nir-Pullari.	9.	67	Pariti feu Tali-pariti.	1.	53
Nir-Carambu.	2.	99	parpadagam.	10.	69
Nir-Schulli.	2.	89	Parparam	9.	29
Nir-Cottam-Pala.	10.	101	Parua Kelenga.	11.	31
Nir-Pulla.	10.	53	Patitsjivi-maravara.	12.	21
Nir-Pulli.	10.	25	Patsjotti.	5.	9
Nir-Valli-Pulli.	10.	23	Pavel.	8.	19
Nir Tjembu.	11.	33	Pavetta, feu Malleamothé.	5.	19
Niruri.	2.	45	Pee-ponnagam.	5.	47
Nituri.	10.	53	Pee-Tsjerou-ponnagam.	5.	45
Niti-panna.	3.	7	Pee-Kandel.	6.	61
Niti-Todda-Vaddi.	9.	35	Pee-Ula.	7.	43
Niuren.	10.	109	Pee-Amerdu.	7.	37
Noel-valli, & Pannivalli.	6.	39	Pee-Tandale-Cotti.	9.	53
Noeli-tali.	4.	115	Pee-Tardavel.	9.	155
Nola-Ily.	5.	119	Pee-Tsjanga-pulpam.	9.	115
Nottenga.	9.	101	Pee-Tumba.	9.	87
Nurem-Kelengu.	7.	67	Pee-Cajenneam.	10.	83
Nyalel.	4.	37	Pee-Coipa.	10.	133
			R i		Pee:



# INDEX GENERALIS.

Pee-Cupameni.	10. 163		
Pee-Iniota-Iniodien.	10. 141		
Pee-mottenga.	12. 99		
Pela, seu Guayabo pomifera Indica B. Pin.	3. 31		
Pelou, seu Guayabo Sylvestre.	3. 35		
Penar-Valli. Fœmina.	8. 91		
Penar-Valli. Masc.	8. 93		
Peralu,	1. 49		
Perim-munja.	9. 147		
Perim-Tolaffi.	10. 167		
Perim-Tsjurel.	12. 125		
Perin-Kaida-Taddi.	2. 5		
Perin Teregam.	3. 81		
Perin-kara.	4. 51		
Perin-toddali seu Jujube Indica.	4. 85		
Perin-njara.	5. 57		
perin Nirouri, seu manirouri.	5. 85		
Perin-Panel.	5. 29		
Perin-patsjotti.	5. 11		
Perin-Courigil.	6. 43		
Perin Kaku-Valli.	8. 59		
Petagu.	2. 41		
Pevetti.	4. 113		
Picinna.	8. 12		
Piripu.	7. 101		
Pitsjegam-mulla:	6. 91		
Plafo.	6. 29		
Podava-Kelengu.	7. 97		
Poeatsjetti.	5. 103		
Poerinsij.	4. 43		
Pola-Tsjira.	9. 153		
Ponga.	4. 73		
pongam, seu minari.	6. 5		
Pongati.	11. 47		
Pongelion, five Perimaram.	6. 27		
Pongolam.	7. 109		
Ponna.	4. 79		
Ponnagam.	5. 41		
Ponnam-tagera.	2. 101		
Ponnam-pou-maravara.	12. 7		
Potta-pullu.	12. 93		
Pou-Kandel.	6. 65		
Poutaletsje.	4. 117		
Pu-pal-valli.	7. 81		
Pu-valli.	7. 79		
Pu-tumba.	10. 125		
Puam Curundala.	10. 127		
Puempeda.	12. 71		
Pul-Colli.	9. 135		
Puli Schovadi.	11. 14		
Putsja-paeru.	8. 117		
		<b>R.</b>	
<b>R</b> Amacciam.	12. 137		
Rana-pumaram.	4. 125		
Rava-pou.	4. 99		
			<b>S.</b>
		<b>S</b> Amstravadi, seu Caipa-tsambu.	4. 11
		Samudra Sjogam.	11. 125
		Schada-veli-kelengu.	10. 19
		Schadida-Calli, vel Euphorbium.	2. 8
		Schageri Cottam.	1. 105
		Schakeri-Schora.	8. 3
		Schanga-Cuspi.	8. 69
		Schanganam-pullu.	10. 45
		Schem-Pariti.	2. 25
		Schembra-valli.	7. 11
		Schena.	11. 37
		Scheru-katu-valli, Caniram, vel Tsjeru-katu-valli-Kansjeram.	7. 9
		Scheru-valli-Caniram, vel Sjerou-valli-Kansjeram.	7. 7
		Scheru-pada-valli.	8. 31
		Scheru-Bula.	10. 57
		Scheru-Cadelari.	10. 157
		Scherunam-Cottam.	2. 23
		Schetti.	2. 17
		Schetti-Codiveli.	10. 17
		Schit-Elu.	9. 105
		Schorigenam.	2. 39
		Schovanna Adamboe.	11. 115
		Schovanna Modela-Muccu.	12. 144
		Schunambu-valli.	7. 21
		Schunda-pana.	1. 15
		Sendera Klandi.	11. 133
		Sjasmin.	10. 1
		Sida-pou.	6. 105
		Sjouanna-Amelpodi.	6. 81
		Sjovanna pola tali.	11. 77
		Soladi-tirtava.	10. 173
		Solda.	6. 103
		Sondari.	5. 79
		Soneri-Ila.	9. 127
		Suendudi-pullu.	9. 75
		Syalita.	3. 39
			<b>T.</b>
		<b>T</b> Agadi.	12. 91
		Tagera.	2. 103
		Tala Neli.	11. 113
		Tali-pullu.	9. 123
		Taliir Kara.	5. 75
		Talu-Dama.	7. 105
		Tama-pouel-paatja-Maravara, vel Eneadi Kourengo.	12. 27
		Tamara.	11. 59
		Tamara-tonga, seu Carambolis.	3. 51
		Tandale-Cotti.	9. 45
		Tandale-Cotti.	9. 47
		Tani.	4. 23
		Tardavel.	9. 149
		Tenga, seu palma Coccifera.	1. 1
		Penna.	



# INDEX GENERALIS.

Tenna.	12.	157	Tsjerou Kara.	5.	73
Teregam.	3.	79	Tsjerou panel.	5.	31
Tereta-pullu.	12.	81	Tsjerou poëam.	5.	111
Thalia-Maravara.	12.	9	Tsjerou-ponnagam	5.	43
Theka.	4.	57	Tsjerou-Kandel.	6.	63
Theka-Maravara.	12.	43	Tsjerou-Mau-Maravara.	12.	11
Thora-paërou.	6.	23	Tsjerou-Tecka-Maravara.	12.	45
Tjageri-Nurem.	7.	63	Tsjeru-Manneli.	9.	73
Tjem Cumulu.	11.	97	Tsjeru-Vela.	9.	63
Tjeru-Kirganeli.	10.	31	Tsjeru-Urem.	9.	243
Tilo-Onapu.	9.	101	Tsjeru-Cansjava.	10.	111
Tinda-parua.	1.	87	Tsjeru-Jonganam-Pullu.	10.	51
Tjori-valli.	7.	17	Tsjeru-Parua.	10.	105
Tiri-Itti-Canni.	7.	57	Tsjeru-Talu-Dama.	10.	49
Tiri-panna.	12.	141	Tsjeru-Tardavel.	10.	187
Tiru-Calli.	2.	85	Tsjeru-Vallel.	10.	55
Tiru tali.	11.	109	Tsjeru pu.	10.	87
Todda-panna.	3.	9	Tsjeru-Valli-panna vel Warapoli.	12.	65
Todda-vaddi.	9.	33	Tsjeru-Valli-panna.	12.	67
Tondi-teregam.	4.	123	Tsjeru-Tsjurel.	12.	123
Tota-piri.	8.	33	Tsjeru-Kotsjiletti-pullu.	12.	129
Tseria-Samstravadi.	4.	15	Tsjetti-Mandarum.	6.	1
Tsja-pangam.	6.	3	Tsjetti-pulli.	12.	149
Tsjadaen.	10.	175	Tsjiregam-Mulla.	6.	97
Tsjahela.	3.	87	Tsjocatti.	5.	95
Tsjaka-maram, feu Jaca.	3.	17	Tsjola-pullu.	12.	127
Tsjama-pullu.	12.	83	Tsjovanna-Aleti.	9.	1
Tsjan-pullu.	12.	75	Tsjovanni-Manneli.	9.	71
Tsjana Kua.	11.	15	Tsjudan-Tsjera.	12.	71
Tsjanga-pulpam.	9.	111	Tsjude-Maram.	6.	107
Tsjangelam-parenda.	7.	77	Tsjuria Cranti.	11.	123
Tsjela.	3.	85	Tumba.	10.	181
Tsjelli.	12.	135	Tumba-Codiveli.	10.	15
Tsjem-tani.	4.	25			
Tsjera-pu-pal-valli.	7.	103	V.		
Tsjera-Canetti valli.	8.	89	VA Embu.	11.	99
Tsjera-Uren.	9.	143	Vada-Kodi.	9.	74
Tejere-Maram.	6.	109	Valli Schorigenam.	2.	79
Tsjerou-Caniram, vel Tsjerou-			Valli-Teregam.	3.	83
Cansjeram.	7.	3	Valli Caniram.	7.	5
Tsjeria Nirouri, feu Katou Nirouri.	5.	87	Valli-Kara.	7.	35
Tsjeria-Manga-Nari.	9.	167	Valli-Modagam.	7.	89
Tsjeria-Narinam-pulli.	9.	169	Valli-Onapu.	9.	91
Tsjeria-Onapu.	9.	93	Valli-Upu-Dali.	9.	85
Tsjeria-Belutta-Adeka-Manjen.	10.	77	Valli-Itti-Canni.	10.	5
Tsjeria-Kuren-pullu.	12.	117	Valli-panna.	12.	63
Tsjeriam-Cottam.	5.	21	Valli-Vara-Kody-Maravara.	12.	59
Tsjerii-Mulla.	6.	85	Vallia-pira-pitica.	7.	13
Tsjeroea Cit Ambel.	11.	57	Vallia-Tsjori-Valli.	7.	15
Tsjerou-meer-alou.	3.	71	Vallia-Capo-Molago.	9.	65
Tsjerou-kadali.	4.	93	Vallia-Manga-Nari.	10.	79
Tsjerou-katou-naregam.	4.	31	Veetla-Caitu.	7.	109
Tsjerou-ponna.	4.	81	Velurta-Mandura.	1.	61
Tsjerou-theka.	4.	61	Velutta-Modela-Muccu.	12.	145
Tsjerou Kanneli.	5.	99	Veradagou.	5.	59
			Vidi-maram.	4.	77
			Vistnu		



# INDEX GENERALIS.

Vistnu Clandi.	11. 131	Watta-tali.	5. 61
Ula.	7. 41	Watta-Kaka-Codi.	9. 25
Ulina.	8. 53	Wattou-Valia.	7. 61
Unjala.	7. 53	Weli Ila.	11. 43
Upu-Dali.	9. 125	Welia-Cupameni.	10. 105
Uren.	10. 3	Wella-Theka-Maravara vel Mau-	
		Maravara	12. 47
<b>W</b> Adapu.	10. 71	Welli-panni-Kelengu-Maravara.	12. 25
Wadouka.	4. 97	Wella Tagera.	6. 17
Waga.	6. 9	Wella-Tandali-Kotti.	9. 51
Wallia-pal-Valli.	9. 15	Welli Codiveli.	10. 117
Wara-pullu.	12. 77		